



B^o 16

3

SMALL
PLATE

Di Carlo Poggi

COMPENDIO
D' ASTRONOMIA
COLLE TAVOLE
ASTRONOMICHE
DEL SIGNOR
DE LA LANDE

Dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi, e di tutte
le più celebri Accademie d' Europa

PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Correttissima, con aggiunte e correzioni dell' Autore istesso.



IN PADOVA, MDCCLXXVII.

Nella Stamperia del Seminario

Appresso GIOVANNI MANFRÉ.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Carlo di Poggio.

18^o 10. 3. 27

AGL' ILLUSTRISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI

ALVISE VALARESSO

ANDREA TRON CAV. PROCUR.

GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN CAV.

SENATORI GRAVISSIMI,

Riformatori dello Studio di Padova

GIUSEPPE TOALDO.



Entre, *VOSTRE ECCELLENZE*, con
regale spesa hanno fondato, e vanno ora
adornando di sontuosi istrumenti quest' Of-
servatorio di Padova, degnino accettare la divota offer-
ta di questa Edizione delle Tavole Astronomiche, istru-

mento più di tutti necessario in questa Scienza, e di gradire la qualunque mia impiegata opera nel procurare all' Unirversità, alla Nazione, a tutta l' Italia, sotto i felici Loro auspicj, questo beneficio. Grazie ec.

Padova 10. Aprile 1776.



AI LETTORI.

AVVISO DELL' EDITORE.



Engono bisogno gli Astronomi delle Tavole Astronomiche quanto i professori di lingua dei dizionarj , ed ogni artefice de' proprj istrumenti ; mentre nè la teoria nè la pratica di questa scienza senza questo ajuto si può esercitare .

A tal oggetto avendo io procurato una buona edizione di Tavole Trigonometriche nel 1769 , ristampate nel 1772 , ora , siccome m' era impegnato allora di fare , porgo le Tavole Astronomiche , e queste le più perfette che vi siano , raccolte o composte dal celebre Astronomo Sig. De la Lande col Trattato compendiatto d' Astronomia del medesimo , che serve d' Introduzione alla scienza , ridotta alla portata di tutto il mondo colto .

Il Sig. De la Lande istesso nella seguente Prefazione rende conto del suo lavoro . Che posso io aggiugnere ! Il nome solo dell' Autore , che fa l' elogio a se stesso , basta per commendazione dell' Opera . Sembra incredibile , che un uomo all' età appena di 44 anni , abbia potuto supplire all' esecuzione di tante Opere , che appena si potrebbero aspettare da un' Accademia .

Chiunque ha qualche tintura dell' Istoria letteraria , può sapere , quante produzioni , o separate , o negli Atti dell' Accademie , o sparse nei Giornali , siano uscite ed escano continuamente dal felice ingegno e dalla maravigliosa fecondità del Sig. De la Lande . Soprattutto debitrice gli è l' Astronomia , che particolarmente prese a coltivare . Nato nel 1732 , nel 1750 , che vuol dire all' età appena di 18 anni , fu mandato dall' Accademia a Berlino per fare le osservazioni corrispondenti a quelle che nello stesso tempo il Sig. Abate De la Caille faceva al Capo di Buona Speranza . All' età di 20 anni fu fatto Accademico ; e d' allora in qua pieni sono i volumi dell' Accademia delle sue Memorie Astronomiche con segnalate scoperte . Quasi poi per divertimento calcolò per 16 anni consecutivi (dal 1760 fin al 1775) la così detta *Notizia de' Tempi* , almanaco dottissimo dell' Accademia , che solo basta per occupare un uomo , e cui il Sig. De la Lande arricchì del doppio con dottrine , tavole particolari , e mille altre notizie utili agli astronomi .

Poichè il Sig. De la Lande puossi anche chiamare l' Istoric publico dell' Astronomia , fattosi centro di tutte le corrispondenze di tutti gli Astronomi d' Europa , tramanda dall' uno all' altro quanto viene fat-

fatto, scoperto e prodotto nella teoria e nella pratica in tutti i rami di questa vasta scienza: il qual commercio di lettere, con tanti viaggi da esso fatti, si vede quanto tempo gli debba occupare; ma e viaggi e lettere, tutto fornisce al secondo suo ingegno materia di nuove utilissime opere.

Lasciando il resto, qual altro Tolomeo, compose il Sig. De la Lande un nuovo *Almagesto*; poichè tale si deve riconoscere la sua grande *Astronomia* in XXIV. Libri, ristampata e tradotta quasi in tutte le lingue d' Europa, sino in Russo; poichè nulla si può ricercare per la teoria o matematica o fisica, per la pratica, per il calcolo, per l' Istoria, per la notizia de' libri, relativo all' astronomia, che abbondantemente non si ritrovi in quest' immensa opera.

Pieno poi di zelo a propagare la scienza, egli ebbe anche l' arte e la pazienza di dare la sostanza di tutto in questo *Compendio d' Astronomia* (già ristampato in Olanda) ridotto non solo all' uso delle scuole, ma ancora de' dilettanti per poca idea, che abbiano delle matematiche, in parte anche senza di queste.

Nell' atto poi, ch' io publico questo in Italiano colle Tavole per uso principalmente della mia scuola, credo d' aver reso un beneficio a tutta l' Italia; poichè mancava in Italiano un buon Trattato d' *Astronomia*, molto più le Tavole: gli studiosi con grave incommodo, ritardo e dispendio erano costretti provvedersi dallo straniero. Quivi con poche lire avranno quello che a stento potevano avere con molti zecchini.

Quest' edizione poi si raccomanda per la correzione tanto importante, particolarmente per le Tavole, e per qualche mutazione ed aggiunta mandata dall' Autore istesso; il cambiare o aggiugnere cosa di proprio non essendo occorso in opera nel suo genere così buona, nè conciliandosi colli riguardi non indifferenti dell' economia.



P R E F A Z I O N E

D E L L' A U T O R E .



Astronomia che ho pubblicata nel 1764 in due Vol. e nel 1771 in tre in 4^o era destinata non solo per li principianti, ma per gli Astronomi stessi di professione; essendovi descritti tutti li metodi, le scoperte, le osservazioni, i calcoli e le Tavole più perfette.

Io vedeva nonnostante, che il maggior numero degli amatori sarebbero per giudicarla troppo diffusa, e di cui non si poteva perciò farne uso nelle Scuole delle Università: ond' è che mi persuasi di darne un estratto.

Le Lezioni del Sig. Ab. de la Caille sono della forma ed estensione di questo mio Compendio; ma trattandosi della parte elementare, sono esse troppo ristrette, e, riguardo alle Teorie astronomiche, troppo astratte; non versano punto sull' Istoria dell' Astronomia, su gl' istrumenti, sulle osservazioni, da' quali inconvenienti ho io voluto guardarmi. Quando questo grande Astronomo scrisse le sue Lezioni, avea in oggetto di spiegarle egli stesso a' suoi Scolari, e perciò non avea bisogno che del semplice testo stampato; se il medesimo avesse avuto la mira di estendersi quanto io mi sono presentemente prefisso, non sarebbemi restato niente da fare, o da pubblicare di nuovo.

Anche nel metodo e nell' ordine di questo Compendio ho seguita altra strada da quella dello stesso de la Caille. Pensai che un trattato d' Astronomia dovesse cominciare da que' fenomeni, che i primi colpiscono l' occhio, quando la prima volta si osserva il Cielo. Indi esaminai le conseguenze, che ne cavarono i primi Astronomi, sempre naturalissime, per lo più ingegnossissime, alle volte false; non essendo essi stati i primi Osservatori, che Pastori. Non ho dunque già principiato il mio Libro dal supporre un Osservatore nel centro del Sole, come il Sig. de la Caille, essendo stato dopo due mille anni soltanto dimostrato, che il Sole era il centro de' moti celesti. Nè ho principiato dalla diffinizione de' cerchi della sfera, perchè il Lettore non avrebbe veduta la necessità e l' origine de' medesimi; la generazione delle cose deve precedere la loro diffinizione. Finalmente non ho principiato dalla Storia dell' Astronomia, perchè avrei dovuto in tal caso suppor nota la stessa Astronomia; ma mi sono studiato di condurre la Storia con la cosa stessa, cercando l' ordine degl' Inventori, e leggendo la Storia dell' Astronomia con i principj della Scienza medesima.

Quan-

Quando non ho potuto seguire l'ordine delle scoperte, mi bastò solo indicarlo. Lo spirito s'avvanza sempre per gradi; una invenzione si giudica per lo più meravigliosa, perchè non vi si scorge la strada, per cui si scoprì; e al contrario sembra sempre facile, quando si vede da vicino ciò che la precedette, e le strade per cui si camminò in cerca di ciascheduna verità.

Dopo queste prime Osservazioni vedremo pararci avanti gli studj, e i lavori di Copernico, Ticone, Keplero, Cassini, Newton; in una parola degli strumenti nuovi, degli arditi sistemi, delle scoperte felici, delle delicate osservazioni; in questi due secoli di luce si aprì uno spettacolo il più sorprendente di quanti possano appagare lo spirito. Ma se noi si studieremo di ordinare ciascuna cosa secondo la di lei nascita, e di unirvi quelle, che la fecero nascere; e se faremo vedere al Lettore lo stato in cui si trovò, chi fu autore di qualche bella scoperta, già si riconoscerà la serie; e lo spirito sollevato dal peso, di cui la troppa ammirazione carica l'amor proprio, quasi che godrà del piacere dovutosi dall'Autore stesso sentire. Il fine di quest'Opera si è appunto questo di mostrare i progressi dello spirito, che in niun'altra scienza scorgonsi più meravigliosi.

L'esempio del Sig. de Fontenelle, per quanta invidia n'avevvi del di lui scrivere, punto non mi sedusse a scemare l'avidità d'uno studio sì noioso. Non ebbi il coraggio di meschiarmi nè dialoghi, nè epistodj, nè digressioni; sembra che il raffinato nostro secolo non gusti più questa poetica maniera di porgere le scienze. Chi godesse però di tale lettura, può faziarsene nello Spettacolo della Natura T. IV. In esso si troveranno delle pitture dilettevoli, delle graziose conversazioni, delle riflessioni interessanti. Il fresco dell'ombre, il silenzio della notte, il dolce lume del crepuscolo, i fuochi brillanti del cielo, le diverse apparenze della luna, ogni cosa in somma diviene una deliziosa pittura sotto la penna del Sig. Pluche. Egli riferisce tutto al nostro bisogno, alle mire dell'essere Supremo per li nostri piaceri e bisogni, e alla gloria del Creatore. La di lui opera oltre d'essere un trattato di Fisica, lo è anche di cause Finali, e la lettura della medesima reccherà gran piacere a' giovani. Il mio oggetto fu soltanto di parlare d'Astronomia, e riguardo ai curiosi Lettori, bastami d'indicar loro queste opere; Spectacle de la Nature, Théologie Astronomique de Derham, Dialogues de M. de Fontenelle sur la pluralité des Mondes.

Il mio maggiore studio si fu quello di essere facilmente intesa nelle mie spiegazioni. Mi sovvennero le difficoltà incontrate altre volte da me medesimo; le ho analizzate e sciolte, e queste soluzioni, che mi avevo fatte, le ho spiegate con la più possibile chiarezza; ho avuto anche in mira le difficoltà propostemi più volte da persone dedicate a tale studio, e mi profitai dell'occasione, in cui fui di spiegarle attentamente.

Non ho trascurato certamente di citare gli articoli; con che si facilita l'uso

l'uso di questo Libro, si risparmiano le ripetizioni, e si ajuta la memoria de' Lettori.

Per leggere con frutto quest' opera, ma specialmente il Libro primo, è necessario tenere avanti agli occhi un globo celeste.

Secondariamente per lo stesso frutto, bisogna rendersi familiare ciascuna proposizione, quantunque possi essa sembrare sì naturale, che ognuno da se medesimo potrebbe presupporla per via di ciò che precede la stessa proposizione; nè devesi passare da un articolo al seguente, senza prima averne intesi bene i precedenti; e questo si è il modo d' intendere in poco tempo ogni cosa. Ma il consiglio più importante da darli agli studiosi delle Matematiche, si è quello, di determinarli a esercitare la loro immaginazione assai più della loro memoria, cioè a leggere poco, ma pensar molto, e cercare da se stessi le dimostrazioni, o almeno far valere le loro forze il più spesso che possono: con questo mezzo s' acquista lo spirito delle Matematiche, il gusto delle ricerche, la facilità di scoprire e d' inventare; deve ognuno da se medesimo sviluppare quanto lesse, cavarne de' corollarij, farne le applicazioni, e non cercare sul Libro, se mai è possibile che la sola conferma di quanto si trovò. I lunghi dettagli, nei quali qualche volta mi sono diffuso servono ai curiosi, che non sono in istato nè hanno il tempo necessario, per seguire i precedenti miei consigli.

Non suppongo nè miei Lettori altra cognizione, che gli Elementi comuni di Geometria, e per alcuni articoli quelli di Algebra, per esempio quelli dell' Sigg. Clairaut, Bezout, Bossut ec. ma tutti gli articoli, che richiedono l' Algebra, sono impressi in Carattere minuto, perchè si possano omettere senza interruzione della Lettura degli Elementi.

Le spiegazioni più elementari di questo Compendio sono precisamente le stesse di quelle della mia Opera grande, e per lo più sono gli stessi anche i termini; perciò questo Compendio è inutile per chi ha li miei tre Tomi in 4^o. Nonostante molti Lettori fanno esser utile formare con una prima lettura una compita idea e ristretta d' uno studio, ch' esige tanto tempo, o perciò accetteranno forse volentieri in questo piccolo volume una scelta fatta dallo stesso Autore, di quelle cose che loro convengono, e che a stento si faranno posti a cercarle in una opera tanto più estesa.

Ho anche aggiunta in fine di questo Volume una nuova Tavola delle dimensioni de' pianeti e delle loro distanze, dopo la parallasse del sole determinata coll' ultimo passaggio di Venere; questa Tavola servirà di Supplemento alla mia Astronomia fino a tanto che pubblici un altro Supplemento in 4^o da unirsi alla stessa opera.

Utilità dell' Astronomia.

Chi espone al Pubblico un Trattato d' Astronomia, avvertendo che questa Scienza agli uomini più grandi sembrò degna dello studio di tutta la

vista, è in obbligo di rispondere a un tal quesito: *A che serve l'Astronomia? ed io potrei dal mio canto chiedere, a che servono tante cose inutili o nocive, che tutto di fanno l'occupazione degli uomini?* Ma una tal digressione mi condurrebbe troppo lungi, e perciò mi restringo al mio punto. Lo studio è generalmente uno dei bisogni della umanità; quando si prova una volta, quest'attiva e penetrante curiosità, che ci porta a penetrare nelle meraviglie della Natura, non si chiede più a che serva lo studio, perchè in tal caso serve a felicitarci.

Lo studio poi è un preservativo contro il disordine delle passioni; e a mio credere, deve principalmente distinguere una sorta di studio, che solleva lo spirito, lo tiene fortemente applicato, lo arma con sicurezza contro i danni, di cui parlo. Non basta già di conoscere il bene, diceva Seneca, di sapere i proprii doveri verso la Patria, la Famiglia, gli amici, se stessi, quando non s'abbia forza di farlo; non basta stabilirne i precetti; bisogna rimuovere gli ostacoli: *Ut ad praecepta quae damus possit animus ire*, solvendus est (Epist. 95). Non trovo cosa più opportuna per la buona riuscita in questo punto, quanto l'applicazione alle Matematiche, e specialmente all'Astronomia. Le meraviglie, che vi si scoprono, impegnano l'animo, e l'occupano in maniera nobile, deliziosa, e senza alcun danno; sollevano l'immaginazione, perfezionano lo spirito, nutrono il cuore, allontanano i desiderj nocivi e frivoli, e producono continuamente nuovi piaceri.

I più gran Filosofi dell'antichità parlarono dell'Astronomia con ammirazione. Diogene Laerzio racconta, che interrogato Anassagora del fine, per cui fosse nato, rispose, per contemplare gli Astri. Se scorgevi in questa risposta dell'esagerazione in favore dell'Astronomia; vi si vede almeno l'entusiasmo, con cui un uomo di genio contemplava lo spettacolo del Cielo. Anche Platone faceva grande stima dell'Astronomia; Veggasi ciò che ne dico nel suo 35^{mo}. Libro intitolato *Epinomis* vel *Philosophus*, da Marsilio Ficino detto il *Tesoro di Platone*: *Nolite ignorare Astronomiam sapientissimum quiddam esse*, &c. egli arriva perfino in altro luogo a dire, che gli occhi si sono dati all'uomo per l'Astronomia; e tale forse era anche l'idea d'Ovidio quando s'esprime:

Finxit in effigiem moderantum cuncta Deorum,
Pronaque cum spectent animalia caetera terras,
Ois homini sublimis dedit, calumque tueri
Jussit, & erectos ad sidera tollere vultus. *Met. I. 13.*

Pittagora diceva, che gli uomini dovrebbero occuparsi in due soli studi, in quello della Natura, per illuminare lo spirito, e in quello della Virtù per regolare il cuore. Lo studio della Morale si riguarda con tutta ragione come il più necessario e il più degno dell'uomo: A proper study
of

of mankind is man, dice il Pope; ma sarebbe in errore chi pensasse poter essere vero Filosofo senza lo studio delle Scienze naturali. Per essere saggio non per debolezza, ma per principio, bisogna saper riflettere, e ragionar con soarezza; bisogna a forza di studio, sciogliersi da' pregiudizj, che ingannano l'intelletto, che impediscono di svilupparsi alla ragione e allo spirito. Pittagora non ammetteva alla sua Scuola discepoli, che non sapessero le Matematiche, e stava scritto sulla sua porta, nemo Geometriae expers intrato; la morale sarebbe per noi poco sicura, e poco amabile, se dovesse essere fondata sull'ignoranza o sull'errore.

Devesi forse contar per nulla il vantaggio d'essere dallo studio assicurato contro la disgrazia dell'ignoranza? Può forse risguardarsi senza un senso di compassione e di vergogna la stupidità di quei popoli, che una volta credevano col loro gridare in tempo d'Ecclissi di Luna di porgere qualche rimedio alli dolorosi patimenti di quella Dea, o che l'Ecclissi fossero prodotte da Incantatori?

Cum frustra resonant æra auxiliaria Lunæ. *Met. IV. 333.*

Cantus & e curra Lunam deducere tentat,

Et faceret, si non æra repulsa sonent. *Tib. I. El. 8.*

Ma passando questo errore, che degrada il popolo, si hanno nelle Storie certi tratti, che mostrano il discapito di alcuni Generali, e intere Nazioni in certi incontri, prodotto dall'ignoranza in materia d'Astronomia. Nicias Generale degli Ateniesi avea pensato di abbandonare la Sicilia con la sua armata; ma ecco che un' Ecclissi di Luna lo colpì in modo, che gli se perdere il momento favorevole, e fu poi causa della morte del Generale, e della rovina della sua armata; perdita sì funesta per gli Ateniesi, che fu poi l'epoca della decadenza della loro patria. Alessandro ancora prima della battaglia d'Arbella spaventato da un' Ecclissi Lunare, comandò che si facessero de' sacrificj al Sole, alla Luna, alla Terra, come a Divinità, che producevano queste Ecclissi.

Al contrario si veggono de' Generali più informati, ai quali non furono inutili le loro astronomiche cognizioni. Mentre Pericle guidava la flotta degli Ateniesi accade un' Ecclisse del Sole, che spaventò tutti, e fece tremare anche il Piloto; ma Pericle lo quietò con un esempio familiare: preso il lembo del suo mantello coprì allo stesso Piloto gli occhi dicendogli, credi tu che questo coprirà gli occhi, sia indizio di qualche disgrazia? no certamente, rispose il Piloto; ma pure questo per te è un' Ecclissi, niente diversa da quella che hai ora veduta, se non in quanto la Luna per essere più grande del mio mantello, occulta il Sole a maggior numero di gente.

Anche Agatocle Re di Siracusa in una guerra d'Africa, e in un giorno decisivo vedendo spargersi nella sua armata un terrore universale a

vista d'un' Ecclisse, si presentò a' suoi soldati, spiegò loro la causa, e li liberò da ogni timore. Simili fatti si raccontano di Sulpicio, e di Dione Re di Sicilia. Vedremo tra poco altri esempj delle cognizioni astronomiche ne' più grandi Principi.

Leggesi un fatto, che istessamente onora l' Astronomia, nella Lettera dal Rojas scritta a Carlo V. nel dedicargli i suoi Commenti sul Planisferio. Cristoforo Colombo Comandante dell' armata spedita da Ferdinando Re di Spagna alla Giamaica sul principio della scoperta di detta Isola, si trovò in mancanza tale di viveri, che non restavagli speranza alcuna di salvare l' armata, anzi vedeva che sarebbe per essere vittima de' Selvaggi. Era vicina a succedere un' Ecclissi di Luna, e di essa se ne servì questo bravo Comandante, per liberarsi da ogni pericolo; fece perciò dire ai Capi de' Selvaggi, che se fra poche ore non li mandassero quanto loro chiedeva li esporrebbe alle disgrazie più estreme, e principierebbe dal privar la luna di luce. I Selvaggi spreggiarono sulle prime tali minaccie; ma quando videro infatti cominciar la Luna a venir meno, colpiti dal terrore rassegnarono a' piedi del Generale quanto avevano, chiedendogli umilmente perdono.

Uno de' vantaggi prodotti dal progresso dell' Astronomia si fu il dissipar che fece gli errori dell' Astrologia. Quanto non deve esaltare chi perfezionò l' Astronomia, a segno di liberare gli uomini da questa miserabile debolezza, da cui furono per sì gran tempo dominati! Non posso a questo proposito omettere il racconto di ciò che avvenne nel 1186, per cui dovettero coprirsi di rossore gli Astrologhi tutti di tutta l' Europa; Cristiani, Giudei o Arabi, tutti s' erano uniti concordemente a predire sette anni prima, per via di Lettere sparse solennemente per l' Europa, una congiunzione di tutti i Pianeti, accompagnata da sì spaventevoli rovine, onde avea a temersi un' eccidio universale; si credeva di aver a vedere il fine del Mondo; pure quell' anno si passò come gli altri. Ma cento altro menzogne egualmente, che questa, scoperte, non sarebbero state bastevoli a levare dagl' ignoranti e creduli il pregiudizio dell' infanzia; vi fu necessario uno spirito filosofico e scrutatore, sparso fra gli uomini, che sviluppasse loro l' idee dell' estensione e de' limiti della Natura, e li affacciasse a non più spaventarsi in avvenire di cose non esaminate, e non provate.

Si scorgono ancora di quando in quando questi delirii dell' ignoranza accreditati e sostenuti dalla credulità del Pubblico. Quindi il furioso vento, e l' straordinario caldo del dì 20 Ottobre 1736 eccitarono alcuni a pubblicare nelle Gazzette, che il Sole era tornato in dietro, e bisognò che i saggi se dessero la pena di disingannare il Pubblico. (Journ. de Trévoux, Avril 1737, pag. 692. Lettre philosophique pour rassurer l' Univers, &c. a Paris, Chez Fraut pere, Quai de Gèvres, 1736. 32 pages in 12). Tutto il mondo verso il fine del 1768 credeva perdutosi

Sa-

Saturno, e si pubblicava negli scritti periodici i più sensasi, e nelle compagnie le più colte. Ma questo è niente in paragone della stravagante sensazione prodottasi da una Memoria sulle Comete sul principio di Maggio 1773. Io non avea se non parlato di quelle, che potrebbero in certi casi avvicinarsi alla terra, e si sparse quasi generalmente per Parigi, essersi stata da me predesta una straordinaria Cometa, che porterebbe il fine del mondo. Quando l'ammasso delle cognizioni sparse nelle nostre Città si sarà più diffuso, non si vedranno più simili delirii favoriti dal Pubblico.

Le Comete furono per lungo tempo, ma in senso diverso, oggetto del più gran terrore, dissipatosi già finalmente dall'Astronomia anche nel popolo. Con isdegno si trovano dei pregiudizj sì strani, non solamente in Omero (Iliad. IV. 75), ma nel più bel poema ancora dell'ultimo secolo, in cui possono eternarsi con vergogna i nostri errori:

Qual con le chiome sanguinose orrende
Splender Cometa suol per l'aria adusta,
Ch' i regni muta, e i fieri morbi adduce,
Ai purpurei tiranni infautta luce. Geruf. Lib. VII. 52.

Gli incanti della Poesia sono al dì d'oggi impiegati in modo assai più filosofico e più utile; e testimonianza ne faccia il bel passo del Sig. de Voltaire sulle Comete nella sua Lettera a Madam. la Marchesa du Châtelet:

Cometes, que l'on craint à l'égal du tonnerre,
Ceffez d'épouvanter les peuples de la terre;
Dans une ellipse immense achevez votre cours,
Remontez, descendez près de l'astre des jours;
Lancez vos feux, volez, & revenant sans cesse,
Des mondes épulsés ranimez la vicillesse.

Lo studio appunto profondo, e i progressi appunto dell'Astronomia dissiparono quegli assurdi pregiudizj, e ritornarono ogni suo dritto alla nostra ragione. Ma non a ciò solo ostendesi il vantaggio di questa scienza, che contribuisce di più al ben generale in più d'un genere.

È notissimo, che la Geografia e la Cosmografia non possono dispensarsi dall'Astronomia. Dalle osservazioni dell'altezza del polo s'arrividero gli uomini che la Terra era rotonda; l'Eclissi della Luna s'impiegarono per conoscere le longitudini de' diversi paesi della terra. Noi non sappiamo diceva Ipparco (citato dallo Strabone) se Alessandria sia al Nord o al Sud di Babilonia senza l'osservazione de' Climi, nè può sapersi se un paese rispetto a un altro sia Occidentale o Orientale, senza l'osservazione delle Eclissi. Si sa dall'Alcorano che i viaggiatori traversavano i deserti dell'

Ara-

Arabia, offeruando gli *Astri*; Dio, diceva egli, ci diede le stelle che ci guidassero nell'oscurità sulla terra e sul mare; e ciò s'accorda con quel che riferisce *Diodoro Siculo* intorno agli antichi viaggiatori.

La scoperta de' *Satelliti* di *Giove* perfezionò tanto le nostre Carte Geografiche e marine, quanto non si sarebbe fatto dopo dieci mille anni di navigazione e di viaggi; e quanto più si farà nota la loro Teoria, tanto sarà più esatto e facile il metodo delle longitudini.

Verso l'anno 1600 era quasi incognita l'estensione del Mediterraneo, e presentemente la si conosce tanto quanto quella della Francia. Nel Libro de *Gemma Frisio* de orbis divisione 1530, la differenza di longitudine tra il Cairo e Toledo si legge di 53° invece di 35° come è le altre distanze vi sono determinate a proporzione; rispetto all'estremità del Mar nero abbiamo anco un'incertezza di tre in 4 gradi, e prima del 1769 nella longitudine di *Gibilterra* e *Cadice* v'era un errore di 30 minuti.

I Fenici furono debitori all'Astronomia per le prime loro navigazioni, e noi lo siamo parimenti per la scoperta del nuovo Mondo. *Cristoforo Colombo* sapeva benissimo la sfera, forse più che altri del suo tempo; e da essa ne trasse quella certezza, e confidenza, con cui s'indirizzò verso l'occidente, sicuro di trovare all'Oriente il continente dell'Asia, o un nuovo Mondo.

Presentemente altro non resta da desiderare per la perfezione e sicurezza del navigare, che la facilità di trovare le longitudini in mare; si hanno, quando si vogliano per mezzo della Luna (Le Mostre Marine fatte in *Inghilterra* dall'*Harrison*, e in *Francia* dal *Berthoud* e *Leroy*, ce le danno dentro un mezzo grado in due mesi di viaggio); e se i Navigatori fossero per poco Astronomi, non s'ingannerebbero mai nella stima del viaggio di 20 leghe, mentre nei viaggi più comuni s'ingannano alle volte per più di duecento. L'incertezza di *Milorà Anson* sull'Isola di *Juan Fernandez*, per cui si trattene in mare più del bisogno, cagionò la morte a 80 uomini del suo equipaggio.

Dall'utilità adunque della Marina per il bene d'uno stato si prova quella dell'Astronomia; e mi sembra difficile trovare un buon Cittadino, che possa al di d'oggi specialmente in *Francia* spreggiare il vantaggio della marina. L'esito degli *Inglese* nella guerra del 1761 mostrò ben chiaramente, che la sola Marina decide degl'Imperi, della loro potenza e del loro commercio; che la pace e la guerra si disputano sul mare, che finalmente come dice il *Sig. le Miers*:

Le trident de Neptune est le sceptre du Monde.

E questo è in circa quanto dicevano *Temistocle* in *Atene*, *Pompeo* a *Roma*, (Cic. ad Att. L. X. Ep. 7), *Cromwell* in *Inghilterra*, *Richelieu*

lieu e Colbert in Francia ; sembra che specialmente il Cardinale Richelieu (Testament politique , ch. IX. sect. 5) prevedesse rispetto all' Inghilterra , quanto noi abbiamo provato .

Lo Stato attuale delle Leggi , e l' amministrazione ecclesiastica , sono essenzialmente legate coll' Astronomia , riguardo al Calendario . Per questo solo pensiero S. Agostino ne raccomandava lo studio ; S. Ippolito e molti Padri della Chiesa vi si erano esercitati . Nonostante il nostro Calendario era a segno imperfetto , che li Giudei stessi e i Turchi avrebbero con ragione potuto stupirsi della nostra ignoranza su questo punto . Pensarono ben invano Niccolò V , Leone X , ec. a riordinare il Calendario medesimo , ma non v' erano Astronomi da potersi fidare . Gregorio XIII. regnò in un tempo , in cui le scienze cominciavano a rinascere , e fu di lui solo la gloria di tale riforma nel 1582 .

L' Agricoltura prendeva un tempo le sue regole e i suoi indizj dall' Astronomia : Giobbe , Esodo , Varione , Eudossio , Arato , Ovidio , Plinio , Columella , Manilio , ce ne somministrano mille prove : le Plejadi , Arturo , Orione , Sirio davano il segnale alla Grecia e all' Egitto dei diversi lavori per la Campagna . Il levar di Sirio annunziava ai Greci il tempo della Messa , e agli Egiziani la inondazione del Nilo : si potrebbero addurre degli altri esempj , e presentemente vi supplisce il Calendario . Il Sig. de Gebelin in una dottissima opera si studia di provare , che tutta la mitologia antica , si rapporta all' Agricoltura . (Allégories orientales , 1773) .

La Cronologia antica dalla cognizione e dal calcolo delle Ecclissi ne deduce i punti più fissi che si possano ritrovare , e nei tempi più rimoti non si ha che oscurità . La Cronologia Chinesa è tutta fondata sull' Ecclissi , come lo ha verificato il P. Gaubil . Nella Storia delle Nazioni non avremmo alcuna incertezza , se vi fossero sempre stati degli Astronomi . La Connessione fra l' Astronomia e la Cronologia può vedersi specialmente nell' Art de vérifier les dates in foglio 1770 ; e nella Opera Inglese di Kennedy , A complete system of astronomical chronology , London 1762 in 4º .

L' errore che v' ha nella data dell' era volgare rispetto alla nascita di G. C. si riconosce da una Ecclisse di Luna . Si sa che Erode era Re della Giudea ; ma sappiamo altresì da Gioseffo (Antiq. Jud. XVII. 6) essere accaduta un' Ecclisse di Luna immediatamente prima della morte dello stesso Erode ; la quale Ecclisse trovandosi cadere nella notte dei 12 , o 13 Marzo del quarto anno , prima dell' Era volgare , si rileva , che questa Era doveva retrocedere almeno di tre anni .

Col mezzo dell' Ecclissi del Sole il Sig. Costard fissò il fine della guerra fra i Lidi e i Medi nell' anno 603 prima di G. C. e la spedizione di Xerse contro la Grecia nell' anno 478 , non già nel 480 , come si era fissata (Costard hist. of astron. p. 236) ; e in tal modo concilia insieme Erodoto e Xenofonte riguardo alla conquista della Media fatta da Ciro .

Dalla stessa Astronomia abbiamo la divisione del tempo nell' uso civile ;
e l'

e l' arte di regolare gli Orologi e le Mafre : può dirfi che l' ordine e la moltiplicità de' noftri affari, doveri e divertimenti , il gufto dell' efattezza e della precisione , il noftro abito fteffo in fine ci rendono quafi indifpenfabile quefta mifura del tempo , e ce la coftituiscono uno fra i bifogni della vita.

Se in mancanza di Orologi e di Mafre fi defcrivano delle Meridiane (155) e degli Orologi folari , farà fupplito alla fteffa mancanza per beneficio dell' *Aftronomia*, altro non effendo la *Gnomonica*, che un' applicazione della *Trigonometria fferica* e della *Aftronomia*.

La *Meteorologia* , cioè la cognizione delle varie mutazioni dell' aria , dei venti , delle pioggie , delle ficcità , dei movimenti del Termometro e del Barometro ha certamente rapporto effenziale e immediato colla fanità del corpo umano. E credibiliffimo che l' *Aftronomia* v' apporterebbe un fenfibile vantaggio , fe per via d' offervazioni fi foftero trovate le influenze fifiche del fole e della luna full' atmosfera , e le rivoluzioni che quindi ne rifultano. Galeno avverte gli ammalati a non metterfi in mano di Medici , che non conofchino il corfo degli aftri , effendo inutili o anche nocevoli i medicamenti apprefati fuor di tempo . Veramente io non dubito punto , che Galeno non parlaffe allora fecondo i principj dell' *Aftrologia giudiciaria* e delle influenze , che fi credevano per una ignorante fupervifizione ; ma a dirla giuftamente , fembra che le attrazioni , le quali innalzano due volte al giorno le acque dell' oceano , poffino in qualche modo influire sullo ftato dell' atmosfera . In quefto propofito fi poffono consultare l' Hoffinan e il Mead , che ne parlarono affai diffufamente , e l' articolo Crife nella *Enciclopedia* . Io desidererei che i Medici fu quefto punto confultaffero almeno l' efperienza , e che efaminaffero , fe le crifi e i paroffiffimi delle malattie aveffero qualche correfpondenza col fto della luna rifpetto all' equatore , alle Sizigie e agli apfidi ; molti dotti Medici me ne parvero perfuafi ; e per impegnarli in tali ricerche , io pubblicai per alcuni anni nella *Gazzetta di Medicina* un dettaglio delle circoftanze aftronomiche , che fi erano notate .

In grazia di tali diverfi vantaggi dell' *Aftronomia* , quefta fcienza fi ricercò in ogni tempo e da ogni nazione . Giofeffo nelle fue *Antichità Giudaiche* mofta , che il gufto dell' *Aftronomia* e le prime fcoperte furono dal tempo di Adamo . Scrive che i difcendenti di Set aveanvi fatto dei progreffi notabili , e che per confervarne la memoria , aveano incife le loro offervazioni aftronomiche fu delle colonne di pietra , e fu de' mattoni . Le prime cognizioni degli Egiziani fi attribuiſcono dallo fteffo Autore ad *Abrahamo* . Nel *Libro di Giob* fi leggono molti paſſi aftronomici : Nunquid conjungere valebis micantes ſtellas Pleyadas , aut gyrum Arcturi poteris diffipare ? Nunquid producis Luciferum in tempore ſuo , & Vesperum ſuper filios terræ conjungere facis ? (38. 31). Anche a Moſè fi attribuiſcono ſimili cognizioni : almeno S. Steffano negli *Atti degli Apoftoli* dice ch' egli era verſato in omni Sapiencia Ægyptiorum ; il che non do-
vea

vea intendersi che della cognizione degli Astri , per cui s' erano resi celebri gli Egizj .

La Sapienza grida con ragione contro di quelli , che per la loro ammirazione fecero degli Astri tante Deità ; ma ben lungi però dal condannarne lo studio , lo consiglia piuttosto per gloria del Creatore : Qui horum pulchritudine delectati Deos putaverunt , sciant quanto his Creator eorum speciosior est ; a magnitudine enim speciei & creaturæ cognoscibiliter poterat Creator horum videri (Sap. c. 13). Anche Davide trova negli Astri motivo , onde innalzarsi alla contemplazione di Dio : Cœli enarrant gloriam Dei ----- Videbo cœlos tuos opera digitorum tuorum , Lunam & Stellæ , quæ tu fundasti . Veggiamo dal Derham intitolarsi Théologie astronomique un' Opera , in cui dallo stesso si presentano in tutta la loro forza il singolare e il grande delle scoperte fatte in Astronomia , come altrettante prove dell' esistenza di Dio . Leggasi nell' ottavo Libro della Fisica d' Aristotele il pensare di lui stesso su questo punto .

Chi si diletta di leggere la Storia antica , i Fisici e Poeti Greci e Romani , avrà bisogno specialmente dell' Astronomia ; in ogni pagina degli antichi se ne trova vestigio , o per contrassegnare il tempo dei lavori e delle semine , o per le Feste e riti religiosi . I Poeti che illustrarono la Grecia e l' Italia , e l' opere dei quali sono oggidì sicure dell' immortalità , erano tutti portati per l' Astronomia ; e alcuni l' adoperano sì spesso , che senza di questa scienza non si potrebbero certamente intendere . I Commentatori non hanno molto illustrata questa parte , ed io fui nell' occasione di notare , che vi restava molto su questo punto ; come si può vedere dalle diverse note , che ho io somministrate all' Ab. de l' Isle per la di lui traduzione delle Georgiche , al Sig. de la Bonnetterie per la di lui edizione degli Autori de Re Rustica , e al Sig. Poinfinet per la nuova di lui traduzione di Plinio . Fra i Greci che parlarono d' Astronomia si possono annoverare Omero , Esiodo , Arato ; fra i Latini Lucrezio , Orazio , Virgilio , Ovidio , Manilio , Lucano , Claudiano ; si trovano essi pieni d' ammirazione per l' Astronomia in molti luoghi delle loro opere . Ecco Ovidio

----- juvat ire per alta

Astra , juvat terris & inertis sede relicta ,

Nube vehi , validique humeris insidere Atlantis. Met. XV. 146.

Orazio racconta gli oggetti di curiosità e di ricerche , delle quali invidiava lo studio in un suo amico :

Quæ mare compescant causæ , quid temperet annum ,

Stellæ sponte sua , jussæ ne vagentur & errent ,

Quid premat obscurum Lunæ , quid proferat orbem .

L. I. ep. 12. ad Iccium .

c

Vir.

Virgilio sembra volere abbandonare ogni altro studio, per trattenerfi a considerare le meraviglie dell' Astronomia:

Me vero primum dulces ante omnia Musæ,
Quarum sacra fero ingenti percussus amore,
Accipiant: cælique vias & sidera monstrent,
Defectus Solis varios, Lunæque labores,
Unde tremor terris; qua vi maria alta tumescant
Objicibus ruptis, rursusque in se ipsa residant;
Quid tantum Oceano properent se tingere soles.
Hyberni, vel quæ tardis mora noctibus obset -----
Felix qui potuit rerum cognoscere causas. *Georg. II. 475.*

Lo stesso Ovidio tesse un elogio sì magnifico dei primi Inventori dell' Astronomia, che non posso tralasciare di descriverne una parte:

Felices animos, quibus hæc cognoscere primis,
Inque domos superas scandere cura fuit;
Credibile est illos pariter vitiisque locisque
Altius humanis exeruisse caput.
Non venus aut vinum sublimia pectora fregit,
Officiumve fori, militiæve labor;
Nec levis ambitio, persulsaque gloria fuco,
Magnarumve fames sollicitavit opum.
Admovere oculis distantia sidera nostris,
Ætheraque ingenio supposuere suo.
Sic petitur cælum ----- *Fast. I. 297.*

La cognizione degli Astri ha prodotta molte bellezze nelle opere degli antichi Poeti; appresso i quali scorgesi di rado quell' ignoranza, che deforma qualche opera moderna: tale è quella di quel Poeta, che parlando dei due poli, suppone che l' uno sia il Pole brulant, e l' altro il Pole glacé (M. de Jarry, Prix de 1714).

La Fontaine parla dell' Astronomia con somma nobiltà esprimendesi così:

Quand pourront les neuf Sœurs, loin des cours & des villes,
M' occuper tout entier, & m' apprendre des cieux
Les divers mouvemens inconnus à nos yeux,
Les noms & les vertus de ces clartés errantes.

Songe d'un Habitant du Mogol.

Il Sig. de Voltaire non solo il primo Poeta del nostro secolo, ma il più dot.

dotto, che possa mai essere stato, mostrò in diversi luoghi delle sue opere, quanto è il suo gusto per la Fisica celeste. In una Lettera scritta nel 1738 sembrava dolerli come Virgilio e la Fontaine, e si mostrava portato intieramente verso le Scienze; scrisse sulla Fisica del Newton un Libro, che gli rese dell' onore, e ne diede molto anche alle Scienze e ai Dotti di cui causò in bellissimi versi, e specialmente al Newton, di cui parla anche in una Lettera a Madam. la Marchesa di Châtelet.

Confidens du Très-Haut, Substances éternelles,
Qui parez de vos feux, qui couvrez de vos alles
Le Trône où votre Maître est assis parmi vous:
Parlez! Du grand Nevvton n' étiez-vous point jaloux?

Non si possono con questi paragonare se non i due versi del Pope sullo stesso soggetto, che non ardisco tradurre per non indebolirli:

Nature, and Nature's lavvs lay hid in night;
God said: let Nevvton be, and all vvvas light.

Non vi fu mai uomo tanto degno di questi elogi sublimi, e sì degnamente celebrato.

L' indifferenza per lo spettacolo più bello dell' Universo parve strana ai più gran genii che abbiamo in ogni genere. Il Tasso mette in bocca a Rinaldo delle riflessioni, che meritano d' essere riportate per istruzione di quelli, i quali si potrebbero similmente rimproverare; Egli portandosi avanti di verso il monte oliveto contemplava la bellezza del Cielo:

Con gli occhi alzati contemplando intorno
Quinci notturne, e quindi mattutine
Bellezze incorruttibili e divine,
Fra se stesso pensava, o quante belle
Luci il tempio celeste in se raguna!
Ha il suo gran Sole il dì, l' aurate stelle
Spiega la notte, e l' argentata Luna;
Ma non è chi vagheggi o questa o quelle;
E miriam noi torbida luce e bruna,
Ch' un girar d' occhi, un balenar di riso,
Scopre in breve confin di fragil viso!

Gerus. lib. Cant. XXIII. v. 94.

Gli onori resi in ogni tempo e da ogni nazione ai celebri Astronomi sono una prova della stima che si ebbe sempre di questa Scienza. Nel 1695 si vide coniatà una medaglia in onore del Cassini, (vedesi rappresentata

nella descrizione della Meridiana di Bologna); ma nella Storia antica trovansi de' tratti più luminosi in favore dell' Astronomia: Gli antichi Re di Persia e i Sacerdoti Egiziani si sceglievano tra i più dotti in questa Scienza. I Re Spartani adoperavano degli Astronomi nel loro consiglio; e Alessandro se li conduceva dietro nelle sue spedizioni militari; e Aristotele ci attesta, che dal medesimo non intraprendevasi cosa alcuna senza consultarli; è bensì vero, che aveavi molto luogo il gusto delle predizioni; ma la vera Astronomia ne profitò. E noto quanto Tolommeo Filadelfo, secondo Re d' Egitto, favorisse questa Scienza; si videro fiorire al di lui tempo molti celebri uomini, Ipparco, Callimaco, Apollonio, Arato, Bione, Teocrito, Conone, che non erano già Astrologhi.

Giulio Cesare compiacevasi di avere delle cognizioni singolari d' Astronomia, come si rileva dal discorso che Lucano gli fece fare ad Acoreo Sacerdote Egiziano nel pasto di Cleopatra. Tiberio, secondo Svetonio, era molto applicato all' Astronomia. L' Imperatore Claudio prevedendo un' eclisse in un giorno anniversario della sua nascita, e temendo potersi per ciò spargere in Roma qualche terrore o tumulto, ordinò che se ne avvisasse il Pubblico, e si spiegassero le circostanze e le cause di tale fenomeno.

L' Astronomia fu specialmente coltivata dagl' Imperatori Adriano e Severo, da Carlo Magno, da Leone V. Imperatore di Costantinopoli; da Alfonso X Re di Castiglia, di cui abbiamo le Tavole Alfonsine, da Federico II, Imperatore d' Occidente; che fece tradurre in Latino l' opera di Tolommeo, e ne piantò in Napoli una pubblica Scuola.

Nella mia Astronomia si può vedere quanto questa Scienza si apprezzava dal Califo Almamun, dal Principe Ulug-Beg, e da molti altri Monarchi dell' Asia e della China. E noto, dice il P. Gaubil, che la Religione entrò nella China per mezzo dell' Astronomia; senza la quale ne sarebbe da gran tempo sbandita. (T. II. p. XVI, e p. 117). Fra gli Eroi che amarono questa Scienza si annoverano Maometto II, Conquistatore dell' Impero Greco, l' Imperatore Carlo V, Carlo II Re d' Inghilterra e sopra tutto Luigi XIV; la di cui protezione per le Scienze si mostrò bastantemente nella Fondazione dell' Accademia; gli Astronomi di Parigi furono più d' una volta chiamati alla Corte dalla curiosità di questo Principe, e furono dalla di lui presenza onorati (Histoire Celeste p. 261). Luigi XV. diede loro ogni giorno de' contrassegni del suo impegno e gradimento per le loro fatiche; il Re d' Inghilterra se n' occupa egli stesso con piacere, e si fece costruire un bellissimo Osservatorio per suo uso nel Castello di Richemond.

Evelio, quantunque nato e stabilito a Danzica, vi sperimentò una prova singolare della stima che di lui avevano Luigi XIV e il gran Colbert; e fu dopo lo spaventevole incendio, cui andò soggetto li 26 Settembre 1679 per malizia d' un suo domestico: Colbert con Lettera della

28 Dicembre 1679 da S. Germain scrisse all' *Evelio*, che il Re interessandosi per lui nella perdita che avea fatta, gli regalava 2000 Scudi. Leggesi copia di questa Lettera, manoscritta nella *Selenografia* d' *Evelio*, che conservasi nella Biblioteca del Re.

Con tali prove di protezione e di stima possono sostenerfi e perfezionarsi le Scienze tanto ingrate verso i loro coltivatori. La Fondazione delle Accademie di Londra, Parigi, Berlino, Petersburg, Stockholm, Bologna ecc. ha segnalato il gusto di molti Principi e altri Personaggi per le Scienze, e contribuirano specialmente al progresso dell' *Astronomia*.

Indipendentemente da queste celebri Società vi sono quattro Fondazioni, che principalmente promouessero l' *Astronomia* o col formarne degli Allievi, o col facilitare i mezzi a degli Astronomi già celebri per soddisfare il loro genio; il Collegio Reale di Francia, il Collegio di Gresham a Londra, e le Fondazioni d' Oxford e di Cambridge in Inghilterra; io ne parlai molto a lungo nella Prefazione della mia *Astronomia*, come anche di tutti i celebri Osservatorj, nei quali finora sonosi fatte importanti osservazioni. Il numero di questi Osservatorj s' accresce di giorno in giorno; v'è il progetto per uno ancora in *Versailles*; e noi possiamo con fondamento sperare, che l' *Astronomia* avrà ben presto quel progresso, che esige un gran numero di cooperatori.



T A V O L A

Dei dodici libri , che compongono quest' Opera ,
e delle loro suddivisioni .

L I B R O P R I M O .

D ella sfera e delle costellazioni .	Pag. 1
Trovare l' altezza del polo per mezzo delle stelle .	9
Della grandezza della terra .	11
Delle latitudini geografiche , o terrestri .	12
Delle longitudini geografiche .	13
Del moto proprio della luna , e delle sue fasi .	15
Del moto annuo , e dell' eclittica .	16
Dell' obliquità dell' eclittica , e de' tropici .	19
Moto del sole .	21
Dei pianeti in generale .	23
Delle ascensioni rette , declinazioni , longitudine , e latitudine degli astri .	24
Della sfera armillare .	26
Della sfera retta , obliqua , e parallela .	28
Delle stagioni , e dei climi .	32
Delle zone terrestri .	35
Degli antipodi .	37
Tirar una linea meridiana .	39
Del globo celeste artificiale , e dei suoi usi .	42
Dalla nota latitudine d' un paese terrestre e dal noto levare del sole in ciascun giorno dell' anno , trovare l' ora del levare e tramontare del sole .	43
Trovare , quali sono i due giorni dell' anno , nei quali il sole leva in un dato luogo all' ora marcata .	44
Trovare i punti dell' orizzonte , nei quali leva il sole ogni giorno .	45
Trovar l' ascension retta del sole per ogni giorno .	ivi
Trovar a qualunque ora l' ascensione retta del mezzo del cielo .	ivi
Trovare a qual ora il sole deve aver un certo grado d' azimuto in un giorno dato .	47
Trovare , qual sia l' altezza d' un astro in un istante dato .	48
Trovare l' ora della culminazione d' una stella o del suo passaggio per il meridiano .	ivi
Trovare in qual giorno una stella si leva ad una certa ora .	49
Trovare il giorno del tramontare eliaco d' una stella , cioè , il giorno , in cui cesserà di vedersi la sera dopo il tramontare del sole .	50
Del globo terrestre artificiale , e dei suoi usi .	52
Delle costellazioni .	54
Tavo-	

<i>Tavola delle cento costellazioni, solite a porsi nei globi celesti.</i>	55
<i>Tavola dell'ora, in cui passano per il meridiano le principali stelle nel primo giorno di ciascun mese, coll' altezza meridiana per Parigi.</i>	57
<i>Descrizione generale delle costellazioni, e metodo di conoscere le stelle per via di certe collineazioni.</i>	58
<i>Delle stelle cangianti e nebulose.</i>	65

LIBRO SECONDO.

<i>I fondamenti dell'astronomia, e i sistemi del mondo.</i>	69
<i>Del moto, e delle disuguaglianze del sole.</i>	70
<i>Metodo delle altezze corrispondenti.</i>	76
<i>Descrizione del quadrante mobile.</i>	79
<i>Della misura del tempo.</i>	83
<i>Trovare il tempo vero d' un' osservazione.</i>	85
<i>Dell' equazione del tempo.</i>	86
<i>Del passaggio per il meridiano, del levare e del tramontare degli astri.</i>	89
<i>Del sistema del mondo.</i>	91
<i>Del sistema di Copernico.</i>	95
<i>Del sistema di Ticone-Brabe.</i>	99
<i>Obbiezioni contro il sistema di Copernico.</i>	102
<i>Spiegazione dei fenomeni nel sistema di Copernico.</i>	106
<i>Moti dei pianeti veduti dalla terra.</i>	109
<i>Delle rivoluzioni planetarie.</i>	117
<i>Delle equazioni secolari.</i>	118
<i>Ritorno dei pianeti all' istesso sito.</i>	119
<i>Stazioni e retrogradazioni dei pianeti.</i>	120

LIBRO TERZO.

<i>Teoria del moto dei pianeti intorno al sole.</i>	122
<i>Del moto ellittico.</i>	127
<i>Dell' equazione dell' orbita.</i>	131
<i>Determinazione degli aseli.</i>	135
<i>Metodo per correggere in una volta i tre elementi d' un' orbita.</i>	136
<i>Dei nodi, e delle inclinazioni dei pianeti.</i>	138
<i>Delle inclinazioni.</i>	140
<i>Dei diametri dei pianeti, e dei micrometri che servono a misurarli.</i>	142

LIBRO QUARTO.

<i>Dei moti della luna, e del calcolo delle parallassi.</i>	147
<i>Delle irregolarità della luna.</i>	151
<i>Dei nodi, e dell' inclinazioni dell' orbita lunare.</i>	153
<i>Del</i>	

<i>Del diametro della luna.</i>	154
<i>Della parallasse della luna.</i>	155
<i>Metodi per trovare la parallasse orizzontale d' un pianeta.</i>	158

LIBRO QUINTO.

<i>Delle eclissi.</i>	163
<i>Delle eclissi della luna.</i>	166
<i>Trovare le fasi d' una eclisse di luna.</i>	167
<i>Delle eclissi del sole.</i>	170
<i>Trovare le fasi d' un' eclisse del sole col metodo delle proiezioni.</i>	180
<i>Trovare le fasi d' una eclisse di sole , o di stella con la riga e col compasso.</i>	187
<i>Uso delle eclissi per trovare le longitudini geografiche.</i>	192
<i>Dei passaggi di venere e di mercurio sotto al sole.</i>	195

LIBRO SESTO.

<i>Delle rifrazioni.</i>	199
<i>Metodo di trovare le rifrazioni astronomiche.</i>	202

LIBRO SETTIMO.

<i>Dei moti delle stelle fisse.</i>	206
<i>Dell' aberrazione delle stelle.</i>	209
<i>Della nutazione.</i>	215

LIBRO OTTAVO.

<i>Della figura della terra.</i>	210
<i>Della figura e schiacciamento della terra.</i>	211

LIBRO NONO.

<i>Dei satelliti di giove e di saturno.</i>	227
<i>Ineguaglianze de' satelliti.</i>	229
<i>Dell' eclissi de' satelliti.</i>	233
<i>Dei satelliti di saturno.</i>	238

LIBRO DECIMO.

<i>Delle comete.</i>	242
<i>Diverse opinioni sulle comete.</i>	244
<i>Del moto parabolico delle comete.</i>	245
<i>Del ritorno delle comete.</i>	251
<i>Diverse osservazioni sulle comete.</i>	253

LIBRO UNDECIMO.

<i>Della rotazione de' pianeti, e delle loro macchie.</i>	258
<i>Dell' equatore, e della rotazione del sole.</i>	262
<i>Della rotazione lunare, e della librazione.</i>	266
<i>Della rotazione e figura degli altri pianeti.</i>	268
<i>Della pluralità de' mondi.</i>	270

LIBRO DUODECIMO.

<i>Della gravità o attrazione de' pianeti.</i>	272
<i>Della forza centrale nelle orbite circolari.</i>	281
<i>Del moto ellittico dei pianeti.</i>	289
<i>Delle ineguaglianze prodotte dall' attrazione.</i>	291
<i>Del moto degli apfidi.</i>	298
<i>Del moto dei nodi dei pianeti.</i>	299
<i>Del flusso e riflusso del mare.</i>	302
<i>Tavola che contiene il risultato delle osservazioni più recenti sulle rivoluzioni, grandezze e distanze de' pianeti.</i>	313

Fine della Tavola de' Libri.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione ed Approvazione del Pubblico Revisor *D. Natale dalle Laste* nel libro intitolato : *Compendio d' Astronomia colle Tavole Astronomiche ec. MS.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza a *Marcantonio Manfrè Stampator di Venezia* che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia e di Padova.

Dat. li 22. Aprile 1776.

(ALVISE VALLARESSO RIF.

(ANDREA TRON CAV. PROCUR. RIF.

(GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN CAV. RIF.

Registrato in Libro a Carte 316. al Num. 614.

Davidde Marchesini Segretario.

Addi 26. Aprile 1776.

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo contro la Bestemmia.

Gio: Pietro Dolfin Segretario.

COM.



COMPENDIO D' ASTRONOMIA.

LIBRO PRIMO.

Della Sfera e delle Costellazioni.

1.  Il metodo più semplice per imparar a conoscere il cielo e i suoi diversi moti, consiste in seguire l'ordine naturale delle cose, che vi si osservano, e dei rapporti che ne risultano. Noi vediamo tutti, che il Sole e la Luna levano, e tramontano ogni giorno; ma se noi passeremo una notte mirando le altre stelle, noi le vedremo parimenti levare e tramontare; e caveremo questa conclusione, che v'è un *moto comune*, per cui gli astri in generale fanno il giro della terra in 24. ore.

2. Se per contemplare più attentamente le circostanze di questo *moto diurno* un si posta in un luogo elevato e guarda intorno, non potrà a meno di osservare il cerchio il più apparente, che si chiama l'*Orizzonte*: Quel vasto contorno del cielo, che apparisce tutto intorno in forma di cerchio, e che da ogni parte termina la nostra vista, trovandosi in pieno mare, o in un luogo elevato, divide il cielo in due parti; ma solamente visibile è quella che resta sopra l'orizzonte, ed apparisce in forma di emisfero, o di una mezza palla. Gli astri non si rendono visibili se non quando arrivano in questo *emisfero superiore*, e allora diciamo che *nascono*, o *levano*.

3. Oltre questo primo cerchio, altri se ne presentano che sono quasi
A egual.

egualmente osservabili. Poichè esaminando il moto generale degli astri per una o più notti, si osserva ben tosto che ciascuna stella descrive un cerchio particolare nello spazio di 24. ore in circa: le stelle che sono più a tramontana descrivono dei cerchi più piccoli che le altre; e si vede che tutti questi cerchi percorri da differenti stelle diminuendosi sempre più, vanno in fine a perdersi e confondersi in un punto elevato della rotondità del cielo, che noi chiamiamo il *Polo del mondo*; quello che noi vediamo, è il *Polo boreale, artico, o settentrionale*.

4. Onde per formarci un'idea dell'Astronomia bisogna cominciare a conoscere il Polo del mondo, vale a dire, il luogo, verso il quale si trova situato nel cielo stellato. Si osserva in cielo una stella che v'è assai vicina, e che si chiama la *Stella Polare*. Questa stella essendo assai vicina a questo polo fisso; intorno il quale le altre stelle girano ogni giorno, pare sensibilmente nell'istesso luogo in qualunque ora e stagione dell'anno si guardi. Ma è ella la sola che gode di questa condizione; tutte le altre stelle descrivono dei centri intorno la stella polare, o più tosto intorno il polo, che è come il centro del moto, o il zocco della ruota. Faremo vedere nel corso di questa opera (art. 400.) che questi moti, che sono mere apparenze, provengono dal moto della terra; ma per ora noi dobbiamo, come gli antichi-astronomi, limitarci ad osservare i fenomeni senza salire alla cagione loro; il nostro progresso farà più naturale e più facile.

5. La stella polare potrebbe riconoscersi senza altra indicazione: un osservatore solo e isolato che non avesse mai contemplato il cielo, e che avesse solamente la pazienza di esaminare per una parte della notte le differenti stelle, osservando la loro altezza, e la loro posizione rispetto a dei campanelli, a dei monti, o altri oggetti rimarcabili, presto si accorgerebbe che v'è una bella stella, che conserva a presso poco una medesima situazione tutta la notte, e con ciò riconoscerebbe quella che si è dovuto chiamare stella polare. Se questa marca non bastasse, potrebbe l'osservatore applicarsi a quest'altro metodo.

6. Si conosce da per tutto quella costellazione, composta di 7. stelle, rappresentata nella Figura prima (Fig. 1.) che la gente di campagna chiama il *Carro*, perchè tiene infatti qualche apparenza di carro. Da gli astronomi viene chiamata l'*Orsa maggiore*. Se si tira una linea per le due stelle che sono più remote dalla coda, marcate α , e β , questa linea prolungata dalla parte della stella α , passerà molto vicina alla stella polare, che si trova in circa tanto lontana dalla stella α , quanto questa lo è dalla stella γ all'estremità della coda. La stella polare in certi tempi farà più alta dell'Orsa, in altri più bassa. Nel primo caso la linea, che deve andar a incontrar la stella polare, dovrà prolungarsi al di sopra della grande Orsa, e ciò accade quando al principio di Novembre la si riguarda due ore avanti mezza notte; all'opposto al principio di Maggio nell'ora medesima, si vede l'Orsa al colmo del cielo; ed allora bisognerebbe prolungare in giù la medesima linea delle due stelle precedenti del quadrato dell'Orsa per incontrare la stella polare. Altre volte

te la stella polare sarà da lato , e la linea di cui si parla si estenderà a dritta o a sinistra dell' Orsa ; ma in tutti i casi la stella polare , ed il Polo del mondo , che ne è vicinissimo , si trova sempre dalla parte della stella *a* , o sia dalla parte della convessità della coda .

7. Un osservatore che conosca in cielo la situazione del Polo del mondo , distinguerà naturalmente i *Punti Cardinali* , *Tramontana* , *Mezzodi* , *Oriente* , e *Occidente* . 1°. *Tramontana* , *Settentrione* , o il *Nord* , è quel sito dove si volge la faccia guardando il Polo ; (nell'orizzonte , sotto il Polo) 2°. *Mezzodi* , *Ostro* , o il *Sud* è il sito opposto , quello ove si vede il Sole , nei nostri climi , alla metà del giorno ; 3°. L' *Oriente* , il *Levante* , l' *Est* ; 4°. L' *Occidente* , il *Ponente* , l' *Ovest* ; questi due punti sono posti tra li due del Nord e del Sud , a distanze eguali , e ad angoli retti , l'uno dalla parte dove levano gli astri , l'altro dalla parte dove tramontano . L' *Oriente* è a dritta , quando si riguarda il Polo .

8. Il *Zenit* anche esso è un punto molto necessario a considerarsi nel cielo , e gli astronomi lo nominano ogni momento : è il punto che corrisponde direttamente sopra il nostro capo , quello a cui si dirige un filo a piombo , che si finge prolungato fino alla sommità del cielo .

9. Il *Zenit* essendo il punto più elevato del cielo rispetto ad uno spettatore , si trova sempre lontano da qualunque punto dell' orizzonte 90. gradi , o sia per un quarto di cerchio (*a*) . Se dunque un Astro comparisce elevato di 60° (gradi) sarà lontano dal *Zenit* gradi 30°, poichè 60 e 30 fanno li 90° , che si trovano tra l'orizzonte e il *Zenit* ; perciò in seguito potremo dire , che l'altezza di una stella è il *complemento* della sua distanza dal *Zenit* , perchè il *complemento* di un arco è ciò che gli manca per andar a 90° .

10. Il *Nadir* è il punto infimo della sfera celeste , quello che è direttamente opposto al *Zenit* , quello verso cui si dirige all'inghiù per la gravità naturale un filo a piombo . Il *Nadir* e il *Zenit* essendo l'uno all'altro direttamente opposti , se si concepisce un cerchio che giri tutto il Cielo , passando per il *Zenit* e per il *Nadir* , vi sarà un semicerchio , o sia 180°, tanto da una parte che dall'altra ; e chiameremo *verticale* (n. 184.) un cerchio , che in tal modo va dal *Zenit* al *Nadir* , da qualunque parte sia ; come si chiama *linea verticale* quella , che marca il filo a piombo , o la direzione della quale prolungata in alto e in basso , andrebbe a trovare il *Zenit* e il *Nadir* .

11. Ogni volta che si guarda il cielo da qualche luogo aperto , naturalmente si concepisce , che scorgendosi una metà del globo di sopra , ve n'è una metà che non si vede . Perciò l'orizzonte è un *cerchio massimo*

A s

della

(*a*) Supponiamo , come cosa nota , che per *grado* s' intenda la trecentesima sessagesima parte di un cerchio , e per conseguenza un quadrante , o quarto di un cerchio , contiene 90 gradi . Si osservi , che i gradi , minuti , secondi , ecc. si notano così , per esempio 45°. 32'. 40". così le ore , minuti , e secondi 3.^h 50'. 54". talora vi sono i giorni , come 365.^s 5.^h 48'. 45". ch'è l'anno .

della sfera (cioè che passa per il centro, e la divide per mezzo) che in qualunque luogo della terra separa la parte visibile del cielo dalla invisibile.

12. Tal è l'*orizzonte Razionale*, o *Astronomico*: non parleremo di quello, che si chiama *orizzonte sensibile* che si confidera come un piano parallelo all'orizzonte razionale, che tocca la superficie della terra: di questo non facciamo uso; e per altro si confonde coll'orizzonte razionale, quando si tratta degli astri molto rimoti; ne differisce soltanto per gli oggetti che ci circondano, e che limitano la nostra vista, se non siamo in pieno mare, o in sito assai elevato. L'orizzonte sensibile, o piuttosto l'*orizzonte fisico* in pieno mare, se l'occhio si trova a 5 piedi di altezza, s'estende alla distanza di 2300 pertiche in circa (vedete articolo 824).

13. L'orizzonte è differente per tutti i differenti punti della terra: ogni paese, ogni osservatore ha il proprio orizzonte, e cambiando luogo si cambia orizzonte. L'osservatore posto in A (Fig. 2.) ha per orizzonte HO; se si avvanza di 10° al punto B, il suo orizzonte diventerebbe RI, il quale col precedente farebbe un angolo di 10° .

14. Avendo ben rimarcato dalla parte di tramontana il luogo del Polo settentrionale, elevato sopra dell'orizzonte, è facile il concepire che ve n'è un altro dalla parte di mezzodì (che si chiama *Polo Meridionale*, *Australe*, o *Antartico*) opposto al primo, e altrettanto abbassato sotto l'orizzonte. A Parigi il Polo boreale è innalzato intorno 49° , a Venezia 45° ; il Polo australe n'è altrettanto abbassato. Questi due Poli sono le due estremità di una linea retta che s'immagina andare dall'uno all'altro, e che si chiama *Asse del mondo*, perchè di fatto il Cielo pare girare ogni giorno intorno di questa linea come asse.

15. Quando si conoscono li due estremi dell'asse, è facile concepire la ruota, o il cerchio, che gira in mezzo; questo sarà l'*Equatore*; basterà immaginare un cerchio collocato in mezzo all'asse, egualmente lontano dai due Poli del mondo. Sia un cerchio (Fig. 3.) HPZ EORQH, che passi per li Poli e che rappresenti la circonferenza di un verticale (n. 10) P il Polo boreale, R il Polo australe che gli è opposto, PR l'asse del mondo; la linea EQ rappresenterà il diametro dell'Equatore; o del cerchio, che passa a distanza eguale dai due Poli, il cui piano è perpendicolare all'asse, come il piano di una ruota è perpendicolare al suo asse: si deve immaginare sul diametro EQ un cerchio perpendicolare al piano della figura, di cui la metà sia sopra la carta, l'altra metà di sotto: questo cerchio sarà l'Equatore. Questo fu il primo cerchio, che si figurarono gli antichi Astronomi a cui i Caldei e gli Egiziani riservano tutti gli astri, dal tempo di Erodoto, 450 anni avanti G. C. Tal situazione dell'Equatore così collocato a distanza eguale dai due Poli fa che si può dire in generale e indifferentemente, che la sfera col suo Equatore EQ gira intorno l'asse PR, o pure intorno i Poli P ed R dell'Equatore. La figura 6 rappresenta pure l'Equatore EFQGE, veduto in prospettiva, e situato tra i Poli P ed R.

16. Que-

16. Questo moto diurno intorno l'asse ed i Poli del mondo viene espresso nei seguenti versi di Manilio (a) .

*Aera per gelidum tenuis deducitur axis ,
Libratumque gerit diverso cardine mundum ,
Siderens medium circa quem volvitur orbis ,
Æternosque rotas curfus immotus . . . Lib. I. v. 179.*

Il Polo boreale, o Artico, vien disegnato da Luciano, e da Manilio per la vicinanza dell'orfe chiamate *Arctos*.

*Axis inocciduus gemina clarissimus Arcto. Luc. VIII. 175.
Alter in adversum positus, succedit ad Arctos. Man. I. 682.*

e Virgilio disegna la differenza de' Poli, di cui l'uno è innalzato dalla parte del Nord, l'altro abbassato all'ostro, dicendo:

*Hic vertex nobis semper sublimis, at illum
Sub pedibus Styx atra videt manesque profundi. Georg. I. 242.*

17. Come i punti P, R, sono chiamati Poli dell' Equatore perchè l' Equatore giace a distanza eguale dall'uno e dall'altro; così in generale *Poli di un cerchio* si chiamano i due punti della sfera i più lontani da questo cerchio, o quelli che si trovano in una linea perpendicolare al piano del medesimo cerchio, e che passi per il suo centro. Così il Zenit è polo dell'orizzonte; dicasi lo stesso di ogn' altro cerchio: Il suo polo n'è sempre lontano di 90° da qualunque parte.

18. La linea che passa per li due poli di qualunque cerchio chiamasi parimenti in generale l'*Asse di tal cerchio*; per esempio la linea verticale è l'asse dell'orizzonte. Non si confonda l'asse col diametro di un cerchio; sono due cose differentissime: il diametro giace tutto nel piano del cerchio; l'asse lo trasora perpendicolarmente, e non ha altro punto comune col cerchio fuor che il centro per cui passa.

19. Dopo di aver esaminato ogni giorno il levare ed il tramontare del Sole, facilmente si chiamerà mezzo del giorno, mezzodì, mezzo del cielo, *Meridiano*, il luogo dove si trova il Sole, quando dopo di essersi innalzato al colmo del suo corso, comincia a discendere, o sia il punto della sua maggior elevazione a mezzo il giorno. Osservando istessamente tutti gli astri che levano e tramontano, si scorgerà che si trovano nella maggiore altezza nel mezzo dell' intervallo tra il levare e il tramontare, ben-

(a) Il Poema di Manilio contiene un' ampia descrizione dei cerchi della sfera, dei segni del Zodiaco, colle virtù che loro si attribuivano, e delle stagioni. Quelli che amano questo genere di Poesia, potranno parimenti legger i Poemi del Buchanan, dei P. Bolchovich, e di Montig. Stay.

benchè più o meno elevato, e si dirà pure che sono nel meridiano; ma questo punto è differentemente elevato per differenti astri, ed anche per il sole che noi vediamo ora più alto, ora più basso al mezzodì. S'immaginerà dunque un gran cerchio, come (Fig. 3.) HPZ EORQH, che passi per il Zenit, per il Nadir, e per li Poli, e questo sarà il Meridiano. Si chiama anco così, perchè indica il mezzo del giorno, quando il sole vi arriva. Ogni punto di questo cerchio è ugualmente lontano dall'orizzonte a dritta e a sinistra; di modo che tutti gli astri tra il loro levare e il loro tramontare si troveranno nel Meridiano, una volta al di sopra dell'orizzonte, e una volta al di sotto dopo il tramontare; così il cerchio loro diurno sarà tagliato dal Meridiano in quattro parti, due di sopra l'orizzonte uguali tra loro, due di sotto uguali pure tra loro, benchè forse maggiori o minori delle prime.

Il cerchio del Meridiano divide tutto il Cielo in due emisferi, uno all'oriente che si chiama *emisferio orientale*, l'altro all'occidente, *emisferio occidentale*. Il Meridiano passa pure per li due Poli del mondo, e divide per mezzo tutti i cerchi che gli astri descrivono intorno i Poli.

20. Il Meridiano d' un paese situato più a Levante o a Ponente di Parigi è differente dal Meridiano di Parigi; e l'osservatore che s'avanza verso levante o ponente, muta meridiano di tanto quanto s'avanza, poichè il suo meridiano passa sempre per il suo nuovo Zenit, e per li due poli del mondo. Così tra Parigi e Brest all'occidente essendovi 7° incirca, il meridiano di Parigi è più orientale di quello di Brest, e ne differisce di 7°. Solamente in un senso si può cambiar luogo senza cambiar meridiano, e questo è andando direttamente verso il Nord o verso il Sud, vale a dire verso l'uno de' Poli.

21. Tutti i Meridiani dei differenti paesi della terra s'incontrano e si tagliano nei due Poli del mondo, poichè tutti sono menati da un Polo all'altro, (n. 19.); tutti sono tagliati in due parti eguali dall'Equatore, poichè l'Equatore da per tutto si trova in distanza eguale dai due Poli; tutti sono perpendicolari all'Equatore. Ma quando l'osservatore collocato in un luogo fissa parla del Meridiano, deve sempre intendersi del Meridiano del luogo dove è, di quello che passa per il suo Zenit, e che si concepisce fissa ed immobile come l'orizzonte.

22. Stabiliti i tre cerchi principali della sfera celeste, l'orizzonte, l'equatore, il meridiano; l'osservatore deve a questi cerchi riferire tutti gli astri che osserva. Primieramente egli è quasi sforzato a compararli all'orizzonte: poichè un astro non è visibile se non quando si trova elevato sopra l'orizzonte: il Sole non reca il giorno, la Luna non rischiara le belle notti, se non dopo aver sormontato questo cerchio terminatore; e più che un astro s'innalza sopra l'orizzonte, più comodo abbiamo per vederlo. Questa elevazione dunque d'un astro sopra l'orizzonte, è uno de' fenomeni ai quali era più naturale di attaccarsi; quindi una delle prime osservazioni da farsi, era di misurare l'Altezza di un astro sopra l'orizzonte.

23. Sia un osservatore O (Fig. 4.) di cui Z è il Zenit, ed HOR l'oriz-

orizzonte; poichè è convenuto tra gli Astronomi di tutti i tempi, di dividere il cerchio in 360° , necessariamente si conterà 90° da Z fino ad R; poichè ZR è il quarto del cerchio, o della circonferenza intiera; così una stella che apparisce in Z avrebbe 90° di altezza; una che fosse in A, a distanza uguale dall'orizzonte R e dal Zenit Z, ne avrebbe 45° , e così d'altre.

24. L'osservatore O che volesse misurar queste altezze non ha che a formarli un quarto di cerchio BD, di cartone, di legno, o di metallo, dividerlo in 90 parti, porre uno de' lati BO verticalmente col mezzo di un piombino, e in questo stato osservare, cioè mettendo l'occhio nel centro O, sopra qual punto C risponde l'Astro A; il numero dei gradi compresi tra D e C, nel lembo dell'istromento, farà lo stesso che quello de' gradi AR della sfera celeste, che marcano l'altezza dell'astro A sopra l'orizzonte. Di fatto se l'arco DC è l'ottava parte di un'intiera circonferenza, o la metà di BD nel piccolo istromento, l'arco celeste AR parimenti farà la metà di ZR; e farà l'uno e l'altro di 45° . I gradi non sono altro che parti aliquote o porzioni di tutta la circonferenza; ve n' ha 90 nel quarto di un piccolissimo cerchio, come nel quarto di un grandissimo, come vi sono due metà, o quattro quarti in qualunque oggetto, grande o piccolo. Su di questo principio è fondata la misura degli angoli, di cui faremo continuamente uso, poichè tutte le nostre misure nel Cielo consisteranno in gradi o in parti di cerchio.

25. Gli Astronomi dispongono più comodamente il Quadrante che adoprano a misurare le altezze: pongono uno dei lati BO (Fig. 5.) in modo che sia diretto verso la stella A, di cui vogliono misurare l'altezza. Al centro O di questo istromento è sospeso liberamente un piombino OED: all'ora l'arco EG del Quadrante compreso tra il filo a piombo ed il raggio OG, avrà tanti gradi che l'arco AR, altezza dell'astro A sopra dell'orizzonte OR: poichè la linea verticale ZOED col raggio della stella BOA fa un angolo, la di cui misura è l'arco AZ da una parte, e dall'altra l'arco BE pari di gradi; questa è quella che chiamiamo distanza dal Zenit. Ora l'arco ZA è il complemento dell'arco AR, come BE è il complemento dell'arco EG; perciò l'arco AR è simile all'arco GE; dunque GE esprime l'altezza dell'astro tanto quanto l'arco AR. Tale è la maniera, con cui procedono gli Astronomi in questa osservazione fondamentale, che continuamente si pratica. Per osservare l'altezza di un astro sopra l'orizzonte basta dirigere uno de' lati BO del Quadrante BEG verso l'astro supposto in A, e vedere quanti gradi il filo a piombo ZOED sospeso liberamente al centro O dell'istromento intercetta contando dall'altro raggio OG, che vuol dire di quanti gradi è l'arco GE. Sopra questo è fondato l'uso del Quadrante astronomico, di cui faremo una chiara descrizione parlando dei fondamenti dell'Astronomia (331), ma di cui era necessario dare un'idea da principio.

26. La misura degli angoli fatta per mezzo d'un Quadrante, o di qualunque altra porzione di circonferenza, è la base di tutta l'Astronomia. Di fatto un Astronomo vuol conoscere i moti, e le rivoluzioni de' corpi cele-

celesti, e disegnare ad ogni tempo il sito apparente di tutti gli astri gli uni rapporto agli altri: basta perciò sapere, che da un punto dato del cielo un astro è avanzato più d'un altro, un certo numero di gradi, o una qualunque porzione di circonferenza: non v'è qui bisogno di conoscere questi moti apparenti in leghe, in pertiche, o altre misure assolute; dopo vi arriveremo anche (385); ma nel principio gli antichi Astronomi, e noi stessi nel presente libro non trattiamo che de' moti relativi ed apparenti, che si esprimono in gradi, minuti, e secondi, o in parti di cerchio, e che bastano per rappresentare in ogni tempo lo stato del cielo, quale apparisce ai nostri occhi.

Si osserva per esempio, che un astro è lontano da un altro per la metà del cielo, vale a dire 180° , talmente che gli è diametralmente opposto; questa è la più grande di tutte le distanze apparenti: se si trova un terzo astro a mezzo l'intervallo, e che apparisce tra gli altri due, noi diremo ch'ei dista 90° , o sia un quarto di cerchio, da ciascuno di essi: noi misuriamo egualmente 30° , 15° , 5° di distanza apparente tra d'altri astri; e tutte queste misure si ottengono presentando agli oggetti che si osservano, un arco di cerchio come BD (Fig. 4.) di cui il centro sia nell'occhio O, e la parte CD sia simile alla parte AR della circonferenza celeste, che vogliamo misurare; così per esempio quando diremo che la Luna ha un mezzo grado, o 30 minuti di diametro, questo vorrà dire, che ella occupa la metà della trecentesima sessagesima parte di una circonferenza, di cui il nostro occhio è il centro; o ciò, che rinvienesse allo stesso, che se fosse ripetuta 720 volte intorno di noi, o che vi fossero 720 lune in serie una dopo l'altra, ciò farebbe tutto il giro del cielo.

27. Mentre la sfera intiera gira sopra i due Poli P ed R (Fig. 6.) i punti situati nell'Equatore EQ descrivono un cerchio che è della grandezza medesima della sfera, vale a dire uno dei cerchi massimi, il cui centro è il centro stesso della sfera. Ma i punti che sono più vicini ai Poli, come il punto A, descrivono cerchi minori: tale è il cerchio AB il cui centro è nel punto D dell'asse PR, e che nella figura sembra un ovale, perchè supponiamo vederlo in prospettiva, e da parte. Sono questi i cerchi minori che si chiamano *paralleli dell'Equatore* o semplicemente *Paralleli*. Ogni punto del cielo posto fuori dell'Equatore descrive un parallelo, che scema di grandezza a misura che il punto è più lontano dall'Equatore (4).

Tutti questi Paralleli AB, sono tagliati in due parti uguali dal cerchio HBP AO; poichè il loro centro D ed il loro polo P trovandosi nel piano del meridiano, questo piano li traversa per il centro, e per conseguenza li taglia in due parti eguali; (19) così l'astro, che situato da principio nel punto A del meridiano, descrive col suo moto diurno il parallelo AB starà tanto tempo a dritta, che a sinistra del meridiano, passerà due volte per il meridiano in distanza di 24 ore, il meridiano dividendo la durata della rivoluzione diurna in due parti eguali.

28. Se il Parallelo AB che descrive la stella, si trova tutto sopra l'oriz-

orizzonte HO , si vedrà passare tutte due le volte per il meridiano in A e in B ; la sua più grande elevazione sopra l'orizzonte farà nel di lei passaggio superiore in A , e l'altezza minima nel passaggio inferiore in B . Ma se il parallelo della stella si trova con poca porzione sopra l'orizzonte come il parallelo MNL , di cui la parte superiore MN sopra l'orizzonte è molto minore della parte invisibile NL , non si vedrà la stella, che a proporzione per poco tempo in 24 ore.

29. V'è questa differenza tra i cerchi grandi, e i cerchi piccoli della sfera, che i piani de' grandi passando per il centro tagliano la sfera in due parti eguali, quando i cerchi minori, come AB , la tagliano in due segmenti, di cui uno è più picciolo come APB , l'altro più grande, come $AEMORLQB$.

30. Un'altra differenza, che si deve osservare tra i cerchi massimi, ed i minori, è, che un cerchio massimo taglia necessariamente tutti gli altri cerchi massimi in due parti eguali, mentre un cerchio minore sovente viene tagliato da un cerchio massimo in due parti disuguali: La ragione è chiara, se si considera che due cerchi massimi avendo ciascuno il centro nel centro della sfera, l'uno passa per il centro dell'altro: anno dunque un diametro comune che si chiama la *Comune Sezione* dei loro piani: ora la natura del diametro è di tagliar il cerchio in due parti eguali; perciò ogni cerchio grande è tagliato da un altro, secondo il proprio diametro, vale a dire in due parti eguali. All'opposto un cerchio minore, essendo fuori del centro del globo, può non solo esser tagliato in due parti disuguali, ma ancora non esser tagliato, nè tocco, da un cerchio massimo dello stesso globo. Sono questi i primi assiomi della Trigonometria sferica, di cui conviene saper la dottrina se si vuol fare qualche progresso in astronomia; ma le nozioni ch'ne daremo qui saranno sufficienti per l'intelligenza di questo libro.

Vedremo parlando della *sfera Armillare*, (100.) che vi si distingue principalmente sei cerchi massimi, e quattro minori: l'ordine delle osservazioni ci ha condotto a distinguer già tre cerchi massimi, l'*Orizzonte*, l'*Equatore*, e il *Meridiano*. Si è parlato in generale dei cerchi minori chiamati paralleli dell'equatore; si parlerà degli altri a misura che i fenomeni lo richiederanno.

Trovare l'altezza del Polo per mezzo delle Stelle.

31. La disposizione dei tre cerchi massimi della sfera, l'*Equatore*, l'*Orizzonte*, e il *Meridiano*, deve formare ormai la base di tutte le nostre osservazioni: ad essi riferiremo gli astri per determinarne il sito, ed i moti. Perciò la prima cosa, che dobbiamo fare, è di conoscere la loro reciproca situazione, di sapere come sia collocato l'*Equatore* rispetto all'*Orizzonte* nostro; quanto il polo sia innalzato dalla parte di tramontana; quanto innalzato l'*Equatore* dalla parte di mezzodì.

32. Poichè l'*Equatore* non è altro, che il cerchio sopra cui si fa il moto diurno, l'*Equatore* viene determinato dall'andamento di questo mo-

B

to

to illesso; e poichè questo moto si fa intorno i poli, servirà insieme a conoscere, se la stella polare, di cui s'è parlato, sia precisamente situata nel polo del mondo, in modo che potesse esserne la marca sicura e permanente; allora basterebbe misurarne l'altezza (23), e si avrebbe l'altezza del polo: ma ella n'è distante 2°. Si stenta, è vero, a distinguere se questa stella cambi sito guardandola colla vista semplice, e senza avere avanti gli occhi qualche termine fisso a cui compararla: ma con istrumenti, e con attenzione mirandola, si trova che descrive anch'essa, come l'altre stelle, un piccolo cerchio intorno il polo. Non ostante, se la stella polare non marca immediatamente il punto del cielo dov'è il polo, almeno il mezzo del cerchio ch'essa descrive ogni giorno, ne deve porgere un indizio sicuro.

33. La stella A (Fig. 3, e 6) descrivendo intorno il polo P un cerchio AB, se questa stella dal polo dista 2° l'arco AP sarà di 2° come l'arco PB, e l'arco intiero APB, che mostra la larghezza del parallelo, sarà di 4°; perciò la stella essendo nel meridiano in A nella parte superiore del suo parallello, avrà un'altezza AH sopra l'orizzonte, maggiore di 4° dell'altezza BH della medesima stella all'ora che 12 ore dopo ella si troverà sotto il polo: la differenza AB di queste due altezze sarà dunque di 4°. Supponiamo ora, che attualmente siasi osservata l'una e l'altra altezza in A ed in B; per avere l'altezza del polo P bisognerà dividere per metà la differenza AB delle due altezze: la metà di questa differenza sarà PB, si aggiungerà alla minore altezza HB della stella, e si avrà HP *altezza del polo*. Per esempio, se la stella polare osservata a Parigi ha di altezza una volta 51°, un'altra 47°, la differenza essendo 4°, la metà s'è la distanza della stella dal polo; questi 2° aggiunti a 47°, altezza minore della stella, faranno l'altezza del polo che perciò sarà di 49°; o, il che è lo stesso, si prenderà la metà della somma 98 delle due altezze, e si troverà pure 49°. In questo modo le stelle circumpolari, o vicine al polo, servono a trovarne l'altezza.

34. L'altezza del polo, e l'altezza dell'equatore fanno insieme 90°, di maniera che conosciuta la prima, si conosce necessariamente la seconda. Sia P il polo, E l'equatore, PH l'altezza del polo, EO quella dell'equatore; il semicerchio HZO è la parte visibile del cielo di 180°. Se si leva il quarto di cerchio PZE, che è la distanza del polo dall'equatore, vale a dir 90°, ne restano altri 90°, dunque gli archi HP, ed EO, che restano dopo di aver levato PZE, fanno insieme 90°: *dunque l'altezza del polo HP è il complemento dell'altezza dell'equatore EO*.

35. Quindi segue, che l'altezza dell'equatore è uguale alla distanza del Polo dal Zenit, vale a dire a PZ; perchè ZH è di 90°, mentre dal Zenit all'orizzonte v'è sempre un quarto di cerchio; però HP è il complemento di PZ: ma HP per l'articolo precedente, è il complemento di EO; dunque PZ è uguale ad EO, che vuol dire, che la *distanza del polo dal Zenit è uguale all'altezza dell'Equatore*.

36. È evidente per la stessa ragione, che la distanza ZE del Zenit dall'Equatore è uguale all'altezza del polo PH. Poichè ZH, e PE sono ciascu-

ciascuno di 90° , levata la parte comune PZ, resteranno due archi uguali PH e ZE, cioè l'altezza del polo, e la distanza dell'Equatore dal Zenit eguali.

Della Grandezza della Terra.

37. L'osservazione dell'altezza del polo, e di quella dell'equatore, o se si vuole, dell'altezza meridiana del sole in differenti paesi, fu il primo indizio della rotondità della terra. Da principio determinarono gli uomini le differenti altezze del polo per mezzo dell'ombra del sole: più che si avanzava verso il polo, più si trovavano lunghe quest'ombre misurate lo stesso giorno; il che provava, che l'altezza del sole sopra l'orizzonte era divenuta più picciola, e che l'osservatore situato verso il Nord non era nel medesimo piano coll'osservatore situato verso mezzodì: la conclusione era, che la terra è tonda.

38. L'ombra della terra nelle eclissi di Luna apparisce sempre rotonda; i vascelli veduti da lungi in pieno mare spariscono per gradi; si vedono discendere e perdersi poco a poco, per la curvatura della superficie dell'acqua: tali furono gl'indizj onde gli antichi filosofi riconobbero la curvatura e rotondità della Terra.

39. Dopo d'aver così conosciuto la rotondità della terra, lo stesso mezzo servì a conoscere la grandezza: la mutazione di latitudine e di altezza, sia del polo, sia delle stelle, servì a conoscere l'estensione del nostro globo, misurandone una piccola porzione. Possidonio, già 1900 anni, osservò, che la stella chiamata *Canopo* che passava al meridiano d'Alessandria all'altezza di una 48^{ma} parte del cerchio, o di $7^\circ \frac{1}{2}$, a Rodi quasi non s'innalzava, ma passava radendo l'orizzonte: quindi seguiva che queste due città, situate per altro sotto il medesimo meridiano, o presso, erano lontane d'una 48^{ma} parte del cerchio; d'altra parte la loro distanza itineraria in linea retta era di 3250 stadj, secondo Eratostene citato da Plinio e da Strabone; così prendendo 48 volte questo numero di stadj, risultava che li 360° della terra facevano 180000 stadj. Tale la suppone Tolomeo nella sua Geografia, composta cento anni in circa dopo G. C. Se si valuta lo stadio Egiziano col Sig. le Roy (*Ruines des monuments de la Grece* p. 55) di 114 pertiche di Parigi $\frac{13}{100}$, si avrà per la circonferenza della terra 8999 leghe, ciascuna di 1283 pertiche, il che si allontana molto poco dalla misura stabilita dall'Accademia, che è intorno 9 mille leghe (802).

40. Altro esempio: Si trova camminando verso tramontana che la latitudine di Amiens è maggiore di quella di Parigi di un grado, cioè che il sole a mezzodì è di un grado più basso per Amiens, che per Parigi; questa è una prova che la terra ha un grado di curvatura da Parigi fino ad Amiens. Or questa distanza misurata, andando sempre dal mezzodì al Nord, s'è trovata di 25 leghe, ciascuna di 1283 pertiche (802.).

Dunque un grado della terra, o la 360.^{ma} parte di tutta la sua circonferenza ha 25 leghe di estensione; donde segue che tutta la circonferenza, o il giro della terra, contiene 9 mille leghe, perchè 25 volte 360 fanno 9000. Quando si veggono gli astri crescere di un grado in altezza, questa è una prova che il nostro Zenit e il nostro orizzonte anno cambiato di un grado, poichè sono questi i termini fissi, ai quali si riferiscono le nostre osservazioni delle altezze. Se il nostro Zenit è mutato di un grado, avrà fatto la 360.^{ma} parte del cerchio, o del giro intiero della sfera; e se 25 leghe di cammino dal mezzodì al Nord lo fanno cambiare di un grado, le 9000 leghe lo farebbero cambiare di 360°, cioè, gli farebbero fare il giro del cielo, nel mentre che noi faremmo quello della terra; dunque la terra ha 9000 leghe di circuito.

Delle Latitudini Geografiche, e Terrestri.

41. L' Equatore ed i poli che abbiamo disegnato in cielo, si disegnano egualmente sulla terra; poichè il punto della terra che ha per Zenit il polo del cielo, si chiama naturalmente il *polo della terra*; e siccome l' Equatore celeste determina le stagioni, quello della terra determina la temperatura ed il grado di calore o di freddo, che si prova in differenti paesi.

42. Si dovessero osservar da principio le stelle che in cielo rispondono all' equatore, vale a dire, che sono precisamente a distanze uguali dai due poli celesti: viaggiando poscia sopra la terra si vide, andando verso mezzodì, che queste stelle si accostavano alla verticale e passavano pel meridiano più vicine al Zenit a misura che si avanzava nei paesi meridionali.

43. Fu facile comprendere, che avanzando ancora si arriverebbe a' luoghi della terra, dove queste stelle passano esattamente per lo Zenit, e ove i due poli sono nell' orizzonte. Di fatto in tal caso si è evidentemente sotto l' equatore celeste, o pure sopra l' equatore terrestre; poichè l' uno corrisponde all' altro, sono in un solo e stesso piano, perchè l' equator celeste determina l' altro; e vedendo passar il sole sopra la testa, quando è a pari distanza da' poli, o sia nell' equatore, un potrebbe dire: io sono sotto l' Equator celeste, o pure: io sono sull' Equatore terrestre.

44. L' Equator terrestre, o sia la *linea equinoziale*, fa tutto il giro della terra, passa per il mezzo dell' Affrica, negli Stati poco cogniti di Marocco, e di Monoemugi, traversa il mar dell' India, le Isole di Sumatra e di Borneo, la vasta estensione del mar pacifico, dipoi l' America meridionale, dalla Provincia di Quito sino all' imboccatura del fiume delle Amazzoni. Noi diciamo, che i Paesi che sono sopra questa linea non anno latitudine, perchè si chiama *Latitudine* la distanza dall' Equatore. A misura che si lascia l' equatore per avanzarsi verso i poli, a tramontana, o a mezzodì, si *avanza* in latitudine; quando si si è scostato un grado, o 25 leghe, si ha un grado di latitudine. La latitudine, o distanza dall'

dall' equatore dunque si misura tanto verso mezzodì , che verso tramontana : chiamasi *latitudine Settentrionale* , o *latitudine Nord* , la distanza dall' Equatore per li paesi che sono dalla parte di tramontana ; e *latitudine Meridionale* , o *latitudine Sud* , quella che si conta dall' altra parte della linea .

45. I paesi che sono a mezza via dall' Equatore al polo , anno 45° di latitudine ; tal è la Città di Bordeaux ; tale ancora Sarlat , Aurillac , Puy , Valenza , Brianzon , Torino , Casale , Piacenza , Mantova , Rovigo , le bocche del Po ; in Asia Astracan , la Tartaria Chinesa , la terra d' Yeco ; non si può avere più di 90° di latitudine , perchè non v' è che 90° tra l' equatore , da cui si contano , ed i poli ove tutte le latitudini finiscono e si confondono in un punto .

46. L' altezza del polo di cui s' è parlato (33) è uguale alla latitudine del luogo ; perchè la latitudine non è altro che la distanza di un paese dall' Equator terrestre , o sia la distanza del suo Zenit dall' Equator celeste , come Z E . (Fig. 6 .) ma Z E è uguale a P H (36) ; dunque la latitudine è uguale all' altezza del polo .

Delle Longitudini Geografiche .

47. Dopo di aver misurato le distanze dal mezzodì a tramontana sotto il nome di latitudini , era necessario misurare le distanze nell' altro senso , cioè da occidente in oriente . Si chiamarono *longitudini* , perchè la lunghezza dei paesi cogniti era più grande in questo senso , che da mezzodì a tramontana , quando i primi Geografi già 1800 anni stabilirono le loro misure .

Per misurare le longitudini si concepiscono molti cerchi perpendicolari all' Equatore , che passino per li due poli della terra , come P A R , P S R nel globo della Figura 12 . Sono questi i meridiani terrestri ; tutti i paesi che sono sotto uno stesso meridiano , anno la stessa longitudine .

48. Il primo Meridiano , quello dal quale si cominciano a contare le longitudini , è una cosa arbitraria e di pura convenzione ; perchè il cielo non porge alcun termine fisso sulla terra per le longitudini , quando l' Equatore ne porge uno per contare le latitudini . Si è variato sopra la scelta di un primo meridiano , ed ancora la cosa non è ben fissata tra' Geografi . Vedete il P. Riccioli (*Geographia Reformata* pag. 385) .

49. La dichiarazione del 25 Aprile 1634 , sotto il Re Luigi XIII . , fissò il nostro primo meridiano all' estremità dell' Mola del Ferro , la più occidentale dell' Isole Canarie . Il Borgo principale di quest' Isola si trova a $19^{\circ} 53' 45''$ all' occidente di Parigi ; ma il Sig. de l' Isle , il nostro Geografo più famoso , avendo supposto per maggior facilità , e in numeri rotondi , che Parigi avesse 20° di longitudine , i Geografi Francesi anno seguito questo esempio ; perciò nella maggior parte delle nostre carte si stabilisce il primo meridiano universale a 20° del meridiano di Parigi dalla parte di occidente , e si continuano a contare le longitudini terrestri verso Levante fino a 360° , facendo tutto il giro della terra .

50. Non

50. Non ostante gli Astronomi Francesi che determinano comunemente le longitudini per il confronto delle osservazioni fatte a Parigi con quelle di differenti luoghi della terra , anno un' altra maniera di contare . Prendono la differenza de' meridiani , o la differenza di longitudine tra Parigi ed altri paesi , non in gradi ma in tempo , così : 15° di longitudine fanno un' ora , perchè le 24 ore del giorno fanno tutto il giro della terra , un grado perciò fa $4'$ di tempo ; e in vece di dire , per esempio , che Poitiers ha 18° di longitudine , perchè questa Città è di 2° più occidentale che Parigi , dicono , che la differenza di questi due meridiani è di $8'$ occidentale . Questo è il metodo tenuto da Tolomeo per Alessandria , dagli Arabi per Toledo , da Copernico per Fravvenberg , da Reinoldo per Konisberg , da Ticone e da Keplero per Uraniburg , dagli Olandesi per Amsterdam , dagli Inglesi per Greenwich , dove è l' Osservatorio Reale d' Inghilterra .

51. Le differenze de' meridiani ci fanno giudicare delle differenze dell' ore che si contano nello stesso punto di tempo in differenti paesi . Un osservatore , che si avanzasse a 15° di Parigi dalla parte di Levante , per esempio a Vienna in Austria , conterebbe un' ora di più che a Parigi , perchè andando incontro del sole , che gira ogni giorno dall' oriente all' occidente , lo vedrebbe un' ora avanti : E continuando di avanzare così verso levante di 15° in 15° guadagnerebbe un' ora ogni volta ; e se facesse il giro della terra , arrivando a Parigi troverebbe di aver guadagnato 24 ore , e conterebbe un giorno di più , direbbe Lunedì mentre che noi diremmo ancora Domenica .

52. Un altro osservatore che si avanzasse dalla parte di Ponente , retarderebbe della stessa quantità , e ritornando a Parigi dopo il giro del mondo non conterebbe che Sabato contando noi Domenica . Questa singolarità di computo si proverà ogni volta che si vedrà arrivar un vascello che abbia fatto il giro del mondo , se ha continuato di contar i giorni col primo ordine della partenza senza assoggettarsi al calendario de' paesi , per li quali farà passato .

53. Per la medesima ragione gli abitanti dell' Isole del mar del Sud , che sono lontani 12 ore dal nostro meridiano , devono veder i viaggiatori che vengono dall' India , e quelli che vengono dall' America , contare diversamente i giorni della settimana , i primi avendo un giorno di più che i secondi . Poichè supponendo che sia Domenica a mezzo giorno per Parigi , quelli che sono nell' India dicono , che la Domenica è cominciata già 6 ore , e quelli che sono in America , dicono all' opposto che vi mancano molte ore . Parve ciò strano ai nostri antichi viaggiatori , accusati perciò d' essersi ingannati nel calcolo , ed aver perduto il filo de' loro Diarij . Dampier essendo andato a Mindanao per l' Ouest , trovò che ivi si contava un giorno di più che da lui (vedete i viaggi di Dampier Tom. I.) Varenio dice anche che a Macao , Città marittima della China , i Portoghesi contano abitualmente un giorno di più che gli Spagnuoli nelle vicine Filippine , i primi sono in Domenica , mentre gli altri non contano che Sabato . Ciò proviene da questo , che i Portoghesi stabiliti a Macao vi so-

no andati per il Capo di buona Speranza, o per levante, e gli Spagnuoli sono andati alle Filippine per Ponente, cioè partendo dall' America, e traversando il mar del Sud.

54. E' una cosa delle più necessarie, ma insieme delle più difficili nell' Astronomia, nella Geografia, e nella navigazione, il trovare le longitudini. Questo vuol dire di sapere, per esempio quanto il meridiano della Martinica è lontano da quello di Parigi, o quanti gradi vi vogliono verso l'occidente per arrivare alla Martinica. Il metodo, che adoprano gli Astronomi consiste in cercare nel cielo un fenomeno, o un segnale, che possa essere scorto nello stesso istante da Parigi e dalla Martinica; per esempio, il momento, in cui comincia un' eclisse lunare: se alla Martinica, quando comincia l' eclisse, è mezza notte, ed a Parigi si contino nello stesso momento $4^h. 13'$, sappiamo perciò, che dal meridiano di Parigi a quello della Martinica v' è $4^h. 13'$ di tempo, che fa un arco di $63^{\circ}. 15'$. In fatti il sole impiega 24 ore a far il giro del globo, ed un' ora a far 15° : se gli abitanti della Martinica avessero il mezzodì un' ora dopo di noi, saremmo sicuri, che sono 15° verso l'occidente; ma secondo l' osservazione anno il mezzodì più tardi $4^h. 13'$; dunque sono più avanzati di $63 \frac{3}{4}$, che corrispondono a $4^h. 13'$, a ragione di 15° per ora, e di un grado per 4 di tempo.

Del moto proprio della Luna, e delle sue Fasi.

55. Dopo di aver osservato il moto diurno comune a tutti gli astri, come il primo tra tutti i fenomeni celesti, che gli uomini anno dovuto osservare, anche senza una certa applicazione, passeremo al *moto proprio* o particolare dei Pianeti, che si fa in senso contrario, vale a dire, verso l'oriente. Il più semplice e il più sensibile di tutti questi moti propri, quello che dovette più di tutti ferire gli occhi, fu il moto della Luna. Ogni mese quest' astro muta figura, e fa il giro del cielo in un senso contrario a quello del moto generale; e mentre che ogni giorno sembra la luna levare e tramontare come gli altri astri andando da oriente in occidente, ella ritarda ogni giorno, e sembra restar indietro dalle stelle, o rinculare verso levante, intorno 13° . Questo moto particolare, con cui la luna si ritira a poco a poco verso l'oriente, nel mentre che ella va come gli altri astri verso ponente, si chiama il *moto proprio*, o moto periodico, e questo è un moto reale, che ha luogo in questo pianeta. Esso è tanto considerabile, che in 27 giorni la luna che si sarà veduta appresso di qualche bella stella, se ne distacca, e si allontana, e fa il giro del cielo in senso contrario del moto comune o diurno; ed a capo di 27 giorni ritorna a rimettersi a lato della stella medesima: dopo un giorno se n'era allontanata di 13° un poco più, dopo due di 26° , dopo tre di 39° ec. finalmente dopo 27 giorni s'era allontanata di 360° , e per conseguenza era tornata per il lato opposto a raggiungere la stella, perciò si ritrova nello stesso punto in circa dove era apparsa il mese avan-

avanti , avendo successivamente corrisposto a varie stelle intorno il cielo .

56. Le *Fasi della Luna* , o le diverse apparenze del suo lume , furono fenomeni ancora più osservabili , e più sensibili agli occhi di tutti . Avendo comparso tutta una notte di forma rotonda , larga , e brillante , che noi diciamo *Luna piena* , essa perde a poco a poco del suo lume , della sua larghezza , del suo disco apparente , leva più tardi , non rischiarà già più che la metà della notte , diventa *dicotoma* , vale a dire tagliata per mezzo ; alcuni giorni dopo continuando ad avvicinarsi al sole non è più che una *falce* che apparisce la mattina a levante avanti che levi il sole , coi *corni in alto* , *opposti al sole* , ma che diminuendo tuttavia di grandezza , e di lume , si perde nei raggi del sole , e totalmente sparisce .

57. Dopo di essere sparita per tre , o quattro giorni , ricomparisce la sera a ponente , dopo il tramontar del sole in forma di falce , colle punte sempre verso l'alto , opposte al sole ; ma continuando ad avanzare verso levante , e ad allontanarsi dal sole per il suo moto proprio , cresce la luna di grandezza e di lume , la sua falce più grossa si vede più facilmente , e più tempo : diventa in seguito come un semicerchio , apparisce un quarto , o in quadratura essendo allontanata dal sole 90° ; chiamasi questo *primo Quarto* : finalmente 7 in 8 giorni dopo ricomparisce piena , tonda , e luminosa , come un mese avanti , passa allora per il meridiano a mezza notte , e si vede che ella è opposta al sole .

58. Da queste fasi , e da questi aspetti della luna , presero occasione gli antichi di contare il tempo per mesi , e settimane (542.) a cagione del ritorno delle fasi della luna in un mese , e perchè la luna ad ogni 7 giorni in circa prende per così dire una forma nuova : non v'era in cielo alcun segnale , di cui le differenze , le alternative , e l'epoche fossero più rimarcabili ; ed è probabile che tutti i popoli anno preso dalla più rimota antichità , come dalla sorgente comune del genere umano , o per un istinto egualmente naturale a tutti , questa maniera di distribuire i loro esercizj , e fissare le loro radunanze per mezzo della luna (Vedete *spettacolo della natura* Tom. IV.) : noi ne parleremo più a lungo nel Libro IV. , ove spiegheremo le fasi della luna , e faremo vedere che sono prodotte dal lume del sole che rischiarà sempre la metà della luna . Se noi sovente non incorriamo che una piccola parte di quest'emisfero illuminato , anzi se lo perdiamo di vista ogni mese , ciò nasce per esser allora la luna tra il sole e noi , onde volta verso il sole l'emisfero illuminato , e l'oscuro verso di noi : or un oggetto che non è illuminato , non può essere veduto , quando non fosse un corpo lucido di per se come il sole .

Del moto annuo , e dell' Ecclittica .

59. Il moto proprio della luna è il più celere ed il più osservabile tra tutti quelli che si osservano in cielo ; ma ve n'è uno ancora più importante per noi ; e questo è il *moto annuo* o periodico che il sole pare avere , chiamato anche *moto proprio del sole* . E' questo dopo il moto diurno uno

uno dei fenomeni più manifesti, mentre la differenza delle stagioni, i calori della State, i rigori dell' Inverno ne dipendono non meno che la lunghezza de' giorni e delle notti tanto varia nel corso d' un anno. Questo moto in se stesso è una mera apparenza (400) proveniente dal moto annuo della terra: ma non si tratta ancora se non che d' esaminare i fenomeni e le apparenze avanti di elevarsi alla contemplazione delle cagioni, che li producono.

60. Se si osserva la sera dalla parte di ponente qualche stella fissa dopo il tramontare del sole, e che si consideri attentamente molti giorni di seguito alla stessa ora, si vedrà di giorno in giorno più presso del sole, di modo che ella sparirà in fine, e farà nascosta dai raggi e dalla luce del sole, da cui era assai lontana i giorni precedenti. Sarà facile nello stesso tempo di conoscere, che il sole s' è avvicinato alla stella, e non la stella al sole. Di fatto, si vede, che tutti li giorni levano e tramontano negli stessi punti dell' orizzonte, in faccia agli stessi oggetti terrestri, che sono sempre nelle medesime distanze tra loro, quando il sole muta continuamente i punti del suo nascere e del suo tramontare, e cambia sito e distanza colle stelle, vedendo in oltre che le stelle avanzano ogni giorno intorno 4' di tempo a levare, (ciò che si chiama l' *accelerazione diurna* delle stelle (350)); non resta luogo di dubitare che non sia il sole che cambia continuamente luogo rapporto alle stelle; quest' osservazione può farsi in ogni tempo, guardandosi solamente di non confondere una stella fissa con un pianeta: ben tosto s' insegnerà la maniera di distinguarli.

61. Il primo fenomeno dunque che offre il moto proprio del sole è questo: *Il sole di giorno in giorno s' avvicina alle stelle, che sono più orientali d' esso*, che vuol dire, s' avvanza, o resta ogni giorno verso Levante: però il moto proprio del sole si fa da occidente in oriente: Esso è d' un grado in circa per giorno, e a capo di 365 giorni si rivede la stella a ponente all' istessa ora nel medesimo luogo ove appariva il precedente anno in simil giorno: vale a dire, che il sole è ritornato a porsi nel medesimo punto rispetto alla stella; avrà dunque fatto una rivoluzione; e questo si chiama il *moto annuo*.

62. Per combinare il moto annuo col moto diurno del sole, immaginiamo un gran globo, o se si vuole, una grossa palla, traversata per il centro, o diametralmente, con un *Asse*, che sia sostenuto ai suoi estremi nei punti P, R (Fig. 12.): Facendo girar questo globo si avrà un' idea del moto diurno della sfera. Se si mette un insetto in S, a pari distanza dai due poli P, ed R, farà sforzato a girare col globo descrivendo l' Equatore ASQ: mettendone un altro in B più presso all' uno de' poli, descriverà un parallelo BC, di cui la circonferenza è minore. Ma nel mentre che il globo gira in un senso, l' insetto che noi supponiamo in S potrebbe muoversi anch' esso insensibilmente nella direzione opposta: allora imiterebbe il moto annuo, o sia proprio del sole, il quale si avvanza a poco a poco verso l' oriente nel mentre che viene trasportato ogni giorno con tutto il cielo di moto comune verso l' occidente.

C

Que-

Questi due moti sono assai bene espressi in questi quattro versi di Ovidio:

*Adde, quod assidua rapitur vertigine caelum,
Sideraque alta trahit celerique volumine torquet;
Nitor in adversum, nec me qui cetera, vincit
Impetus; & rapido contrarius evorbor orbi.* Metam. II. 70.

63. Questo moto annuo, o proprio del sole da occidente in oriente, è dunque contrario al moto diurno, al moto comune di tutto il cielo verso occidente, spiegato da principio. Ogni giorno il sole come le stelle, fa una rivoluzione intorno di noi da levante a ponente, ma fra tanto il sole fa intorno un grado in senso contrario, cioè da ponente a levante, e corrisponde successivamente a differenti stelle.

64. La linea di questo moto annuo osservata concava s'è trovata esser un cerchio, e questo cerchio è stato chiamato *Ecclittica* (*a*). Fu d'uopo determinarne la situazione; e questa è la prima ricerca degli antichi Astronomi; cerchiamo di seguirli, o d'indovinare se è possibile il loro progresso.

L'Ecclittica, cioè la strada apparente ed annua del sole, è differente dall'equatore, o dal cerchio diurno, di cui s'è indicata la posizione (15). I primi Caldei, che osservarono in Babilonia, aveano l'equatore elevato di 54° : se il sole avesse fatto il suo moto annuo per l'equatore, ogni giorno a mezzodì sarebbe stato elevato 54° . Ben lungi da questo, scorgevano in estate che il sole si elevava 24° sopra l'equatore, e discendeva in inverno 24° di sotto, in modo che la sua altezza meridiana (19) era di 78° in estate, di 30° solamente in inverno; donde seguiva manifestamente, che l'Ecclittica era un cerchio discosto dall'equatore 24° . Solamente doveva traversare, o tagliar l'equatore in due punti diametralmente opposti: perchè si osservava due volte all'anno, in Primavera, ed in Autunno, che l'altezza del sole a mezzodì era precisamente uguale all'altezza dell'equatore, vale a dire di 54° ; donde seguiva, che in questi due giorni il sole era nell'istesso equatore, dal quale tre mesi avanti era stato lontano 24° .

65. Così l'Ecclittica, la linea del moto annuo del sole, è un cerchio della sfera, che taglia l'equatore in due punti, ma che se ne scosta dopo 24° a tramontana, e mezzodì. E perchè queste due distanze sono uguali, s'è dovuto concludere, che l'Ecclittica era un cerchio massimo della sfera, essendo una proprietà de' cerchi massimi di tagliarsi scambievolmente per mezzo (30). Era d'uopo in appresso determinare nella volta celeste la traccia dell'Ecclittica, e conoscere le stelle, per le quali

(*a*) La parola Greca *εκλειπτική* significa, *deflectio*, d'onde *ecclypse*, *deliquio*, del sole, e della luna, che accade quando questa si trova presso dell'Ecclittica solamente.

li il sole dovea passar ogni giorno dell' anno, per poter rappresentare questo cerchio solare sul globo dove si è disegnato l'equatore (15).

66. A tal fine si è osservato tosto, che v'erano due giorni dell' anno, lontani per sei mesi, nei quali il sole avea 54° di altezza meridiana, o sia l'altezza dell'equatore. Si chiamarono i *giorni dell' Equinozio*, perchè in essi descrivendo il sole l'equatore, stava 12 ore sopra l'orizzonte, e 12 sotto, vale a dire, che il giorno era uguale alla notte; l'uno è stato chiamato *Equinozio di Primavera* succedendo al fine dell'inverno, l'altro *Equinozio d'Autunno*.

67. Avendo osservato nel giorno dell'equinozio di primavera quale stella, o qual punto del cielo, passava per il meridiano 12 ore dopo del sole, o a mezza notte, coll'istessa altezza del sole, o sia dell'equatore; si conosceva il punto opposto al sole, vale a dire, l'equinozio di autunno, e il luogo in cui dovea trovarsi il sole sei mesi dopo traversando l'equatore nel punto opposto. Così si è dovuto conoscere e marcare nel cielo il punto equinoziale di Autunno, quando il sole era in quello di primavera, e quello di primavera quando era giunto all'equinozio di autunno, o sia nel punto opposto: in tal maniera si arrivò a distinguere nel cielo stellato questi due punti essenziali nell'astronomia.

68. I punti dell' Ecclittica situati tra gli equinozi a pari distanza, e ne quali si trova il sole, quando è più lontano dall'equatore, sono stati chiamati *solstizj* (*solis stationes*) perchè il sole essendo giunto a questa medesima lontananza, sembra tenersi per alcuni giorni alla medesima distanza dall'equatore, senza scostarsi nè accostarsi, almeno sensibilmente, e ciò succede li 21 Giugno, e li 21 Dicembre.

Così tutto è determinato riguardo all' Ecclittica: noi conosciamo i due punti equinoziali, ove questo cerchio traversa l'equatore; noi sappiamo che se ne scosta dopo di sopra e di sotto, di qua e di là, a tramontana e mezzodi, nei solstizj, e questo allontanamento altre volte era di 24° . Non manca dunque niente per segnare nel cielo l'annua linea, o il gran cerchio dell' Ecclittica: si parlerà ben tosto della divisione di questo cerchio in 12 segni (76).

69. Formato un globo artificiale, come quello della Fig. 12, e segnatevi le stelle cognite, tracciatovi l'equatore ed i poli, (15) si potrà segnarvi insieme l' Ecclittica, e marcare le stelle, per le quali questo cerchio dovea passare; i più antichi Astronomi l'anno fatto.

Dell'obliquità dell' Ecclittica, e de' Tropici (a).

70. La distanza, o l'arco di circa 24° compreso tra l'equatore e l' Ecclittica, nei punti solstiziali si chiama l'*obliquità dell' Ecclittica*. Per conoscere questa obliquità, convenne osservare di quanto il sole in estate si alza-

C 2

alza-

(a) I *Tropici* tirano il loro nome dalla parola greca *Τροπή*, *volta*, perchè il sole giunto ai tropici, sembra ritornare a dietro, o voltarsi verso l'equatore.

alzava sopra dell'equatore, e quanto in inverno s'abbassava al di là (64), o sia quanto fosse più elevato nel mezzodì, in estate, che in inverno; e avendo trovato 47° di differenza, la metà di questa differenza, o sia $23^{\circ} \frac{1}{2}$, ha dato la massima distanza tra l'ecclittica e l'equatore. Attualmente noi non abbiamo miglior metodo per determinare l'obliquità dell'ecclittica.

71. Questa obliquità dell'ecclittica, già 2000 anni era in circa di 24° ; al giorno d'oggi non è più che di $23^{\circ} 28'$, e diminuisce intorno un minuto ogni 100 anni (158).

72. Gli antichi, per determinare l'obliquità dell'ecclittica, osservavano le ombre solstiziali del sole. Sia AB (Fig. 7) un *Gnomone* (α), o sia uno stilo qualunque, elevato perpendicolarmente, come l'obelisco del Campo Marzo a Roma, o pure un'apertura A fatta in un muro AB per lasciar passare un raggio del sole; sia SAE questo raggio nel solstizio d'inverno, BE l'ombra del sole; OAC il raggio del solstizio d'estate, e BC l'ombra solstiziale la più breve. Nel triangolo ABC rettangolo in B, di cui si conoscono i lati AB, BC, è facile ritrovare per le regole di Trigonometria, o col compasso, il numero de' gradi, che contiene l'angolo ACB, o sia OCB, che esprime l'altezza del sole nel solstizio d'estate. Si farà lo stesso nel triangolo ABE; e si avrà l'angolo E, uguale all'altezza del sole nel solstizio d'inverno. In questo modo secondo Pitea, citato da Strabone e da Tolomeo con Ipparco, l'altezza AB del gnomone era alla lunghezza dell'ombra in estate a Bisanzio, e a Marfiglia, 250 anni avanti G. C., come 120 a 41 $\frac{4}{5}$. Da che Cassendo inferì l'obliquità dell'ecclittica per quel tempo di circa $23^{\circ} 52'$.

73. Ogni parallelo all'equatore, che il sole sembra descrivere di giorno in giorno col suo moto diurno, è tanto lontano dall'equatore, quanto il punto di ecclittica, in cui trovasi il sole. Quando il sole è lontano 10° dall'equatore, o quando ha 10° di declinazione, descrive un parallelo di 10° lontano dall'equatore, e passa per il zenit di tutti i paesi della terra che anno 10° di latitudine. Quando è giunto alla sua maggior distanza B (Fig. 12) che è di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, descrive un parallelo BC, il più remoto dall'equatore, il più piccolo che possa descrivere, e questo si chiama *Tropico*. Vi sono due tropici, uno di qua, l'altro di là dall'equatore: chiamasi l'uno *Tropico del Cancro*, perchè il sole lo descrive nel giorno del solstizio d'estate, entrando nel segno di Cancro (76); l'altro si chiama *Tropico del Capricorno* perchè è descritto nel giorno del solstizio d'inverno entrando il sole in Capricorno. Così i Tropici comprendono tutto lo spazio, in cui

(α) *gnomon*, regola, squadra, stilo retto. I più famosi Gnomoni che abbiano servito a questo oggetto sono quelli di Bologna, di Firenze, di Roma, di S. Sulpizio a Parigi.

cui può trovarsi il sole , e questo spazio è di 47°. I tropici toccano l'ecclittica , e si confondono con questo cerchio nei punti solstiziali.

74. Il tropico del cancro passa sulla terra , un poco di là dal monte Atlante nella costa occidentale dell' Affrica , poi per Siene in Etiopia , di là per il mar Rosso , il monte Sinai , la Mecca patria di Maometto , per l' Arabia felice , l' estremità della Persia , l' India , la China , il mar Pacifico , il Messico , e l' Isola di Cuba . Il tropico di Capricorno passa per il paese degli Ottentoti in Affrica , pel Brasile , il Paraguai , il Perù , e il mar Pacifico.

75. Quando diciamo , che il sole descrive ogni giorno un parallelo all' equatore , si suppone che la sua declinazione sia la medesima per 24 ore , che resti nel medesimo punto dell' ecclittica , o almeno all' istessa distanza dall' equatore : ciò in rigore non è esatto , perchè il sole muta continuamente distanza dall' equatore , e per conseguenza trovasi ad ogni istante in un parallelo differente : descrive piuttosto una spirale , che un cerchio: ma per semplificare le espressioni e l' idee , nei primi elementi d' astronomia supponesi , che il moto diurno del sole facciasi in un cerchio parallelo all' equatore ; si considera , come insensibile la piccola quantità , per cui il sole s' accosta all' uno de' poli nello spazio di 24 ore .

Moto del sole .

76. Per contare , e misurare i moti del sole , e degli altri corpi celesti , era necessario stabilire in cielo un punto per principio , a cui rapportarli . Il ritorno delle stagioni , che per gli uomini era la cosa più rimarcabile e più interessante di tutta l' astronomia , fissò questo punto di partenza . Il sole col suo moto annuo nell' ecclittica ritornava ogni anno a traversar l' equatore , e riportar alle campagne la primavera : questo rinnovamento della natura servì a marcare il principio dell' anno , e gli Astronomi per cominciare le loro misure presero questo punto di cambiamento , che è quello dell' intersezione dell' ecclittica e dell' equatore . Chiamasi *longitudine* la distanza del sole dal punto equinoziale contata lungo l' ecclittica . Quando il sole col suo moto annuo ha percorso 30° dell' ecclittica , partendo dall' equinozio , si dice che ha 30° di longitudine , o pure un segno , e così di seguito fino a 12 segni .

I primi 30 gradi sono compresi sotto il nome di *Ariete* , *Montone* , che si rappresenta con questo carattere γ ; li 30 gradi che seguono formano il *Toro* τ , vengono dopo i *Gemelli* π , il *Cancro* σ , il *Leone* Ω , la *Vergine* ν , la *Bilancia* δ , lo *Scorpione* μ , il *Sagittario* ϕ , il *Capricorno* ϵ , l' *Aquario* ♒ , i *Pesci* ♓ . Come si ha ne' due seguenti versi :

*Sunt Ariet , Taurus , Gemini , Cancer , Leo , Virgo ,
Libraque , Scorpius , Arcitenens , Caper , Amphora , Pisces .*

77. Questi 12 segni , i nomi de' quali appartengono alle 12 porzioni dell' ecclittica di 30° ciascuna , contate dall' equinozio , sono differenti dalle

le *coffellazioni* , o figure stellate , che portano i medefimi noml (230) ; fi diftingue il fegno d' Ariete dalla coffellazione d' Ariete : l' uno non è altro , che la prima duodecima parte , o li 30 primi gradi del cerchio dell' ecclitrica ; l' altro è un complesso di ftelle , che rifpodeva è vero una volta nel cielo al medefimo luogo del fegno dell' Ariete , a cui anzi ha dato il nome , ma che attualmente fi trova molto più avanzato , come fi dirà parlando della preceffione degli equinozj (319) .

78. Per determinar la longitudine del fole , i primi Aftronomi non ebbero bifogno d' altro , che dei due folstizj , e dei due equinozj ; quefte quattro offervazioni dividevano l' anno in quattro ftagioni : fi efaminava per mezzo dell' ombre la minima altezza del fole , e fi aveva il folstizio d' inverno ; la maggior altezza indicava il folstizio di eftate ; l' altezza intermedia o mezzana tra le due altezze folstiziali , uguale a quella dell' equatore , indicava i giorni degli equinozj . Quefte offervazioni fecero conoscere ai primi offervatori quanta fofse la lunghezza dell' anno , efpreffa in giorni , e infieme lor fece conoscere , in quei giorni dell' anno civile il fole entrava in ciafcun fegno .

79. Attualmente fi offerva , che il fole entra in Ariete ai 20 di Marzo , in Toro li 20 Aprile , in Gemini li 21 Maggio , in Cancro li 21 Giugno , in Leone li 22 Luglio , in Vergine li 23 Agofto , in Libra li 23 Settembre , in Scorpione li 23 Ottobre , in Sagittario li 22 Novembre , in Capricorno li 21 Dicembre , in Aquario li 19 Gennajo , in Pefci li 18 febbrajo : ciò bafia per mostrare , e marcare fu i globi la corrispondenza de' giorni coi fegni del Zodiaco , e per trovare il giorno dell' anno , in cui il fole rifponde a qualunque grado de' 12 fegni .

80. Le quattro offervazioni degli equinozj , e dei folstizj , baftavano per far conoscere agli antichi offervatori , quanta fofse la lunghezza dell' anno , efpreffa in giorni , vale a dire , quante volte il fole levava e tramontava tra due equinozj fucceffivi di primavera , o tra due folstizj dello fteffo nome . Potevano anche riconoscere il moto annuo , o proprio del fole (60) offervando le ftelle alle quali fi accoftava fucceffivamente nel corfo d' un anno . Non fu difficile vedere , che vi volevano 365 giorni per ricondurre il fole preffo le medefime ftelle , cioè , che levava e tramontava 365 volte innanzi di trovarfi nel medefimo punto del cielo . Vi vollero molti anni , e forse molti fecoli , per rilevare che v' erano circa 6 ore di più , o fia che ad ogni 4 anni , al tal giorno , fi vedeva il fole un po meno avanzato verfo la ftella , alla quale fi fofse comparato , e ciò di un grado , o del valor d' un giorno . Quefto ritardo divenne dopo più fenfibile , e a capo di 60 anni , fi dovette veder il fole raggiunger la ftella 15 giorni più tardi che non avrebbe fatto , fe ogni ritorno fofse ftato efattamente di 365 giorni .

81. Il ritorno delle ftagioni fu un mezzo ancora più naturale e più fenfibile , di determinare la durata delle rivoluzioni del fole . Gli antichi Aftronomi offervavano il ritorno del fole all' equinozio , vale a dire , il fuo paffaggio per l' equatore (78) , vedevano , che in 60 anni ciafcuno di 365 giorni , il fole non ritornava precifamente all' equatore , e che vi vo-

leva-

levano intorno 15 giorni di più: ne seguiva naturalmente, che la durata del suo periodo era non di 365 giorni esattamente, ma di 365 e 6 ore.

82. Si sono osservati dopo più sovente e più esattamente gli equinozi; perciò s'è determinato con maggior precisione la lunghezza dell'anno, e si è trovata di 365^{gi.} 5^{h.} 48. 45" (315); l'incertezza non arriva a tre o quattro secondi di tempo. Ma conviene ben riflettere, che questa è la durata dell'anno *Tropico* o del ritorno delle stagioni; poichè l'anno *federale*, cioè quello che riconduce il sole all'istessa stella, è più lungo, essendo di 365^{gi.} 6^{h.} 9'. 10". Se ne vedrà la ragione, quando si parlerà della precessione degli equinozi (321).

Dei Pianeti in generale.

83. Il primo di tutti i moti celesti, che gli uomini osservarono fu il moto diurno (2) comune a tutto il cielo; i moti propri del sole, e della luna furono poscia i più facili da rimarcare; in fine osservazioni più replicate e più assidue fecero vedere, che tra gli astri, che risplendono in una bella notte, ve n'erano cinque che avevano un moto proprio osservabile: si chiamarono *Pianeti* (*erranti*). I loro nomi sono Mercurio ☿, Venere ♀, Marte ♂, Giove ♃, e Saturno ♄. Questi pianeti sono talora più brillanti delle stelle, ma di lume tranquillo, e senza veruna scintillazione (eccettuata forse Venere), mentre le stelle fisse tramandano un lume risplendente e vivo, di cui la scintillazione, o il fremito, annunzia, che le stelle sono corpi luminosi per se stesse, o spezie di soli, che la sola lontananza fa parere piccolissimi.

84. I Pianeti saranno facili a distinguersi in cielo, quando si saranno conosciute le 12 costellazioni del Zodiaco, di cui si parlerà dopo (230); poichè in queste 12 costellazioni non vi sono se non 4 stelle della prima grandezza, *Aldbaran*, *Regolo*, la *Spica*, e *Antares*, che rassomiglino ai pianeti per il loro splendore. Quando si conosce la situazione di queste 4 stelle, si distingue tosto un pianeta da una stella fissa, vedendosi il primo intorno l'eclittica; ma per distinguere, quale de' 5 pianeti si scorre, bisogna saper calcolare il suo sito attuale (442).

85. I pianeti percorrono il Zodiaco, come il sole, con moto proprio a ciascuno, e descrivono orbite assai prossime all'eclittica; poichè Venere, che se ne allontana il più, non ha mai più di 8° $\frac{2}{3}$ di latitudine, o di distanza dall'eclittica. Le rivoluzioni periodiche de' pianeti, o i tempi che impiegano a ritornare al medesimo punto del cielo, sono facili da determinare osservando il loro ritorno presso una stella. Queste sono le durate di questi corpi secondo le osservazioni più recenti, perchè gli antichi s'erano ingannati di molto nella misura di queste rivoluzioni. Mercurio 87^{gi.} 23^{h.}; la luna 27^{gi.} 7^{h.} 43'; Venere 224^{gi.} 17^{h.}; il sole 365^{gi.} 6^{h.}; Marte un anno 321^{gi.} 23^{h.}; Giove 11 anni comuni 317^{gi.}; Saturno 29 anni, 177^{gi.}. Vedremo poi la maniera di trovarle esattamente rispetto agli equinozi (454).

Delle

*Delle ascensioni rette, declinazioni, longitudine,
e latitudine degli astri.*

86. Quando i primi Astronomi ebbero conosciuto i pianeti, e la durata delle loro rivoluzioni, vollero dividere queste rivoluzioni in diverse parti, ed assegnare a ciascun pianeta un luogo per ciascun giorno, cominciando dal punto fisso che s'era scielto, vale a dire, dalla sezione d'Ariete, o dal punto equinoziale (76); ma il cerchio che descrive il sole col suo moto annuo non serviva prima se non che a misurare il progresso del sole: si trovò che era più facile di riferire i moti degli altri pianeti all'equatore, e s'adopò l'equatore a quest' ufo nel modo seguente.

87. Supponiamo che si abbia conosciuto in cielo una stella vicina all'equinozio, o al punto dove l'eclittica e l'equatore si tagliano; e che si voglia col suo mezzo determinare le posizioni dell'altre stelle: il metodo più semplice sarà di seguire l'equatore tutto attorno il cielo, a misura che gli astri si succedono per il moto diurno; gl' intervalli dall'uno all'altro chiamansi *differenze d' ascensione retta* . La ragion di questa denominazione è, che supposta la sfera retta, o l'equatore che faccia angoli retti coll'orizzonte, come sarebbe se fossimo sotto l'equatore, gli astri si levano rettamente, e non obliquamente: ivi le stelle più avanzate verso levante, che la prima stella presa per confronto, di 15° , si levano un' ora più tardi: allora si dice che la loro differenza d'ascensione retta è di 15° , o di un'ora.

88. In una sfera obliqua, in cui l'equatore resta inclinato all'orizzonte, come in tutta l'Europa, non si deve prendere il levare delle stelle, ma il loro passaggio per il meridiano: essendo questo cerchio sempre perpendicolare all'equatore, tutte le stelle che corrispondono perpendicolarmente ad uno stesso punto dell'equatore, passano insieme per il meridiano; e diciamo che la loro ascensione retta è la medesima, perchè si leverebbero tutte ad un tempo se fossimo sotto dell'equatore.

89. Sia EQ (Fig. 17) una porzione dell'equatore; ZM il cerchio meridiano; le stelle A, B, che passano per il meridiano con il punto M dell'equatore, anno la loro ascensione retta marcata nel punto M; e se questo punto dell'equatore passa per il meridiano un' ora dopo del punto equinoziale, si dirà, che tutte queste stelle anno un'ora, o 15° di ascensione retta: quelle che passeranno due ore più tardi della prima stella di Ariete avranno rispetto ad essa 30° di differenza d'ascensione retta: così l'*ascensione retta d'un astro* è la sua distanza dall'equinozio, contata sopra l'equatore.

90. Conoscendo l'ascensione retta d'una stella, si troverà facilmente quella di tutte l'altre stelle, osservando, quanto dopo la prima, passano per il meridiano: gl'intervalli di tempo convertiti in gradi, a ragione di 15° per ora, daranno le loro differenze d'ascensione retta, che essendo aggiunte a quella della prima stella cognita, daranno le ascensioni rette
di

di tutte le altre. E' vero, che si suppone qui cognito in cielo il punto equinoziale, e l'ascensione retta della prima stella; si vedrà poi la maniera di trovarla esattamente (316).

91. Quando si vedono molte stelle passar insieme per il meridiano, benchè abbiano tutte la medesima ascensione retta, sono le une più elevate dell'altre, una apparisce in A, l'altra in B: questa distanza delle stelle dall'equatore si chiama *declinazione*: BM è la declinazione della stella B, AM la declinazione della stella A. Se si osserva la stella A passare per il meridiano a 51° di altezza (23), e se si conosce l'altezza dell'equatore per esempio di 41° (33), si concluderà naturalmente che la stella è più alta dell'equatore di 10° , o sia che ella ha 10° di declinazione. Quando la stella è al di sopra dell'equatore, o dalla parte di tramontana, si dice che la sua declinazione è *boreale*, o *settentrionale*; ma quando è di là, più bassa dell'equatore, o dalla parte di mezzodì, si dice che la sua declinazione è *australe*, o *meridionale*.

92. Per la stessa ragione chiamansi *cerchi di declinazione* tutti i cerchi, che passando per li due poli del mondo, sono perpendicolari all'equatore. Questi cerchi sono meridiani, quando si considerano sulla superficie della terra; cerchi orarj, quando non si riguarda che la loro distanza dal meridiano, perchè indicano l'ora che è. Questi nomi di cerchi di declinazione, di meridiani, o di cerchi orarj, si prendono sovente uno per l'altro; ma il senso proprio di queste tre denominazioni è relativo a tre differenti usi; la prima si rapporta all'equatore; la seconda alle longitudini geografiche e terrestri; la terza alla distanza degli astri rispetto al meridiano d'un osservatore, come si spiegherà parlando del tempo vero (201).

93. Il moto diurno di tutti gli astri ci ha somministrato un metodo semplice e naturale di riferirli all'equatore, di marcare le loro situazioni lungo questo cerchio celeste, cioè le loro ascensioni rette, e le loro distanze da questo cerchio, o sia le loro declinazioni. Se si volesse preferir l'eclittica (64), riferendo ogni stella al punto dell'eclittica, a cui corrisponde perpendicolarmente, come anche è praticato da gran tempo dagli astronomi, si chiameranno *longitudini* le distanze così misurate lungo l'eclittica, cominciando sempre dall'istesso punto equinoziale, come si è fatto per il sole (76).

94. Sia YQ (Fig. 18.) l'equatore, YC l'eclittica inclinata all'equatore di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, S una stella che corrisponde perpendicolarmente al punto M dell'equatore. Se si tira parimenti un arco di cerchio SEB perpendicolare all'eclittica, il punto B marcherà il punto dell'eclittica, a cui si riferisce la stella S, e l'arco dell'eclittica YB farà la longitudine della stella. Perciò la longitudine d'un astro è l'arco, o la distanza tra l'equinozio, e il punto dell'eclittica, al quale quest'astro corrisponde perpendicolarmente.

95. Di molte stelle, che possono corrispondere al medesimo punto dell'eclittica, le une possono esserne più vicine, che le altre, avere disse-

renti *latitudini*, cioè distanze differenti dall' ecclittica . Se la stella situata in S è lontana dall' ecclittica ΥBC per un arco SB misurato perpendicolarmente, la latitudine sarà SB; se fosse situata in E, avrebbe la medesima longitudine, ma la sua latitudine EB sarebbe minore .

96. I cerchi descritti nella superficie del globo, perpendicolarmente all' ecclittica, come SB, chiamansi *cerchi di latitudine*, perchè in fatti servono a contare le latitudini nel mentre che servono a marcare le longitudini sull' ecclittica .

97. Le osservazioni che gli astronomi fanno sulla posizione degli astri, procedono sempre per ascensione retta, e declinazione: non impiegano quasi mai altro metodo per determinare il sito e il moto de' pianeti; perchè l' equatore e il meridiano sono i cerchi i più familiari, i più costanti, i più facili da determinare e da riconoscere, ciò che rende le misure più naturali, più facili e più esatte (§ 9).

98. E non ostante gli astronomi contano dopo i moti de' pianeti per longitudini, e latitudini, e li rapportano all' ecclittica in tutte le loro tavole astronomiche: la ragione è pur naturale; perchè nell' ecclittica sembra farsi il moto del sole, che va accompagnato da tutti i pianeti, l' orbite de' quali sono prossime all' ecclittica: quindi i calcoli divengono più semplici rapportando i pianeti a questo cerchio da cui sempre poco si scostano; le loro inegualità o irregolarità appariscono minori; si trova maggior uniformità facilità e brevità nelle tavole astronomiche. Ciò bastava per preferir le longitudini e le latitudini, quando si trattava di calcolo, come si preferiscono le ascensioni rette e le declinazioni, quando è questione di osservare. Facile è poi col calcolo trigonometrico, date queste, trovar quelle, e vice versa .

99. Così nella pratica ordinaria si osserva l' ascensione retta e la declinazione d' un astro; ma avanti d' inserirlo nelle tavole generali de' moti celesti, se ne conclude la longitudine e la latitudine, per via della trigonometria sferica (318).

Della sfera Armillare .

100. Sin qui per nome di sfera celeste non s' è inteso altro che l' apparente concavità del cielo, figurata in forma di globo; poichè una qualunque palla può chiamarsi sfera, e servire a rappresentar i cerchi, ed i moti, di cui s' è parlato . Non ostante s' è introdotto l' uso di chiamar *sfera*, o più tosto *sfera armillare*, un istrumento composto di molti cerchi scavati, posti gli uni negli altri, come appresso poco si concepiscono i cerchi della sfera celeste: questa sfera armillare viene rappresentata in grande nella tavola seconda (Fig. 11.) Il suo nome viene da quello di *armilla*, che significa un anello, o un collare; perchè in fatti i cerchi della sfera ne anno quasi la forma .

101. L' orizzonte è il cerchio AGB, posto sopra quattro colonne attaccate al piè della sfera. Il meridiano è il cerchio AZB, verticalmente elevato sopra l' orizzonte, ritenuto a basso in un incastro posto nel piè dell'

dell' istrumento, e da' lati in due tagli fatti nell'orizzonte, a tramontana e mezzodì: questi due cerchi sono fissi.

102. I cerchi mobili formano un composto intrecciato, che gira sopra un asse P R. Quattro sono cerchi maggiori, l'equatore, (25) l'eclittica (64), e i due coluri. Chiamasi *coluro dei solstizj* un cerchio che passa per li poli dell'equatore, o del mondo, e insieme per li poli dell'eclittica, e per li punti solstiziali; è un meridiano a cui si è dato questo nome particolare; è anche il più rimarcabile di tutti, perchè serve in un tempo per cerchio di declinazione, e per cerchio di latitudine, e particolarmente a misurar l'obliquità dell'eclittica. Tutti gli astri posti in questo coluro anno 90° , o pur 270° d'ascensione retta, e insieme di longitudine. Il *coluro degli equinozj* è perpendicolare al primo; passa anche esso per li poli del mondo, ma per li punti equinoziali; serve a contare le ascensioni rette, per mezzo degli angoli che fa con tutti gli altri meridiani, o cerchi di declinazione. Tutti gli astri situati in questo coluro anno zero, o 180° d'ascensione retta; ma le loro longitudini variano.

Vedonsi nell'istessa macchina quattro cerchi minori, cioè, li due *tropici* H M, D I (73); e i due *polari*, X V, S O; che sono lontani dai poli del mondo $23^\circ \frac{1}{2}$ quanto i tropici lo sono dall'equatore; sono inutili in astronomia, ma servono ai Geografi per indicare i paesi della terra, che sono situati nelle zone glaciali (140).

103. Il *Zodiaco* (la fascia degli animali per li nomi di molti segni in esso) è appunto una fascia H I, che ordinariamente si mette sopra d'una sfera armillare: ha intorno $17^\circ \frac{2}{3}$ di larghezza, o sia $8 \frac{2}{3}$ da ogni lato dell'eclittica. In astronomia se ne fa poco uso, e serve solamente per indicare lo spazio, entro cui stanno i pianeti, che non s'allontanano dall'eclittica al più che di 8° in 9° .

104. Si pone anche sulla sfera una *rosetta* K L, o sia un cerchietto diviso in 24 ore, che serve a risolvere varj problemi in maniera comoda senza calcolo, come si spiegherà trattando del globo celeste (171, e seg.). La rosetta è fissa sul meridiano, ed ha il centro nel polo della sfera, o nell'estremità dell'asse prolungato in P: porta un ago, o raggio, che gira d'accordo colla sfera, senza che la rosetta muti luogo. Finalmente si vede il sole e la luna portati sopra due braccia, che girano l'uno intorno il polo dell'eclittica, l'altro intorno un punto da esso distante 5° (165).

105. L'invenzione della sfera armillare è certamente tanto antica che quella dell'istessa astronomia. S'attribuisce ad Atlante che si crede esser vissuto 1600 anni avanti Gesù Cristo, a Ercole, a Museo 12 a 1300 anni avanti G. C.: ma è più naturale di credere che viene da Babilonia o dall'Egitto. La sfera d'Archimede, che fu poscia così famosa, non si limitava a rappresentare i cerchi della sfera; era un *planetario*, o sia una macchina propria a rappresentare insieme i moti de' pianeti dentro un

globo di vetro, che Claudiano ha celebrato nell' Epigramma III. Di questa pure parlano Ovidio:

Arte Syracosia suspensus in aere clauso

Stat globus, immensi parva figura poli. Fast. VI. v. 277.

Della sfera retta, obliqua, e parallela.

106. Si distinguono tre posizioni differenti della sfera armillare, per rappresentare tre specie di situazioni nei paesi differenti della terra, la *sfera retta*, la *sfera obliqua*, la *sfera parallela* secondo che l'equatore taglia l'orizzonte ad angoli retti, o obliqui, o pure che gli è parallelo. Le apparenze del moto diurno sono molto differenti in queste tre posizioni, che sono rappresentate nelle *Figure* 9. 10. 13. e ne daremo un'idea. E' necessario però d'avvertire avanti, che parlando del sole, s'intenderà del suo centro solamente, senza far attenzione al suo diametro, o alla sua larghezza. Vi sono due altre cagioni, che contribuiscono a render il giorno più lungo di quello porti la posizione della sfera; una è la *rifrazione* l'altra la luce crepuscolare.

107. La *rifrazione* fa che li raggi del sole si piegano traversando l'atmosfera (738) in modo che arrivano a noi prima che se venissero direttamente. La *rifrazione* è tale, che quando l'orlo superiore del sole è veramente nell'orizzonte, la *rifrazione* l'innalza tanto, che apparisce intieramente sopra, e l'orlo inferiore tocca l'orizzonte, l'innalzamento della *rifrazione* in tal sito essendo appresso poco eguale al diametro del sole. Vi vogliono nei nostri climi 4 in 5 minuti di tempo perchè il sole s'innalzi mezzo grado, di maniera che il giorno artificiale per tal conto viene a prolungarsi più d'un mezzo quarto d'ora; e diventa l'effetto più confidabile avanzando verso le zone glaciali; tanto che sotto il polo, per l'effetto solo della *rifrazione*, si vengono ad avere intorno 67 ore di giorno di più.

108. La seconda cagione, che somministra luce in un paese la di cui posizione di sfera non sembra indicare se non tenebre, è il *lume crepuscolare* (752). Quel lume dolce e tranquillo dell'aurora, che si vede crescere a poco a poco la mattina avanti il levare del sole, e scemare la sera dopo che il sole è tramontato, vien prodotto dalla dispersione de' raggi nella massa dell'aria, che li riflette da tutte le parti. Il crepuscolo dura tutta la notte nel mese di Giugno a Parigi, e nei paesi che anno più di $48^{\circ}\frac{1}{2}$ di latitudine; se vi fossero abitatori sotto il polo, avrebbero un crepuscolo di sette settimane, talmente che la durata delle tenebre per quel punto viene diminuita di 14 settimane per l'effetto dei crepuscoli, che anno luogo senza che il sole comparisca sopra l'orizzonte. Negli articoli seguenti faremo astrazione da queste due cagioni; e quel che si dirà delle circostanze de' giorni nelle accennate tre posizioni della sfera, deve

deve intendersi dell' effetto del sole, quando il suo centro è veramente nell'orizzonte.

109. La sfera retta, vale a dire, quella, in cui l'equatore EV (Fig. 10.) si trova perpendicolare all'orizzonte HO, e lo taglia ad angoli retti, ha luogo per quelli che abitano sotto l'equatore, o nella linea equinoziale, come a Quito nell'America meridionale: Ivi i due poli sono sempre nell'orizzonte; tutti i paralleli dell'equatore come PA, sono tagliati dall'orizzonte in due parti eguali, che il sole ed ogni stella percorre ciascuna in 12 ore: perciò i giorni sono eguali tra loro e uguali alle notti per tutto l'anno.

110. Il sole passa due volte all'anno per il zenit, 20 Marzo, e 23 Settembre, che sono i giorni nei quali il sole descrive l'equatore, che passa per il zenit di quei paesi. Si può conchiudere, che anno come due, estati, e due primavere, non dovendosi parlare d'inverno per paesi nei quali il sole lancia raggi quasi sempre perpendicolari. Non ostante è da osservare, che il calore che riesce estremo sulle rive e su i fondi, si cambia in una dolce temperatura nei luoghi elevati per 1200 a 1500 pertiche sopra il livello del mare; e che sopra montagne di 2500 pertiche e in su, benchè nella zona torrida, si prova un freddo insopportabile ed un'eterna neve.

111. Nella sfera retta si ha il sole dalla parte di tramontana, e l'ombra verso mezzodi, per mezzo l'anno, dai 20 Marzo fino ai 23 Settembre, e negli altri sei mesi il sole a mezzodi, l'ombra a tramontana: nei due giorni equinoziali l'ombra sparisce totalmente nell'ora del mezzodi, poichè il sole è nel zenit.

112. In questa posizione di sfera tutte le stelle levano e tramontano, e stanno 12 ore sotto l'orizzonte, 12 sopra; quando nell'altre posizioni vi sono sempre delle stelle che non levano mai, ed altre che mai non tramontano.

113. Si vede il sole, e tutti gli astri levarsi perpendicolarmente, come anche lo dice Lucano parlando del viaggio di Catone in Libia, non obliqua meant, ec. Pharf. IX. 533. Bisogna però osservare, che l'applicazione di Lucano non è molto esatta, mentre il viaggio di Catone era solo verso il Tempio di Giove Ammone, situato presso il tropico del cancro, e non sotto l'equatore.

114. La sfera obliqua ha luogo per tutti i paesi della terra, che non sono nè sotto l'equatore, nè sotto i poli; e questo e nell'emisferio boreale (Fig. 8), e nell'emisferio australe (Fig. 9). Nella sfera obliqua si ha l'equatore obliquo rapporto all'orizzonte; i paralleli dell'equatore sono dall'orizzonte tagliati disegualmente; il giorno non è uguale alla notte, se non nei due giorni degli equinozi, 20 Marzo, e 23 Settembre, nei quali il sole descrive l'equatore, il quale è sempre tagliato in due parti eguali dall'orizzonte.

115. Nei paesi settentrionali, come l'Europa, i giorni più lunghi delle notti si anno mentre il sole si trova nei sei primi segni, l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Granchio, il Leone, la Vergine (76), perchè allora

lora la sua declinazione è settentrionale , e descrive dei paralleli come AB (Fig. 8) che anno la parte maggiore AD sopra l'orizzonte . Nei paesi meridionali , come in una parte dell'Africa e dell'America meridionale , i giorni sono più lunghi , quando il sole è negli altri sei segni , perchè allora il sole descrive paralleli , de' quali le parti maggiori sono sopra l'orizzonte : poichè l'asse del mondo PR passa per li centri K , C , N di tutti i paralleli ; or la parte meridionale CR dell'asse si trova elevata sopra l'orizzonte dei paesi meridionali (Fig. 9) ; dunque i paralleli anno il loro centro sopra l'orizzonte ; dunque gli *archi diurni* di questi paralleli sono maggiori degli *archi notturni* ; dunque i giorni vi sono più lunghi delle notti , quando il sole è nei segni meridionali .

116. Gli archi superiori , o diurni de' paralleli sono tanto più grand' rapporto agli archi notturni , quanto più sono vicini al polo elevato . Perciò il parallelo il cui diametro è IG (Fig. 3) (queste figure si guardano da ponente) ha la sua parte diurna GY molto più grande rispetto alla sua parte notturna IY , che il parallelo KL , di cui KN ed NL sono le due porzioni ; perchè l'asse del mondo RCP allontanandosi di più in più dall'orizzonte OH , il centro , o il mezzo X del parallelo GI , si trova più innalzato , che il centro V del parallelo KL : perciò il primo si stacca più dall'orizzonte ; la sua porzione YI tagliata dall'orizzonte diventa più piccola e quando il sole v'è giunto , sta meno tempo sotto l'orizzonte .

117. L'arco diurno del tropico del cancro è dunque il più grande di tutti gli archi diurni del sole per li paesi settentrionali ; perchè il tropico del cancro è più avanzato verso il Nord di tutti gli altri paralleli del sole . Perciò il più lungo giorno dell'anno è quello , in cui il sole descrive il tropico del cancro , cioè il giorno del solstizio d'estate : per l'istessa ragione la più lunga notte è quella del solstizio d'inverno 21 Dicembre .

118. Nella sfera obliqua , come nella sfera retta , al tempo degli equinozi il giorno è uguale alla notte , perchè allora il sole descrive l'equatore , il quale è sempre tagliato in due parti uguali da qualunque orizzonte , per la proprietà dei cerchi maggiori della sfera , che passano tutti per il centro , e si tagliano in ogni senso in due parti uguali (29) .

119. Nella sfera obliqua dei paesi settentrionali di qua dal tropico , il sole ascende dopo i 21 Dicembre giorno del solstizio d'inverno , fino ai 21 Giugno giorno del solstizio d'estate ; perchè ogni giorno s'avvicina a tramontana d'una piccola quantità ; i giorni crescono , e le notti calano , perchè gli archi diurni de' paralleli diventano più considerabili . Chiamansi *segni ascendenti* quelli , che il sole percorre in questo frattempo , che sono il Capricorno , l'Aquario , i Pesci , l'Ariete , il Toro , i Gemelli : questo nome di segni ascendenti assai è usitato in astronomia , per molte circostanze , nelle quali bisogna distinguere i *segni ascendenti* dai *segni discendenti* .

120. I giorni egualmente lontani da un istesso solstizio sono uguali , come il 20 Maggio ed il 23 Luglio , il sole tramonta a Parigi a 7^h 43 , per-

perchè la declinazione del sole (91) essendo d'intorno 20, tanto nell'uno che nell'altro, descrive il sole il medesimo parallelo, tanto li 20 Maggio mentre s'allontana dall'equatore per ascendere verso il tropico, quanto li 23 Luglio, mentre s'avvicina all'equatore dopo il solstizio d'estate.

121. Quando il sole, in vece di aver 20° di declinazione boreale come nel caso precedente, se ha 20° d'australe, il che accade li 21 Novembre, e 20 Gennaio in circa, la lunghezza del giorno è uguale alla lunghezza della notte nel primo caso, e la durata della notte è uguale alla durata del giorno quando il sole descriveva il parallelo opposto: perchè in distanza di 20° da una parte e dall'altra dell'equatore i paralleli sono uguali ed egualmente tagliati dall'orizzonte, ma in ordine inverso: se il parallelo MDL (Fig. 3) è tanto lontano dall'equatore ECQ verso mezzodì, quanto il parallelo KVN L verso il Nord, cioè, se CW è uguale a CV, allora la parte DM sarà uguale alla parte LN, perchè i triangoli CDW, e CVN saranno uguali; ma WL è uguale ad VL, perchè i paralleli sono a distanze uguali dall'equatore; dunque le parti rimanenti DM, NL saranno uguali, o sia l'arco diurno di un parallelo sarà uguale all'arco notturno dell'altro, ed il giorno dei 20 Maggio sarà uguale alla notte dei 20 Gennaio. E' lo stesso di tutti gli altri giorni della primavera e dell'autunno, che si possono paragonare ai giorni corrispondenti dell'estate e dell'inverno; e si troverà l'istessa egualità, quando vi sarà ugual distanza del sole dall'equatore; la sola differenza che v'entra, è quella che proviene dalle rifrazioni, e può esser di alcuni minuti come già s'è avvertito (107).

122. Due paesi situati a latitudini uguali, l'uno al nord dell'equatore, l'altro a mezzodì, anno le stagioni sempre opposte; la primavera dell'uno è autunno per l'altro, la state del primo fa l'inverno del secondo; perchè il sole all'uno s'avvicina, mentre dall'altro s'allontana, e perchè gli archi diurni dalla parte del nord sono uguali agli archi notturni dalla parte di mezzodì prendendo gli stessi giorni. Si paragoni la figura 8 colla figura 9: nell'una il polo settentrionale P è innalzato sopra l'orizzonte, nell'altra il polo meridionale R: il parallelo GL in ambe le figure è al mezzodì dell'equatore; ma nella figura 8 il mezzodì è al basso, nella figura 9 in alto: nella figura 8 l'arco diurno GM è minore dell'arco notturno ML, mentre nella figura 9 l'arco diurno GM è il maggiore: l'arco notturno ML nella figura 8 è uguale all'arco diurno GM nella figura 9; per esempio nei paesi, che anno 30° di latitudine boreale, il giorno è lungo quanto la notte nei paesi che sono 30° verso ovest di là dall'equatore, ed arriva nell'istesso tempo agli uni l'inverno, agli altri l'estate.

123. I paesi situati sotto lo stesso parallelo dall'istessa parte dell'equatore, per quanto sieno discosti tra loro, anno l'istessa durata del giorno, l'istessa stagione, perchè avendo la medesima altezza di polo, e l'asse del mondo istessamente collocato sopra l'orizzonte di ciascuno, anno i paralleli egualmente tagliati: perciò la Spagna ed il Giappone, Napoli e

Pe-

Peking, che anno la stessa latitudine dalla parte del nord, anno la stessa temperatura, l'istesse stagioni, l'istessa lunghezza del giorno: negli stessi tempi dell'anno, benchè lontani tra loro due mille leghe. La sola differenza che vi può essere, proviene dalle foreste, dalle montagne, dalle riviere, che favoriscono o contrariano l'effetto del calor del sole (130).

124. La *sfera parallela* è quella, che ha luogo quando l'orizzonte è parallelo all'equatore, o l'equatore stesso serve d'orizzonte. Non vi sono sopra la terra che due punti dove abbia luogo, cioè i due poli. E perchè questi due punti sono inabitati, e inabitabili, poco si dirà di questa parte. In questa posizione di sfera (fig. 13) il polo celeste P è nel zenit; l'anno consta di un sol giorno, e d'una sola notte, ambi appresso poco di sei mesi: intanto che il sole si trova per esempio nei sei segni settentrionali, il polo boreale viene illuminato senza interruzione; tutti i paralleli, che il sole descrive dall'equatore fino al tropico del cancro TR, e dal tropico all'equatore, sono sopra l'orizzonte, e paralleli al medesimo; il sole gira ciascun giorno intorno il cielo, senza cambiare sensibilmente di altezza. Ma quando dopo l'equinozio d'autunno passa nei segni meridionali, non comparisce più sull'orizzonte; i paralleli che descrive sono interamente nell'emisferio inferiore invisibile, e regna per sei mesi l'oscurità. Solamente bisogna eccettuare il crepuscolo, che comincia intorno 32 giorni avanti che il sole arrivi all'equatore e comparisca sull'orizzonte, e non cessa se non 32 giorni dopo la disparizione totale del disco solare. Vi sarebbe anche una piccola differenza tra gli abitanti del polo boreale, e quelli del polo australe, in ciò che quelli vedrebbero il sole 8 giorni di più che gli altri; perchè il sole a cagione dell'allungamento della sua orbita (per l'eccentricità dell'orbita terrestre) (309) sta 8 giorni di più nei segni settentrionali, che nei segni meridionali.

125. Ogni giorno un abitante del polo vedrebbe l'ombra girare intorno di se uniformemente, senza cambiar lunghezza. Per far un orologio solare orizzontale, basterebbe divider un cerchio in 24 parti uguali; ma il mezzodì in sfera parallela è cosa indeterminata; non essendovi alcun punto del cielo, da cui contar le ore per preferenza; noi prendiamo il punto più alto del corso del sole, che non ha luogo in sfera parallela. Parimenti non si saprebbe la direzione dell'ago, nè quella dei venti: nel polo nord tutti i venti sarebbero venti di mezzodì, e nel polo australe tutti venti di nord (sopra i venti vedete la Geografia di Varenio, e se volete, anche il Muschembroek).

126. Nella sfera parallela le stelle visibili non tramontano mai, e stanno all'istessa altezza sopra l'orizzonte; l'istessa metà del cielo è sempre visibile, mentre le stelle situate nell'alto emisferio non appaiono mai.

Delle stagioni, e dei climi.

127. Quanto più la sfera è obliqua, tanto più s'accresce il calore, e le stagioni diventano disuguali. I raggi del sole, che producono il calore ed ani-

animano tutta la natura , anno: la maggior forza quando vengono perpendicolari; anno meno aria da traversare , e perciò si cacciano con maggior forza negl' interstizj della terra , e dei corpi che vi sono soggetti per fomentare il calore . Quanto un clima più s'avvanza verso i poli , tanto più i raggi vi giungono obliqui: in un luogo che ha 45° di latitudine , il sole essendo nell'equatore , non vi s'innalza , che di 45° anche al mezzodì . In generale l'altezza del sole nel giorno dell' equinozio è sempre il complemento della latitudine , e con essa fa 90° (31) ; perciò quanto si aumenta la latitudine di un paese , e l'obliquità della sfera , più si diminuisce l'altezza del sole nell' equinozio ; e più che si allontanano i raggi dalla perpendicolare , o dalla linea del zenit , più si scema il calore . È vero , che il sole in estate s'innalza sopra l'equatore , ma in inverno di altrettanto s'abbassa , e l'ineguaglianza non ne diventa che più grande per le stagioni , scemandosi sempre il calore , quando cala l'altezza dell'equatore . Perciò nel Senegal , sulla costa d' Affrica , s'è veduto il Termometro , diviso col metodo di Reaumur , ascendere più di 38° sopra la congelazione : ma a Parigi , nei più gran calori non ascende comunemente se non che a 28° in 29° : nella Siberia non s'alza tanto in estate , ed in certi luoghi vi discende a 70° sotto il gelo , quando il più gran freddo del 1709 a Parigi non fu più di $150 \frac{3}{4}$ sotto il medesimo termine (mem. Acad. 1749).

128. La costruzione del Termometro è una cosa , in cui si ha tanto variato , che io credo utile fissarne quì la graduazione . Seguirò il Sig. de Luc , che ci ha dato la miglior opera sopra i Barometri ed i Termometri (*Recherches sur les modifications de l'atmosphère à Genève 1772* , 2 Vol. in 4) . Io chiamo con questo Fisco , Termometro di Reaumur un Termometro di Mercurio che marca 80 nell'acqua che bolle: da qualche tempo , trovandosi il Barometro a 27 pollici ; segna $29 \frac{2}{10}$ al calore del corpo umano , come sotto le ascelle restatovi un ora ; $9 \frac{6}{10}$ nella temperatura costante dei sotterranei dell' osservatorio ; o , nel ghiaccio che si scioglie , o nel ghiaccio mescolato coll' acqua ; e 17 sotto la congelazione , in una mescolanza di due parti di ghiaccio che si liquefa , ed una parte di sal marino . I Termometri di spirito di vino altra volta fatti da Reaumur , segnano 100 $\frac{4}{10}$ nell'acqua bollente ; 80 nel calore , che lo spirito di vino può sopportare senza bollire , ed a cui ritorna quando il bollimento è passato ; $32 \frac{1}{2}$ al calor naturale del corpo umano ; $10 \frac{3}{4}$ nei sotterranei dell' osservatorio ; o nell'acqua che gela ; $12 \frac{3}{10}$ sotto la congelazione nella detta mescolanza di due parti di ghiaccio , ed una di sal marino . Supponesi quì uno spirito di vino , quale lo impiegava il Reaumur ; vale a dire 3 parti di spirito di vino distillato col bagno di sabbia dopo di aver acceso la polvere , mescolate con una parte d'acqua .

E

129. Se

129. Se si divide l'intervallo fondamentale, che v'è tra il ghiaccio e l'acqua bollente, in 180 parti in vece di 80; segnando 212 al punto dell'acqua bollente, e 32 al punto del ghiaccio che si scioglie, s'avrà la divisione che Fahrenheit ha data nel 1724; ella è la più seguita in Inghilterra, e nel nord; ma si ha spesso abbandonato i principi dell'autore, come in Francia quelli di Reaumur. Io non parlo qui se non dei Termometri di Mercurio; lo spirito di vino ha un andamento troppo disuguale. Supponendo dei Termometri di Mercurio, e di spirito di vino, che sieno d'accordo al ghiaccio, e all'acqua bollente; lo spirito di vino rettificato, capace di bruggiar la polvere, si trova a $25 \frac{1}{2}$ quando il Termometro di Mercurio segna 30.

130. Tra le cagioni del calore, e del freddo, bisogna principalmente contare la qualità del suolo, e l'altezza del livello dove si abita. Sulle coste d'Africa si prova più caldo, che per tutto altrove; perchè le sabbie s'inflammanno più facilmente che i boschi, le acque, e le montagne; e perchè i luoghi son bassi a livello del mare. Il Canada è più freddo della Francia, benchè a pari latitudine; perchè il paese è più coperto di boschi, men coltivato, men popolato, men disseccato. Quito, benchè posta in mezzo la zona torrida vi gode di una perpetua primavera, benchè questa città sia elevata sopra il livello del mare più di 1400 pertiche; non v'è là quel calore che produce una forte riflessione di raggi sopra tutti gli oggetti d'intorno, calore, ch'è sempre più vivo di quello dei raggi diretti: egli fa perciò più caldo dopo il solstizio d'estate, perchè la concentrazione del calore si accresce in tutti i corpi.

131. La lontananza, o vicinanza del sole influiscono meno sul calore: il sole è meno lontano dalla terra in Dicembre, che in Giugno: la differenza è di 370 diametri della terra, che vuol dire più di un milione di leghe; e ciò non toglie che il più forte dell'inverno appresso noi non sia quando il sole è vicino; ma la principal cagione del calore di estate è il tempo che resta il sole sull'orizzonte, e la direzione dei suoi raggi, che s'accosta più alla perpendicolare nel nostro orizzonte a mezzodì, traversando insieme una minor quantità d'aria.

132. I climi sono le parti della terra, in cui differisce la lunghezza del giorno. Se n'è distinto 24 per mezze ore crescenti, e 6 per mesi. Era un poco differente la maniera di contar i climi degli antichi. Secondo il Sacrobosco il primo clima era lo spazio compreso tra il parallelo di 48 ore e tre quarti, e quello di $13^h \frac{1}{4}$. Il mezzo del secondo era a $13^h \frac{1}{2}$; il mezzo del terzo clima a 14^h , come in Alessandria d'Egitto; il quarto a $14^h \frac{1}{2}$, come a Rodi e Babilonia; il quinto a 15^h , e passa per Roma; il sesto $15^h \frac{1}{2}$, e passa per Venezia e Milano; il settimo 16^h passa per Parigi ec. (Clavius in Sphaeram pag. 288.)

133. Gli antichi non contavano infatti che 7 climi, comandone i mez-

mezzi tra le 13 e le 16 ore, e il mezzo del settimo si trova a 48°. 40' di latitudine: non s'estendevano molto le loro cognizioni geografiche, e conoscevano poche terre a ulteriori latitudini.

134. Si troverebbe lo stesso nei 6 climi di mese, cioè i paesi nei quali il giorno più lungo è di un mese, di due, di tre ec.

Si troverebbe che il primo clima di mese finisce a $67^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine, perchè il giorno vi dura un mese, e così di seguito fino al polo, che termina il sesto ed ultimo clima di mese; il giorno essendo ivi di 6 mesi. Ma gli astronomi non fanno uso di queste denominazioni di climi.

Delle zone terrestri.

135. Ciò, che si è detto delle latitudini terrestri, e delle posizioni della sfera (41. 106) conduce alla divisione fatta dai Geografi della superficie della terra in cinque zone, o fasce circolari, che sono, la zona torrida, le due zone temperate, e le due zone glaciali.

136. La zona torrida KMLLK (Fig. 3) è quella che s'estende a $23^{\circ} \frac{1}{2}$ da una parte e dall'altra dell'equatore: comprende tutti i paesi tra due tropici, in cui si può aver il sole nel zenit.

137. Le zone temperate ABLK, MLTS s'estendono 43° di là da ciascun tropico, l'una al nord del tropico di cancro, l'altra al mezzodì del tropico di Capricorno: comprendono i paesi, che non anno mai il sole nel zenit, e loro non manca in alcun giorno d'inverno. I paesi situati a $66^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine boreale, anno l'equatore elevato solamente

$23^{\circ} \frac{1}{2}$ (34); perciò quando il sole si trova nel solstizio d'inverno $23^{\circ} \frac{1}{2}$ sotto l'equatore, cessa d'alzarsi sopra l'orizzonte, e appena lo tocca nel punto di mezzodì.

138. Di là da $66^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine, arriva un tempo in cui non si vede il sole per tutto il giorno intorno il solstizio d'inverno, ma si vede per 24 ore nel solstizio d'estate. Omero sembra indicar questo giorno continuo all'occasione dei Lestrigoni (Odyss. K. ver. 1-82) e se ne parlerà più a lungo, spiegando gli usi del globo artificiale (221). Qui comincia la zona glaciale o frigida, che s'estende fino al polo. La zona glaciale artica è abitata, poichè la Lapponia, e la Siberia ne fanno parte; il resto è un vasto mare, che s'estende fino al polo. La zona glaciale del mezzodì è assolutamente incognita; attualmente si cerca di scoprirne qualche parte.

139. La superficie, o estensione di terra e di mare, compresa in ciascuna zona glaciale, è 6 volte minore che quella di ciascuna zona temperata: ed ogni zona temperata fa due terzi della torrida. La superficie totale della terra essendo supposta di 23 parti, il contingente delle zone glaciali, temperate, e torrida è come 1, 6, 9, o sia 2 per le glaciali, 12

per le temperate, 9 per la torrida; e ciascuna unità equivale a 1.124,372 leghe quadrate.

140. Il *cercchio polare* (102) è un cerchio minore della sfera terrestre AB (Fig. 3) parallelo all'equatore, che passa a $66\frac{1}{2}$ di latitudine boreale, e di cui la circonferenza comprende tutto lo spazio APB, che si è detto la zona glaciale: vi sono due cerchi polari AB, ST, come due zone glaciali, uno verso il polo artico, l'altro verso il polo antartico (102).

141. Si trova in Virgilio, e in Ovidio la descrizione esatta delle cinque zone enunciate:

*Quinque tenent caelum zonae; quarum una cornu
Semper sole rubens, & torrida semper ab igne;
Quam circum extrema, dextra laevaque, trabuntur
Cerulea glacie concretae atque imbribus atris;
Has inter mediamque, duae mortalibus aegris
Munere concessae divum, & via secunda per ambas
Obliquus quae se signorum verteret ordo. Geor. I. 233.*

*Utrique duae, dextra caelum, totidemque sinistra
Parte, secant zonae, quinta est ardentior illis;
Sic onus inclusum numero distinxit eodem
Cura Dei, totidemque plagae tellure premuntur;
Quarum quae media est, non est habitabilis aestu;
Nix tegit alta duas; totidem inter utramque locavit,
Temperiemque dedit, mixta cum frigore flamma. Met. I. 45.*

142. Lucano osserva con ragione, che nella zona temperata boreale si ha sempre l'ombra a destra, o sia verso il nord, guardando ponente; mentre nella zona torrida si ha talora l'ombra verso mezzodì, o a sinistra:

*Ignotum vobis, Arabes, venistis in orbem,
Umbras mirati nemorum non ire sinistras. Pharf. III. 247.*

143. Dice ancora, che a Siene città d'Egitto sotto il tropico, l'ombra a mezzodì del solstizio spariva, e non s'estendeva nè a dritta nè a sinistra: *umbras nusquam stentente Syene. I. 587.*

144. La situazione dell'ombra a mezzodì è stata il soggetto d'una suddivisione geografica degli abitanti della terra, in *heterosej* (ombra alterutra), *perisej* (circum umbra), *anipsej* (ambi ombra) o *alcej* (privi d'ombra). Gli *heterosej* sono quelli, dei quali l'ombra meridiana, sono sempre voltate dalla parte di uno stesso polo, come gli abitanti delle zone temperate: nelle nostre regioni l'ombra d'un corpo verticalmente eretto nell'ora

ora del mezzodì si dirige sempre verso il nord, perchè è sempre opposta al sole, che è dalla parte di sud.

145. Li *periscij* sono quelli, di cui l'ombra girano in 24 ore verso tutti i punti dell'orizzonte: sono gli abitanti delle zone fredde, per li quali il sole non tramonta per un certo tempo dell'anno (138), ma girando tutto attorno l'orizzonte fa girare ancora l'ombra de' corpi.

146. Gli *ansicij* sono quelli; dei quali l'ombra meridiane ora sono al nord, ora al sud; e tali sono gli abitanti della zona torrida: Ma affinchè una definizione comprendesse anche quelli che abitano sotto i tropici, Varenio nella sua Geografia generale sostituisce la parola di *ascij*, che vuol dire che restano privi d'ombra qualche giorno dell'anno avendo il sole nel zenit. Dividonsi gli *ascij* in due classi *ascij ansicij*, per li quali l'ombra varia di quà, di là, nel mezzodì, e due volte l'anno sparisce: *ascij heteroscij* gli abitanti sotto il tropico, che anno sempre l'ombra; da una parte, ed un sol giorno ne sono senza.

Degli Antipodi.

147. Due paesi dalla terra distanti diametralmente l'uno dall'altro (posta la terra rotonda) cioè collocati dai due estremi di una linea retta che passasse per il centro della terra, sono *antipodi* l'uno dell'altro: così la città di Lima nel Perù è presso poco antipode di quella di Siam nell'India, come risulta dalle longitudini e latitudini osservate in esse: Buenos-aires in America è parimente antipode di Pekin, capitale della China: Parigi ed il resto dell'Europa, anno i loro antipodi nel mar del Sud verso la nuova Zelanda; questa è una delle terre australi, che appena si conosceva avanti il viaggio intorno il mondo del Sig. Bougainville, e quello dei SS. Bancks, Solander, e Cooke fatto nel 1769.

148. Già più di 2 mille anni che si conosce la rotondità della terra, i dotti non anno dubitato, che non vi fossero antipodi; non se ne dubitò che in tempi di una stupida ignoranza, quando ogni lume di matematica era estinto sulla terra. Keplero dice, che un Vescovo nominato Virgilio fu deposto per aver parlato troppo affermativamente degli antipodi; ma il Ricciolo sostiene che questo non è esatto (vedete *Bavonio* an. 744 *Riccioli* *Almag.* 11. 490).

149. Gli antipodi anno il piano medesimo per orizzonte; ma l'uno vede la faccia superiore del piano, l'altro la inferiore. Un astro leva per l'uno, quando tramonta per l'altro; il giorno più lungo dell'anno per il primo è il più breve per il secondo; l'uno ha l'inverno quando l'altro ha l'estate; la primavera concorre parimente coll'autunno, e il mezzodì colla mezza notte, la mattina colla sera, il giorno colla notte, il polo elevato per l'uno è abbassato per l'altro; le stelle che l'uno sempre vede, non appaiono mai all'altro; quelle che s'innalzano pochissimo da una parte, s'abbassano pochissimo dall'altra; se tutti due voltano la faccia all'equatore, l'uno vede gli astri levarsi a sinistra, l'altro a destra.

150. I popoli, che senza esser diametralmente opposti, sono non per
tan-

tanto l'uno al mezzodì, l'altro al nord dell'equatore sotto il medesimo semicerchio del meridiano, a latitudini uguali, chiamansi *anteci*. Anno il mezzodì, e l'altre ore, nel medesimo istante, l'uno, e l'altro; ma l'inverno degli uni regna nell'istesso tempo che l'estate per gli altri, e la primavera dei primi coll'autunno dei secondi; i giorni degli uni sono uguali alle notti degli altri; quando i giorni crescono per questi, calano per quelli; il polo elevato per li primi è abbassato del pari per li secondi; le stelle sempre vedute dai primi non si vedono mai dai secondi; e quando guardano il sole a mezzodì, anno la faccia rivolta uno contro l'altro, quando il sole non fosse più lontano, che essi, dall'equatore.

111. Quelli che sono sul medesimo parallelo, ma in punti opposti, si chiamano *periej*. L'uno conta mezzodì quando l'altro ha mezza notte; ma essendo da un'istessa parte dell'equatore anno le medesime stagioni e i medesimi tempi; vedono le stesse stelle restar perpetuamente sopra l'orizzonte; gli astri levano nel medesimo punto e alla stessa distanza dal meridiano restando un uguale spazio di tempo sopra l'orizzonte. Nel dì dell'equinozio il sole leva per l'uno nel momento che tramonta per l'altro. Ma se il sole è dalla parte del polo elevato, cioè nella primavera e nell'estate, leva per l'uno avanti di tramontar per l'altro, in modo che v'è un intervallo di tempo, dentro cui li due periej vedono insieme il sole; all'opposto, nell'autunno e nell'inverno, v'è una parte di notte comune a tutti due, cioè un tempo, in cui nè l'un nè l'altro vede il sole. Gli antipodi di un luogo sono periej de' suoi anteci, e sono anteci de' suoi periej. I periej di Parigi sono al sud-est di Kamtschka, estremità orientale dell'Asia, e gli anteci nelle terre australi al mezzodì del capo di Buona Speranza, luoghi finora incogniti.

112. Vi saranno delle persone, che avranno forse pena a figurarsi, come gli uomini possano abitare paesi antipodi, coi piedi degli uni contro degli altri: sembra a prima vista che gli uni, o gli altri debbano aver la testa al basso, in sito rovescio, contro lo stato naturale. Per rettificare queste idee basta considerare, perchè noi siamo in piedi sulla superficie del globo coi piedi in terra, e la testa alzata verso il cielo; perchè si piglia questa situazione, se mai per qualche moto esterno se ne andasse supri. V'è una forza, per cui tutti i corpi discendono verso la terra, chiamasi questa *gravità*, *gravitazione*, o *attrazione*, e comunque sia incognita la sua causa, ella è manifesta in tutti i punti del nostro globo: da per tutto i corpi gravi tendono verso il centro della terra con isforzo costante ed inalterabile: da per tutto si dice, che ciò che cade verso la terra discende, ed ascende ciò che se ne allontana. Così il corpo A (Fig. 14) attirato verso il centro C del globo terrestre, secondo la linea ABC, ed il corpo E, attirato in senso contrario secondo la linea EDC verso il medesimo centro C, cadono e discendono egualmente verso la terra; perchè il loro nido naturale è di avvicinarsi al centro C. Un abitante posto in B vedrà cader la pioggia da A in B, ed il suo antipode in D vedrà venir la pioggia sulla terra da E in D. Sono in vero queste direzioni differenti, ma egualmente naturali, perchè il centro C della terra è il

è il termine comune, il punto di riunione, e di tendenza, della pioggia, e di tutti gli altri corpi gravi.

153. Ho sentito dei principianti dimandare, perchè, se il corpo A discende da A in B, l'altro non discende parimenti da D in E, ed in F: non s'erano ancora avvezzi ad osservare, che il corpo A non discende verso B, se non perchè è sforzato d'avvicinarsi alla terra, quando il corpo E non ha niente dalla parte di F, che possa determinarlo a muoversi, niuna forza, niuna legge, niun oggetto, niuna cagione di moto: non ha rapporto, se non colla terra, con essa ha la sua propensione naturale, essa è cagione e termine del suo moto: andando da E verso D obbedisce a questa cagione; si muove nello stesso modo, segue la stessa legge, che il corpo A discendendo verso B: però si può dire, che due corpi egualmente cadono, e discendono benchè vadano in senso opposto; *sedere* è avvicinarsi alla terra. Si tratterà a lungo di questa legge generale della *gravitazione* nel lib. XII. art. 98o.

154. Alcuni pare dimandano, come sono sospese le stelle, perchè il sole non cade sopra di noi, come i corpi terrestri, e cosa è che tiene la terra nel suo luogo? Per prevenir questa difficoltà importa molto d'avvezzarvi per tempo a quest'idea del tutto fisica, e semplicissima; che i corpi non cambiano luogo senza una causa motrice: le stelle non sono sospese, e non anno bisogno d'esservi tenute, perchè niente le disturba; basta che sieno in un luogo per restarvi sempre; un sostegno occorre; dove v'è disposizione a cadere, e le stelle non anno alcuna tendenza verso la terra, perchè ne sono troppo lontane.

Tirar una linea meridiana.

155. La definizione del meridiano, e dei paralleli (19. 27.) fa vedere, che il meridiano taglia in due parti uguali e simili gli archi diurni dei paralleli all'equatore. Il sole, sorto sull'orizzonte, s'innalza per gradi, descrivendo sensibilmente un parallelo all'equatore, arriva nel mezzodì al più alto punto del suo corso, e poscia discende verso ponente colla medesima velocità, per gli stessi gradi, e nell'istesso tempo che ha impiegato ad alzarvi fino al meridiano. Perciò il meridiano divide la durata dell'apparizione del sole in due parti uguali, ed insieme marca la maggior altezza del sole.

156. Quindi seguono due maniere di conoscere la direzione del meridiano, e di saper il momento, in cui vi arriva il sole, o sia l'ora del mezzodì: la prima consiste in esaminare il momento, in cui il sole è più elevato, e cessa di ascendere, in cui le ombre dei corpi che illuminano, sono le più brevi; allora l'ombra d'un filo eretto verticalmente, o d'un filo a piombo, indicherà la direzione del meridiano, e segnerà ciò che si chiama la *linea meridiana*, cioè la sezione dei piani dell'orizzonte e del meridiano. Questo metodo sarebbe esatto, se si potesse riconoscere con assai di precisione il momento della maggior altezza; ma intorno al mezzodì, e quando l'altezza s'accosta al suo *maximum*, cioè alla

alla sua maggior quantità, il progresso è così lento, che vi vorrebbe un'estrema precisione per ottenere qualche esattezza nell'osservazione (è però questa l'ordinaria maniera che si pratica in mare): bisogna dunque ricorrere ad un altro mezzo per disegnare una meridiana; questo è il secondo metodo, che vado a spiegare.

157. Questo metodo consiste nell'osservare l'ombra del sole che leva, e l'ombra del sole che tramonta; queste due ombre sono egualmente lontane dal meridiano; perciò il mezzo di queste due ombre deve dare quella del mezzodì. Sia il cerchio $SMCBDA$ (Fig. 15) che rappresenti la circonferenza dell'orizzonte, S il sole che leva, C il sole che tramonta, P il piede d'uno stilo perpendicolare all'orizzonte, PB l'ombra dello stilo quando il sole leva, PA l'ombra quando tramonta. Se dividasi l'angolo SPC , o l'arco SC , in due parti uguali nel punto M , la linea MPD sarà la linea meridiana; poichè il sole levando in S , e tramontando in C , si trova necessariamente in distanze uguali dal meridiano, che perciò passa per M . Questo metodo non può praticarsi senza un orizzonte affatto scoperto, nè io l'indico qui, se non per meglio esprimere l'oggetto che si propone, e l'idea sulla quale è fondato il metodo generale di tracciare una meridiana: quindi nascerà un terzo metodo più comodo.

158. Questo metodo, che è forza d'impiegare, ai due punti dell'orizzonte di cui s'è parlato, sostituisce due altri punti, che sieno egualmente elevati: l'uno avanti mezzodì, l'altro dopo: se in vece di segnar l'ombra del sole quando è nell'istesso orizzonte in S od in C , si segna una mezz'ora dopo il levare, e poi una mezz'ora avanti il tramontare, si avranno due altre ombre PF e PG , più vicine al meridiano, e più brevi, ma sempre a distanze uguali dal meridiano; e per aver la meridiana PHD basterà prendere il mezzo H delle due ombre.

159. Perciò si può in generale descriver dal centro P qualunque arco come FG ; osservare il momento in cui l'ombra della mattina farà in F , e quella della sera in G , colla punta nel medesimo arco (poichè allora sarà certo che l'altezza del sole, è stata la medesima in ambedue gli stati, e per conseguenza le sue distanze dal meridiano perfettamente uguali); dovendo esser le due ombre all'istessa distanza dal meridiano, si dividerà l'intervallo, o l'arco FG , in due parti uguali; e parimenti si troverà un punto H per cui deve passar la meridiana PHD , tirata per il piede dello stilo P . Per maggior precisione si può descrivere molti cerchi concentrici, di cui ciascuno in particolare darà un punto della meridiana, e tutti questi punti presi insieme determineranno ancora più esattamente la linea intera che si cerca. Questo metodo è soggetto ad alcuni secondi d'errore fuori dei solstizj, perchè il sole non resta esattamente per tutta la giornata nell'istesso parallelo. Si avrà riguardo a questa piccola disuguaglianza nel libro seguente (326); ciò è inutile per l'uso ordinario.

160. Finalmente in vece dello stilo, che io suppongo eretto in P , si può adoprare un istrumento assai semplice e comodo: questo è una placca P

ca P (Fig. 16) d' incirca tre pollici , traforata d' un piccolo buco di spilla , che lascia passare un raggio solare posta sopra un piede di 7 in 8 pollici AB, e il raggio cade sopra la base del piede BD , o sopra un'altra tavola di livello . Dal punto C (che corrisponde perpendicolarmente sotto il buco T , e che viene disegnato da un piombino TC) si descrivono molti cerchi concentrici : sopra ognun di questi cerchi si marcherà il punto luminoso del mattino K , e quello della sera L ; il mezzo H dell' intervallo darà la meridiana CH.

161. Se la placa P sia ricoperta d' un gran cartone , il punto luminoso diventerà più sensibile e più vivo : ciò che fa uno dei vantaggi di questo piccolo istromento; in oltre v' è il vantaggio di poter metter a livello la tavola stessa , per mezzo dell' istromento sospendendo in P un piombino, la cui punta dovrà esattamente cadere in C, se l'istromento è ben fatto, e la tavola posta a livello; così l'istromento serve di verifica- zione. Si può anche, mancando di piombo e di livello, versar dell'acqua sul piano, che sarà veder da qual parte inclini; ed allora si potrà drizzare con piccoli cunei di legno fino a tanto che si veda, che l'acqua sta ferma, e non scorre più. Nel proseguimento di quest' Opera si vedrà (322) che l'istesso principio di cui s' è parlato, produce anche il metodo dell' *altezze corrispondenti*, impiegato da tutti gli astronomi, per aver il momento del mezzodì colla più scrupolosa esattezza.

162. La linea meridiana è il primo fondamento d' un osservatorio; per lo più l'osservazioni suppongono una eccellente meridiana; perchè tutte le teorie astronomiche sono fondate sopra le altezze prese nel meridiano; e su i passaggi degli astri per il meridiano. Perciò è detto, che gli astronomi guardano il mezzodì, come i Geografi il nord, i Sacerdoti l'orientale, i Poeti l'occidente:

*Ad boream terræ, sed cæli mensur ad austrum;
Præco dei exortum videt, occasumque poeta.*

163. Si può segnare una meridiana col mezzo della stella polare, quanto col metodo precedente, forse anche con maggior esattezza. La stella polare non essendo lontana dal polo che intorno due gradi, in qualunque tempo si osservi disegna presso poco la parte di tramontana; ma sciegliendosi presso poco il tempo, in cui ella si trova nel meridiano, se anche vi fosse un errore di molti minuti, si avrà per essa la direzione del meridiano con gran precisione, basterà innalzare due fili a piombo, per li quali si possa mirare la stella.

164. Per scieglier il tempo, in cui la stella polare si trova esattamente nel meridiano, si può calcolare l'ora, ed il minuto del passaggio, col metodo che sarà spiegato dopo (363); ma v' è una maniera comoda per trovar senza calcolo il tempo, in cui la stella polare passa per il meridiano. Basta osservare il tempo in cui sia nel verticale della stella dell' orsa maggiore; e questa è la prima delle tre stelle della coda, la più vicina del quadrato del carro (Fig. 2). Si sa, che questa stella è oppo-

F

fa

sta alla stella polare, in modo che passano per il meridiano insieme, l'una sopra del polo, l'altra di sotto; perciò quando l'una è sotto l'altra, nell'istesso verticale, nell'istesso filo a piombo, è certo che sono ambedue nel meridiano: se in questo momento si tira la linea dei due fili, o regole verticali, verso la direzione di queste due stelle, si avrà la linea meridiana.

165. Si può impiegare in vece di due fili a piombo, tre o quattro micie debolmente accese, di cui due sieno poste prima in uno stesso verticale per mezzo d'un piombino; la terza, o la più vicina all'occhio sarà mobile, e potrà drizzarsi coll'altre verso la stella polare. Si potrebbe servirsi anche d'una tavola traforata in due luoghi per vedere insieme le due stelle, adoprando un'altra tavola più presso l'occhio, per porla nella direzione delle stelle, e del verticale; un muro che fosse a piombo servirebbe egualmente, ma di rado se ne trova. Meglio di tutto è servirsi di un *triangolo filare*, quale adoprava il P. Riccioli, eretto sopra di un travicello bene squadrato, e la cui punta sporga in avanti, per poter quadrare per di sotto la stella dell'orsa maggiore, che in estate passa assai alta: l'orlo del travicello darà la direzione della meridiana; cioè servirà a segnalarla fermato che sia nell'indicato momento.

166. Questa operazione può farsi nel crepuscolo nei mesi di Maggio e di Giugno, con uno dei detti modi, a segno di non ingannar di un minuto sul tempo in cui le stelle passano per lo stesso verticale; ed un minuto di errore non farebbe 4 secondi di tempo sul momento del mezzodì, che si osservasse in seguito col mezzo di tale meridiana.

167. Per parlare con più di precisione, devo avvertire, che queste due stelle passavano esattamente insieme per il meridiano nel mese di Luglio 1751; ma la stella ϵ dell'orsa maggiore, ogni dieci anni avanza l'altra di $13^{\circ} \frac{1}{2}$; nel mese di Giugno 1773. passò $2^{\circ} 42'$ prima che la stella polare. Se dunque si aspirasse in questa operazione ad un'estrema esattezza, bisognerebbe assicurarsi prima, per il mezzo di due linee verticali, del momento in cui le due stelle sono passate per il verticale medesimo; aspettar poi $2^{\circ} 42'$ (e più col tempo a proporzione), dirigerà allora la linea dei due fili a piombo alla sola stella polare, senza riguardando all'altra che già sarà passata oltre il meridiano ed il verticale; ma questa piccola differenza è insensibile nella pratica.

Del globo celeste artificiale, e de' suoi usi.

168. Un globo destinato a rappresentare le costellazioni, i moti planetarj, l'eclittica, l'equatore, i cerchi di latitudine, i cerchi di declinazione, il meridiano e l'orizzonte, chiamasi *globo celeste*. Quello rappresentato (Fig. 12) è circondato, come la sfera, da un orizzonte HO, e da un meridiano PZR, e gira sull'asse PR. Vi si segnano le stelle per mezzo delle ascensioni rette, e declinazioni loro osservate (90° , 91°) nella notte nel tempo che passano per il meridiano, secondo che anno-

la medesima altezza dall' equatore , o passano un grado , due ec. più alte , o più basse . Si traccia in seguito sopra questo globo un altro cerchio nei due punti equinoziali , rimarcati tra le stelle (67) , e che s' allontana da una parte e dall' altra $23^{\circ} \frac{1}{2}$, che sarà l' ecclittica (64) ; i due punti dell' ecclittica più lontani dall' equatore , sono i *soltizj* , o i *punti solstiziali* (68) . I due coluri (102) devono segnarsi sul globo da un polo all' altro ; uno per gli equinozj , l' altro per li solstizj , come nella sfera . Tutti i cerchi che passano per li poli del mondo , e tagliano ad angoli retti l' equatore , chiamansi , come s' è detto , cerchi di declinazione ; tali sono anche i coluri , i meridiani , i cerchi orari (92) .

169. Sul globo si può osservare l' *ascensione obliqua* di un astro : e la distanza del punto equinoziale dal punto dell' equatore che leva coll' astro . Sia HEZPO (Fig. 20) il meridiano , P il polo del mondo , HO l' orizzonte , EC l' equatore , S un astro che leva nell' orizzonte . Il punto B dell' equatore è quello che marca l' ascension retta dell' astro S ; ma il punto dell' equatore che marcherà l' ascensione obliqua della stessa stella , sarà C , perchè il punto C è quello che leva colla stella : BC è la differenza tra l' ascensione retta , e l' ascensione obliqua ; gli antichi astronomi la chiamavano *differenza ascensionale* , ma attualmente non s' e ne fa quasi più uso .

170. I Problemi , che si possono frangiere col mezzo d' un globo , o d' i divertimento ; per trovarli esat-
tamente , ben tornito , e ancora fareb-
bono ; ma studiando la prima volta i
arsi sul globo , e sulla sfera armil-
e riferirli senza pena agli oggetti
globo , o della sfera , perchè non
è aperta e vuota , mentre il glo-
ella sua superficie le differenti co-
20 terrestre (214) .

Dopo il 1810.

Volendo prendere le mae-

l'ora della stella polare,

conviene attendere 8' 30"

d' tempo, dopo di che l' a-

traversata continuate alla pri-

ma della volta della gior-

Oriz.

Parigi , di cui la latitudine è di
Aprile l' ora del levare e del tra-
il meridiano dentro i suoi incastri
ra l' orizzonte , il che si ha dai

risponde al giorno dato : questi gradi sono marcati per ordinario o sul Zo-
diaco , o anche nell' orizzonte , coi giorni corrispondenti , e coll' ingresso
del sole in ciaschedun segno (79) . Nel caso proposto si trova che ai
29 Aprile corrisponde il primo grado del toro : 3°. Il grado ritrovato dell'
ecclittica dove è il sole , girando il globo , si mette nel meridiano ; e si
met-



la medesima altezza dall' equatore , o passano un grado , due ec. più alte , o più basse . Si traccia in seguito sopra questo globo un altro cerchio nei due punti equinoziali , rimarcati tra le stelle (67) , e che s' allontana da una parte e dall'altra $23^{\circ} \frac{1}{2}$, che sarà l' ecclittica (64) ; i due punti dell' ecclittica più lontani dall' equatore , sono i *soltizj* , o i *punti solstiziali* (68) . I due coluri (101) devono segnarsi sul globo da un polo all' altro ; uno per gli equinozj , l' altro per li solstizj , come nella sfera . Tutti i cerchi che passano per li poli del mondo , e tagliano ad angoli retti l' equatore , chiamansi , come s' è detto , cerchi di declinazione ; tali sono anche i coluri , i meridiani , i cerchi orari (91) .

169. Sul globo si può osservare l' *ascensione obliqua* di un astro : e la distanza del punto equinoziale dal punto dell' equatore che leva coll' astro . Sia HEZPO (Fig. 20) il meridiano , P il polo del mondo , HO l' orizzonte , EC l' equatore , S un astro che leva nell' orizzonte . Il punto B dell' equatore è quello che marca l' ascension retta dell' astro S ; ma il punto dell' equatore che marcherà l' ascensione obliqua della stessa stella , sarà C , perchè il punto C è quello che leva colla stella : BC è la differenza tra l' ascensione retta , e l' ascensione obliqua ; gli antichi astronomi la chiamavano *differenza ascensionale* , ma attualmente non s' ne fa quasi più uso .

170. I Problemi , che si possono sciogliere col mezzo d' un globo , o d' una sfera , non sono semplici esercizi di divertimento ; per trovarvi esattezza vi vorrebbe in vero un globo grande , ben tornito , e ancora sarebbe da preferir il calcolo trigonometrico ; ma studiando la prima volta i principj d' astronomia , è utile d' esercitarsi sul globo , e sulla sfera armillare , per ben comprenderne i moti , e riferirli senza pena agli oggetti celesti . Ho detto che si può valersi del globo , o della sfera , perchè non v' è altra differenza se non che la sfera è aperta e vuota , mentre il globo è pieno e coperto , per descriver nella sua superficie le differenti costellazioni . Si parlerà ben tosto del globo terrestre (214) .

171. Problema. *Conoscendo la latitudine d' un paese della terra , e il luogo del sole per ciascun giorno dell' anno , trovar l' ora del levar e del tramontare del sole .*

Supponiamo , che il luogo dato sia Parigi , di cui la latitudine è di 49° , e che si voglia sapere per li 20 Aprile l' ora del levar e del tramontare del sole . 1°. Bisogna muover il meridiano dentro i suoi incastri tanto , che il polo sia innalzato 49° sopra l' orizzonte , il che si ha dai numeri segnati nel meridiano . 2°. Bisogna cercare qual grado d' ecclittica risponde al giorno dato : questi gradi sono marcati per ordinario o sul Zodiaco , o anche nell' orizzonte , col giornal corrispondenti , e coll' ingresso del sole in ciaschedun segno (79) . Nel caso proposto si trova che ai 20 Aprile corrisponde il primo grado del toro . 3°. Il grado ritrovato dell' ecclittica dove è il sole , girando il globo , si mette nel meridiano ; e si

mette parimente sul mezzodì, o sull' ora 12, il raggio della rosetta P, sia nella sfera, sia nel globo (Fig. 11 e 12); (questo raggio si muove con un poco di stento, perchè debba girare col moto del globo): La ragione è, che si deve contar mezzodì per il dato luogo, quando il grado d'ecclittica, in cui si trova il sole, è nel meridiano. 4°. Si gira la sfera dalla parte d'oriente fin che il grado del giorno dato, qui il primo grado del toro, sia nell'orizzonte; si vedrà l'ago sulle 5 ore della rosetta, che vuol dire il sole si leva a 5 ore della mattina (contando all'oltramontana); girando parimente la sfera verso ponente, fin che il detto grado del sole sia nell'orizzonte, si vedrà l'ago che gira coll'asse, sulle 7 ore, e sarà capire che il sole tramonta a 7 ore. Questa operazione fa vedere che quel giorno dura 14 ore. Si spiegherà la maniera di calcolare rigorosamente il levare e il tramontare degli astri (367). La ragione è, che il giorno si divide in 24 ore; e poichè il moto diurno si fa uniformemente ogni giorno intorno l'asse e i poli del mondo, l'ago della rosetta facendo il medesimo moto, con un giro rappresenta le 24 ore, 6 ore in un quarto di giro, ec. e in conseguenza essendo poste le cose nel sito conveniente, si avranno sempre le ore ricercate, indicate dall'indice sulla rosetta.

172. Per un' operazione inversa, conoscendo l'ora del tramontar del sole in un dato giorno, si troverà la latitudine di quel paese. Avendo marcato il luogo del sole nell'ecclittica, e condottolo al meridiano, posto pure l'indice sul mezzodì della rosetta, si giri il globo fin che l'indice arrivi alla data ora: s'alzi o s'abbassi il polo finchè il punto segnato dell'ecclittica tocca l'orizzonte; sarà quella la latitudine del luogo. Così si dirà che la latitudine di Babilonia era a 36° di latitudine, sapendosi da Tolomeo, che il sole verso il tempo del solstizio d'inverno, avendo 9 segni di longitudine, tramontava a 4^h 48'.

173. *Trovare, quali sono i due giorni dell'anno, nei quali il sole leva in un dato luogo all'ora marcata.*

Supponiamo, che si dimandi i giorni nei quali il sole a Parigi: leva a 5^h. Si porrà il polo all'altezza di 49°, ch'è quella di Parigi; si condurrà sotto il meridiano uno dei coluri, e si porrà l'indice polare sul mezzodì. Si girerà il globo finchè l'indice segni 5 ore, e si marcherà il punto in cui il coluro taglia l'orizzonte: E' chiaro, che se il sole fosse in quel punto, o in pari declinazione, leverebbe a 5 ore. Dunque bisogna sapere in quai giorni dell'anno abbia tale declinazione. Si condurrà sotto il meridiano il punto del coluro, ch'era nell'orizzonte, e nel meridiano stesso si vedrà che tal declinazione è di 13°; notando questo punto del meridiano, e facendo girare il globo, si vedranno due punti dell'ecclittica passare per il punto medesimo; a 13° di declinazione; e questi saranno i punti cercati, che si troveranno essere 2° di toro, e 28° di leone, ed i giorni corrispondenti (art. 79) li 21 Aprile, e li 24 Agosto.

174. Tro-

174. *Trovare i punti dell'orizzonte, nei quali leva il sole ogni giorno.*

Avendo notato nell'ecclittica la longitudine del sole per il giorno dato, elevata la sfera all'altezza del polo del luogo di cui si tratta, si condurrà all'orizzonte quel punto d'ecclittica in cui si ritrova il sole, e si osserverà quanto questo punto s'allontani dal punto d'oriente e d'occidente. Si troverà per Parigi per li 21 Giugno, che i punti dove il sole leva e tramonta sono lontani 38° dai punti di levante e ponente verso il nord; quelli, nei quali il sole leva e tramonta li 21 Dicembre, a $36^{\circ} \frac{1}{2}$ dai medesimi punti cardinali verso ostro. E però dall'occaf

estivo all'occaf iberno v'è la distanza di $74^{\circ} \frac{1}{2}$. Tal quantità cresce per li luoghi verso il nord, e scema per li paesi più meridionali; in modo che sotto l'equatore non v'è più che 47° di distanza tra i punti nei quali il sole leva nei due solstizj, quanta è quella dei tropici.

175. Questa è l'*amplitudine*: l'*amplitudine orientale* è l'arco d'orizzonte tra il punto in cui il sole o un astro leva ed il vero punto di levante: l'*amplitudine occidentale* la distanza del punto del tramontare dal vero occidente: si troverà qui dopo la maniera di calcolarla (369).

176. *Trovare l'ascension retta del sole per ogni giorno.*

Sapendo il luogo del sole nell'ecclittica per il proposto giorno (79) si conduca quel punto dell'ecclittica al meridiano; una cifra nell'equatore indicherà l'ascension retta, o la distanza del sole dall'equinozio, conata sull'equatore da occidente in oriente. Così li 20 Aprile trovandosi il sole nel primo grado del toro, cioè a 30° di longitudine, la sua ascensione retta farà d'incirca 28° .

177. *Trovare a qualunque ora l'ascensione retta del mezzo del cielo.*

Per il giorno dato si cerchi il luogo del sole nell'ecclittica; condotto questo punto al meridiano, mettasi l'indice dell'ore sul mezzodì. Si giri il globo fin che l'indice arrivi sull'ora data; in tal posizione il punto dell'ecclittica situato sotto l'equatore farà, e si chiama il *punto culminante* dell'ecclittica; quello dell'equatore che sarà parimenti nel meridiano, marcherà la così detta *ascensione retta del mezzo del cielo*, e quella di tutti gli astri che nello stesso istante faranno nel meridiano.

178. Questo metodo può servire a riconoscer le stelle nel cielo, quando descrittà una meridiana (155), un si volterà verso mezzodì, ed avrà conosciuto sul globo, quali sono le costellazioni situate allora nel meridiano, e a quali altezze sono sopra l'orizzonte.

179. *La declinazione del sole, e d'ogni astro, troverassi pure per mezzo*

zo del globo conducendo sotto il meridiano l'astro di cui si tratta; il numero dei gradi compresi tra l'astro e l'equatore, contati sulla circonferenza del meridiano, ne mostrerà la declinazione; sarà boreale, se l'astro è sopra l'equatore nei nostri paesi settentrionali; australe, se meno elevato dall'equatore.

180. Quando non si conosce che la declinazione del sole, si può trovare il luogo che occupa nell'eclittica, prendendo il quarto d'eclittica che conviene a quella stagione: per esempio se si fosse osservata l'altezza del sole a Parigi di gradi 51 li 16 Aprile, che vuol dir, 10 sopra l'equatore, che fa 10 di declinazione, facendo avanzare il primo quarto d'eclittica sotto il meridiano si vedrà, che il sole a 16° dell'ariete, ha 10° di declinazione, e questo è il luogo del sole. E così si troverebbe anche il giorno in cui fu fatta l'osservazione, se non si sapesse.

181. L'altezza del sole può far trovare ancora la latitudine del luogo, dove l'osservazione è stata fatta, pur che sappiasi la declinazione del sole in quel giorno. Suppongo che li 16 Aprile sia osservata l'altezza del sole nel meridiano di 51° ; si troverà la declinazione per tal giorno di 10° settentrionale (179); donde segue che l'altezza dell'equatore è di 41° , quella del polo di 49° (34); se la declinazione del sole fosse meridionale bisognerebbe aggiungerla all'altezza osservata, supposto sempre l'osservatore al nord dell'equatore e del sole. Fassi grand'uso di questo metodo per la geografia, e per la navigazione.

182. Se il luogo dell'osservazione fosse sotto latitudine australe, bisognerebbe far il contrario, sommare l'altezza osservata e la declinazione settentrionale, e sottrarre la declinazione australe dall'altezza.

183. Se il luogo fosse tra i tropici, ed il sole fosse più lontano dall'equatore dell'istesso osservatore, bisognerebbe prender il supplemento a 180 gradi dell'altezza osservata, avanti di sottrarne la declinazione del sole. Tali eccezioni facilmente s'intendono coll'ispezione del globo, e perciò si dispenseremo in avvenire di rilevarle.

184. Il *verticale* d'un astro è un cerchio maggiore che parte dal zenit, discende perpendicolarmente all'orizzonte, e passa per il centro dell'astro (10). Servono i verticali per marcare l'altezze; perchè l'altezza d'un astro non è se non che un arco perpendicolare, o sia del verticale, compreso tra l'astro e l'orizzonte. Serve pure a marcare l'*azimuto*, vale a dire l'arco d'orizzonte compreso tra il meridiano, ed il punto d'orizzonte a cui corrisponde l'arco perpendicolarmente: così ZDF (Fig. 10) è il verticale dell'astro D, di cui DF è l'altezza, HF l'azimuto.

185. Fa le veci di verticale un quarto di cerchio, che si aggiugne ai globi dell'istesso raggio del globo, che si applica di volta in volta al zenit, e si muove intorno l'orizzonte: si vede rappresentato in ZV (Fig. 11). Presta moltissimi usi, come si vedrà nei problemi seguenti. Quando non vi è verticale, si può supplire col compasso e colla squadra: il compasso serve a prender i gradi d'altezza, o altri; la squadra a diriger le gambe del compasso perpendicolarmente.

186. Tro-

186. *Trovare a qual ora il sole deve aver un certo grado d'azimuto un giorno dato.*

Avendo posto il polo, e l'indice dell'ore come nei problemi precedenti (171), si porrà il verticale mobile nel grado d'orizzonte corrispondente all'azimuto dato, e si condurrà il luogo del sole sotto questo verticale; l'indice marcherà l'ora, che è quando il sole ha il grado dato di azimuto. Per esempio li 13 Aprile, essendo il sole in 3° di toro, si domanda a qual ora il sole avrà 75° di azimuto: si troverà 8^a della mattina. Dalla parte di ponente a 6^a $36'$ della sera, si troverà nella parte occidentale del verticale medesimo a 75° dalla parte di nord del meridiano; ma allora si può dire che ha 105° d'azimuto verso mezzodì, supple-mento di 75° .

187. Per il mezzo dell'azimuto si può trovare l'ora, in cui un muro comincia ad essere illuminato in un dato giorno, o perde il lume, supponendo che si sappia l'angolo che fa colla meridiana che si chiama la *declinazione del piano*, o del muro, supposto verticale. Se il muro declina 75° da mezzodì a levante, bisogna trovare per il problema precedente, a qual ora il sole avrà 75° di azimuto verso levante, e a qual ora 105° verso ponente. Saranno queste le ore, nelle quali la superficie del muro comincerà e terminerà d'esser illuminata; si avrà per conseguenza la prima e l'ultima ora che potrà vederfi in un orologio solare, che declina da mezzodì a levante 75° gradi. Molti scrittori di Gnomonica prendono la declinazione, non nella linea del muro, ma nella perpendicolare all'istesso muro, cioè dello stilo: facile è la riduzione.

188. Le stelle, che sono poste nei globi celesti, vi sono marcate per mezzo dell'altezza meridiana, e dell'ascensione retta, trovata dall'ora in cui si osservarono passare per il meridiano, come si è detto (88 e 92) e si dirà più a lungo (231).

189. Facendo girare il globo celeste posto all'altezza del luogo, si vedrà quali stelle passano per il zenit, e sono quelle che anno la declinazione uguale alla latitudine geografica del luogo.

190. Si vedrà pure, quali sono le stelle che non tramontano mai in un luogo, e sono quelle che anno maggior declinazione dell'altezza del polo da quella parte; così dall'altra quelle che anno maggior declinazione dell'altezza dell'equatore non leveranno mai.

191. Il quarto di cerchio mobile ZV (Fig. 12) può anche servire a marcare il sito d'un pianeta, (o d'una cometa) quanto se ne conosca la longitudine e la latitudine. Si mette il polo dell'eclittica nel meridiano, ed ivi s'attacca il cerchio mobile, che allora rappresenta un cerchio di latitudine; facendo girare questo cerchio intorno il polo dell'eclittica fino al punto di longitudine cognita, colla latitudine pur cognita lungo i gradi del quadrante, si avrà il sito del pianeta. In simil guisa si vedrà la longitudine e la latitudine di qualunque stella.

ib

192. Tro-

192. *Trovare, qual sia l'altezza d'un astro in un istante dato.*

Si marcherà sul globo il luogo del sole nell' ecclittica per il giorno dato (171), e il luogo dell' astro, di cui si cerca l' altezza (191). Si porrà sotto il meridiano il luogo del sole, e l' indice dell' ore sul mezzodì: si girerà il globo fin che l' indice mostri l' ora data; accostando il verticale (185.) al luogo marcato dell' astro si vedrà nel verticale il grado d' altezza.

193. Perchè la rosetta dei globi è piccola, volendo maggior esattezza, sarà bene convertire le ore in gradi, a ragione di 15 per ora, notando qual grado dell' equatore si trova col sole nel meridiano, e facendo girar il globo per tanti gradi d' equatore quanti ne richiede l' ora data. Gli astronomi stessi si vagliono talora del globo quando non si tratta d' estrema precisione, per esempio per trovar un astro in pien giorno col mezzo dell' altezza; o di sapere il piccolo abbreviamento che la rifrazione ha potuto produrre sulla distanza osservata tra due astri. Si può servirsi del globo anche per cercare la posizione delle stelle in tempi rimoti, come quando nei poeti antichi si trovano dei passi difficili da intendere senza questo soccorso.

194. Coll' istesso metodo si troverà l' inverso, cioè a qual ora l' astro avrà un' altezza data, mettendo il luogo dell' astro sul grado del verticale, e riguardando l' indice, che prima deve essere stato posto sul mezzodì col sole. Si trova pure per tal mezzo il principio, ed il fine del crepuscolo (108), poichè basta trovare a qual ora il sole sia quel giorno 18° sotto l' orizzonte, avanti che levi, o dopo tramontato.

195. Si può col globo anche sapere l' ora che è al sole, e ciò in due maniere. La prima è per mezzo dell' altezza del sole cognita, o per via d' un quadrante (15) o per l' ombra d' un Gnomone (71): girando il globo all' altezza osservata nel verticale, che si suppone posto all' azimuto pure osservato del sole, l' indice marcherà l' ora. La seconda maniera consiste in osservare la sola ombra del globo (quando il meridiano sia sulla meridiana e in pien giorno): poichè mezzo il globo farà illuminato, e mezzo adombrato. Se il confine della luce e dell' ombra dell' equatore cadono nell' orizzonte, sarà mezzodì; se sono a 15 gradi lungo l' equatore, sarà un' ora, se a 30, due ore ec. se il sole sia dalla parte d' occidente; dalla parte di levante faranno 11 ore della mattina, 10 ec.

196. *Trovare l' ora della culminazione d' una stella o del suo passaggio per il meridiano.*

1°. Si marcherà sul globo il luogo del sole e della stella. 2°. si metterà il sole nel meridiano, e l' indice dell' ore, sul mezzodì. 3°. si condurrà il luogo della stella sotto il meridiano; e l' indice mostrerà l' ora che è nel momento che la stella passa per il meridiano. Questo problema è di mol-

molto ufo. Se in vece della stella conducete sotto il meridiano il punto equinoziale, avrete ciò che gli-astronomi chiamano *l'ora del passaggio dell'equinozio per il meridiano*, di cui si troverà una tavola qui dopo (233).

197. Si può ottenere una maggior efattezza in questa operazione, e nelle seguenti, servendosi, in vece dell'indice, dei gradi d'equatore compresi tra il sole e la stella.

198. *Trovare in qual giorno una stella si leva ad una certa ora.*

Avendo posto il polo all'altezza del luogo, e la stella nell'orizzonte orientale, si porrà l'indice su l'ora data verso l'oriente; se sia un'ora della mattina: quindi facendo girar il globo fin che l'indice arrivi al mezzodì, o alle XII, si vedrà qual punto dell'eclittica è nel meridiano: si saprà il giorno in cui il sole è in questo punto d'eclittica, che è quello in cui la stella leva alla data ora. Per esempio il giorno in cui Sirio leva per Parigi a 7 ore della sera, con 11 gradi di capricorno per il sole, si troverà esser il primo di Gennajo.

199. Per l'istessa ragione, sapendosi il luogo del sole per un giorno dato, si troverà a qual ora leva una stella. Posto l'indice sul mezzodì col sole, si conduca la stella all'orizzonte dalla parte di levante, l'indice marcherà l'ora che è.

200. Il levar e tramontar delle stelle, o dei pianeti, si troverebbe ancor meglio nel modo indicato, rimarcando i gradi d'equatore, che passano tra il sole e la stella. Per esempio li 13 Ottobre 1764 si vuol trovare, a qual ora Saturno deve passar per il meridiano, e a qual ora tramontare. Si marcherà sul globo il luogo del sole, che è 20° di libra, e condotto al meridiano il luogo del sole, si marcherà il luogo d'equatore, che vi è insieme. Si marcherà sul globo pure il luogo di Saturno; supposto cognito dall'osservazione, dalle tavole astronomiche, o dall'efemeridi, e sarà il 50° dopo l'equinozio d'ariete, o sia a 20° di toro, 20° $\frac{1}{2}$ al sud dell'eclittica. Si conduca questo punto al meridiano, notando il punto d'equatore, che vi corrisponde. Si trova la distanza tra i detti due punti d'equatore 150°, che sono uguali a 10^h a ragion di 15° per ora: perchè allora Saturno passa per il meridiano avanti il sole, come si può vedere facendo girare il globo all'occidente, Saturno passa per il meridiano in quel dì a 2^h della mattina, cioè 10^h avanti che vi passi il sole.

Conducendo Saturno fino all'orizzonte a levante, passano 100° d'equatore, che fanno 6^h 40'; dunque Saturno leva di tanto avanti, che vuol dire a 7^h 20' della sera precedente.

201. Questa pratica è fondata in ciò che gli archi d'equatore sono la misura naturale del tempo. Spesso in vece dell'arco si prende l'*angolo orario* (366) di cui quell'arco è misura; e in vece di un'ora si mette 15°, in vece di 2 ore, 30°, ec. Vi sono tavole in tutti i libri d'efemeridi,

ridi, o di tavole astronomiche, per convertire le ore in gradi, e i gradi in ore.

202. In tal modo per mezzo dell' ore si trovano le longitudini in mare, confrontando l'ora del vascello coll'ora cognita d'un dato porto (19). Suppongo che si abbia una di quelle *mostre marine* che in due mesi di navigazione non variano due minuti (ne ha fatto Harriſon in Inghilterra, Berthoud e le Roy in Francia, provate in mare con gran successo, e che danno la longitudine del vascello in capo a due mesi presso a un mezzo grado). Posta la mostra all' ora del porto da cui si parte, sempre si ha l'ora d'esso porto; per il sole si vede l' ora ch' è sul vascello: se la differenza è di 6 ore, si trova a 90° dal meridiano del porto presso per confronto.

203. Le stelle circompolari nella loro rivoluzione diurna si trovano sovente in un medesimo verticale; è un problema d' utile applicazione di saper l' ora, in cui devono trovarsi così una sotto l' altra, poichè osservandole si può conoscer l' ora della notte, il qual problema ha luogo anche per altre stelle lontane dal polo, come *arturo*, e la *spica della vergine*. Questa ora si conoscerà col globo avendolo disposto, come conviene all' altezza di polo, col sole, e col raggio dell' ore sul mezzodì, e poi facendolo girare finchè col quadrante mobile si trovino le due stelle in un medesimo verticale; l' indice mostrerà l' ora.

204. Per maggior esattezza si potrà prender la differenza di ascensione retta in gradi, tra il sito del sole nel meridiano, ed il punto d' equatore culminante allora che le stelle sono nel detto verticale. Così si può costruir una figura, quale si dava nell' antica *Connoissance des temps*, che serve a conoscer l' ora della notte. Vi si vedono le principali stelle circompolari, e la quantità che si ha da aggiungere per ogni stella al passaggio dell' equinozio affine d'aver l' ora che è nel momento in cui si vede la stella corrispondere perpendicolarmente sotto la stella polare: per esempio l' ultima stella dell' orsa maggiore notata « nella figura prima, trovandosi sotto la stella polare, è $1^h 33'$ che l' equinozio è passato per il meridiano (196).

205. Trovare il giorno del tramontare eliaco d' una stella, cioè, il giorno, in cui cesserà di vedersi la sera dopo il tramontar del sole.

Gli antichi avevano già osservato, che una stella della prima grandezza come Sirio, o il cane maggiore, può scoprirsi all' orizzonte, purchè il sole sia 10° in 12° gradi di sotto. Si porrà dunque la stella presso l' orizzonte occidentale, e per via del verticale si osserverà qual punto d' eclittica si trova 20° gradi sotto a perpendicolo. Cognito questo punto si troverà il giorno in cui v' era il sole (79) e questo sarà il giorno del tramontare eliaco, o della disparizione della stella, poichè il giorno dopo essendole il sole più vicino, dovrà trovarsi involta nel lume del crepuscolo, e nei raggi del sole.

206. Supponiamo che si cerchi il tramontare eliaco di Sirio sotto la
lati-

latitudine di Parigi nel 1750. Disposto il globo convenientemente, e posta la stella all'orizzonte si troverà che il grado di ecclittica, 10 gradi sotto l'orizzonte, è il grado 19 del Toro, in cui si trova il sole li 5 di maggio.

207. Nell'istesso modo si troverà il giorno del *levare eliac* facendo la stessa operazione dalla parte di levante. Una volta si facea grand'uso di questi fenomeni, e il globo solo può bastare ad intendere gli antichi autori, e certi passi difficili senza questo soccorso.

208. L'anno *civico*, o sia *canicolare* degli Egizj, cominciava dal *levare eliac* di Sirio; ma l'anno civile composto continuamente di 365 giorni non poteva accordarsi coll'anno naturale, ed ogni quattro anni il *levare eliac* di Sirio doveva arrivare un giorno più tardi nell'anno civile. Dopo un giro di 1460 anni, che Censorino chiama il *grand'anno* degli Egizj, l'anno naturale ricominciava nello stesso punto dell'anno civile. Così l'anno 1322 avanti G. C. e l'anno 138 dopo G. C. il *levare* di Sirio arrivò il primo giorno del mese *Thoth*, o sia il primo giorno dell'anno civile, che corrispondeva ai 20 di Luglio. E questo è il periodo canicolare o *Sothiaco* di 1460 anni, di cui si trovano dei vestigi negli antichi autori. Realmente in vece di 1460 anni erano 1425, ma gli antichi non avevano in questi oggetti gran precisione.

209. Quando si calcola il *levare* di Sirio per l'anno 138, in cui comincia il nuovo periodo *Sothiaco*, nel giorno in cui Sirio cominciava a vedersi la mattina trovasi la longitudine del sole di $3^{\circ} 24^{\circ}$, quale è di presente ai 16 di Luglio. Rimontando 1460 anni avanti al principio del periodo precedente trovasi questa longitudine minore di $12^{\circ} \frac{3}{4}$, il che proviene dal moto proprio delle stelle.

210. Benchè il *levare eliac* fosse il più rimarcabile tra gli antichi, distinguevano ancora altre spezie di *levare*, e di *tramontare* (*Gemini elementa*). I moderni a loro imitazione anno distinto il *levare cosmico* che si può chiamare il *levar della mattina*, e il *tramontare cosmico*, o sia *della mattina*, come pure il *levare e tramontare acronico*, che sono della sera. Il momento del *levare* del sole regola il *levare e tramontare cosmico*, quando le stelle levano, o tramontano levando il sole; e se levano o tramontano tramontando il sole, si dice *levare o tramontare acronico*. Donde segue, che il *tramontare acronico* succede 12 in 15 giorni dopo il *tramontare eliac*, almeno per le stelle vicine all'ecclittica, come il *levar cosmico* precede l'*eliaco*. Ma conviene aver riguardo alle latitudini dei luoghi, alle latitudini delle stelle, e a molte altre circostanze; sulle quali si può vedere Riccioli ed altri autori.

211. Si trovano esempi di queste sorte di *levare* nei poeti latini, nominatamente nei *Fausti* d'Ovidio. Per esempio parla del *levar eliac* della costellazione del Delfino ai 9 di Gennaio:

*Interea delphin clarum super aquora fidus
Tollitur, & patriis exeret ora vadis. I. 457.*

La costellazione del delfino si levava verso le 6 ore della mattina in quella stagione, vale a dire, assai avanti del sole per essere veduta, ed era il suo levare eliaco. All'opposto mette ai 10 di Giugno il suo levare acronico, cioè della sera, dicendo:

*Navita puppe sedens, delphina videbimus, inquit,
Humida cum pulso nox erit orta die. VI. 470.*

212. Il tramontar cosmico sembra indicato per il primo d' Aprile di mattina nel cuor dello scorpione:

*Dum loquor, elatae metuendus acumine caudae
Scorpius, in virides praecipitatur aquas. IV. 163.*

e pure al tempo di Cesare ciò per la stella *antares* col calcolo si trova al 15 Aprile. Ma in questa sorte di calcoli si trova una gran varietà negli autori latini, che prendevano le cose da diversi secoli, e da diversi paesi.

213. Per fare l'istesse operazioni su i pianeti, bisogna prendere nella *Connoissance des temps*, o in altra efemeride, la longitudine, e la latitudine del pianeta, ed averla segnata sul globo; allora si farà per il pianeta tutto ciò che s'è detto delle stelle fisse.

Del globo terrestre artificiale, e dei suoi usi.

214. Il globo terrestre artificiale è fatto per rappresentare la terra, i continenti, i mari, le città ec. Per mezzo di questo globo si risolvono diversi problemi relativi alla terra, come s'è fatto per le stelle. Facendo girare il globo si conduce qualunque luogo della terra, come Parigi, sotto il meridiano universale fisso, d'ottone, o di cartone, che circonda il globo, e in cui passano i perni dell'asse; questo meridiano allora diventa quello di Parigi, e corrisponde a tutti i paesi, che anno mezzodì, o mezza notte nell'istesso istante che Parigi; poichè anche li paesi dove il sole non tramonta si può dir mezza notte l'ora del passaggio al meridiano di sotto. Solamente nei due poli non si può distinguer nè mezzodì nè mezza notte, ma solamente i mesi, e gli anni.

215. Conoscendo l'ora, che è a Parigi, si può conoscer che ora sia in qualunque altro paese. Per esempio siano 9 ore della mattina a Parigi: metto Parigi sotto il meridiano, e l'indice a 9 ore della mattina, o sia a levante. Giro il globo fin che il luogo, per esempio Gerusalemme, sia sotto il meridiano; l'indice mostrerà l'ora di Gerusalemme $11\frac{1}{4}$. Tut-

te

te le città dell'Asia o sia a levante, contano più ore, tutte quelle a ponente, come in America, contano meno ore.

216. Per trovare la latitudine d'un luogo basta metterlo sotto il meridiano del globo; nel meridiano si vede il grado di latitudine cercato. La longitudine è notata dal punto d'equatore, che si trova insieme nel meridiano.

217. Quando si conosce la latitudine d'un luogo, per determinare le cose relative ad esso, bisogna alzare il polo alla data latitudine, per esempio $45^{\circ} \frac{1}{2}$ per Venezia, il che s'ottiene coi gradi segnati nel meridiano. Se il luogo è nell'emisferio australe, bisogna por di sopra il polo antartico.

218. Facendo girare il globo si vedono tutti i luoghi che anno la medesima latitudine, passando sotto l'istesso grado di meridiano, in cui fissando un lapis si descrive il parallelo di cui si tratta.

219. Per trovare i paesi della terra, che possono aver il sole al zenit, che sono quelli dentro i tropici, basta condurre il luogo sotto il meridiano, per vederne la latitudine; quando il sole una volta avanti il solstizio, e una volta dopo, avrà lo stesso grado di declinazione, nel mezzodì gli diventa verticale.

220. Nell'istesso modo si determinano i due giorni nei quali ciò accade.

221. Parimenti si trova il giorno dell'anno per un luogo nella zona glaciale in cui il sole comincia a non più tramontare, per esempio: se il luogo ha 72° di latitudine, quando il sole ne ha 18° di declinazione; il sole a mezza notte raderà quell'orizzonte, e ciò sarà li 11 Maggio; nè più tramonta fino al primo d'Agosto.

222. Per l'istessa ragione, quando il sole avrà 18° di declinazione australe, non leverà più, dai 13 Novembre fino al 18 Gennaio.

223. Così si ha il numero dei giorni compreso in un giorno, o in una notte di mesi, dentro le stesse zone.

224. Mettendo un lapis da una parte e dall'altra dell'equatore si segneranno i paralleli ultimi, che il sole descrive in questi confini.

225. Un maggior numero di problemi relativi alla situazione di differenti paesi della terra, alle ore, ai giorni, ai mesi, si troverà nella geografia generale di Varenio, tante volte ristampata, e nell'uso dei globi di Bion.

226. Nel piede dei globi si suol porre una bussola, per poterli orientare. Ma convien sapere l'aberrazione dell'ago, per il tempo, e luogo dato. Nel 1773 per Parigi era di 20° a ponente, e pare costante, ma innanzi ha cresciuto d'un grado ogni 6 anni. Nella *Exposition du calcul astronomique* v'è una tavola di questa declinazione per differenti paesi della terra.

227. Conoscendo la declinazione dell'ago si moverà il piede del globo fino a ciò che l'ago la mostri: allora la linea principale della bussola, o
la

la freccia, mostrerà la tramontana, ed alzato il polo alla debita altezza, farà orientato il globo.

228. Volendo saper le ore, bisogna portare il luogo del sole nell' ecclittica nel dato giorno sotto il meridiano, e l'indice al mezzodì. Girando il globo fino all' ora data, si vedrà quali stelle sono nel meridiano, e tutta la rimanente positura del cielo, per il dato paese in quell' ora.

Delle Costellazioni.

229. Il numero delle stelle, che si scoprono in una bella notte, è così grande, che si avrebbe pena a distinguerle, e a riconoscerle senza un metodo che ajuti la memoria; perciò s'è diviso il cielo in molte gran parti o *costellazioni*, come l'orsa maggiore, e i segni del Zodiaco, di cui s'è parlato. Molte cagioni contribuirono a dividere il cielo in molte costellazioni: qualche leggiera rassomiglianza ha fatto immaginare una corona, un carro, una freccia, un triangolo ec. per riconoscer le stelle su d' uopo fare una divisione metodica dei differenti tratti del cielo: s'è voluto consacrare la memoria d' illustri personaggi; finalmente s'è creduto riconoscere delle proprietà, dell' influenze, dei rapporti: furono queste tante occasioni di formar le costellazioni, e disegnarle con tali nomi.

230. I Greci aveano formato solamente 48 costellazioni di 1023 stelle cognite allora: le loro denominazioni rimontano a circa 1200 anni avanti G. C. eccetto forse i nomi dei 12 segni del Zodiaco, che sembrano aver un' origine Egiziana, e forse più antica. I moderni anno aggiunto diverse costellazioni all' antiche. I cataloghi di Flamsteed, e del Sig. de la Caille riuniti contengono quasi 5000 stelle: il Sig. de la Caille dopo d'aver formato nel 1751 il suo gran catalogo delle stelle australi, disegnò 14 nuove costellazioni, che non sono nel catalogo Britannico di Flamsteed. Tutte queste costellazioni al numero di 100 si troveranno nella tavola seguente:

Tavola-

Tavola delle cento costellazioni, solite a porsi nei globi celesti.

**Le 12 costellazioni
del Zodiaco.**

L' Ariete
Il Toro
I Gemelli
Il Granchio
Il Leone
La Vergine
La Bilancia
Lo Scorpione
Il Sagittario
Il Capricorno
L' Aquario
I Pesci.

**23 Costellazioni
Borali degli anti-
chi.**

Orsa maggiore
Orsa minore
Il Dragone
Cefeo
Cassiopea
Andromeda
Perseo
Pegaso
Il Cavalletto
Il Triangolo bo-
reale
Il Cocchiere
La chioma di Be-
renice
Il Bisolco
La Corona Borea-
le
Serpentario, Ofiu-
co
Il Serpente
Ercole
L' Aquila

Antinoo
La Freccia
La Lira
Il Cigno
Il Delfino

**15 Costellazioni
australi degli anti-
chi.**

Orione
La Balena
L' Eridano
La Lepre
Il Can maggiore
Il Can minore
L' Idra, femmina
La Coppa
Il Corvo
Il Centauro
Il Lupo
L' Altare,
Il Pesce australe,
La Nave
La Corona australe

**22 Costellazioni ag-
giunte dall' Evelio
dall' Allejo ed al-
tri.**

La Giraffa, camelo-
pardo
Il Fiume Giordano
Il Fiume Tigri
Lo scettro, e fiordi-
ligi
La Colomba
Licorno, *Monacero*
La Croce
Il Sestante d'Urania
La Romboid;
I Cani da caccia,
Il Leon minore
La Lince
La Volpe
L' Oca,
Lo Scudo di Sobieski
Il Triangolo minore
Cerbero,
La Frasca
La Lucertola, *stellio*
Il Monte Menalo
Il Cuore di Carlo II.
La Quercia di Car-
lo II.

*In oltre
di recente*
Il Messier, mietito-
re,
Il Toro real di Po-
niatvski.

**14 Costellazioni
australi di Teo-
doro, Bayero ec.**

L' Indiano
La Gru
La Fenice
La Mosca
Il triangolo austral.
L' Augello del pa-
radiso
Il Pavone
L' Oca toucan
L' Idro maschio
Il Dorado; pesce
Il Pesce volante
Il Camaleonte
*Vi si vedono pure
la nuvola maggior,
e minore.*

14 Costellazioni

dell' Ab. De la Caille
L' Attreccio dello
scultore
Il Fornello chimico
L' Orologio astro-
nomico
Il reticolo romboid.
Lo Scalpello dell'
incisore
Il Cavalletto del
pittore
La Buffola
La Macchina pne-
umatica
L' Ottante di ri-
flessione
Il Compasso
La Regola, e la
squara
Il Telescopio
Il Microscopio
La Montagna del-
la Tavola.
231. Tra

231. Tra le stelle che compongono queste 100 costellazioni si distinguono molte grandezze, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima; ma le stelle di settima grandezza non si scoprono senza soccorso de' cannocchiali. Ordinariamente si contano 15 stelle della prima grandezza, *siro*, o la gola del can maggiore, la *spalla d' orione*, il piè d' orione o *rigel*, l'occhio del toro *aldebaran*, la *capra*, la *lira*, *arturo*, il cuor dello scorpione o *antares*, la *spica della vergine*, il cuor del leone o *regolo*, il can minore *procion*, il pesce australe *somabant*, e due che non si veggono mai in Europa, *canopo*, ed *acarnar*. Qualche astronomo mette nell' istessa classe anche il *cuor dell' idra*, la *coda del leone*, e la *coda del cigno*.

232. Per imparar a conoscer le differenti costellazioni per le loro figure, situazioni, nomi, il più semplice è d'impiegar un globo, o delle carte celesti, come quelle di Flamsteed, di Senex, d' Evelio, del P. Pardies, o i due grandi emisferj del Sig. Robert de Vaugondi; ma ecco una tavola che faciliterà la cognizione delle più belle stelle, mostrando l' ora, in cui passano per il meridiano nel primo giorno di ciascun mese, coll' altezza per Parigi, che è facile ridurre a quella di latitudine diversa. L' ultima colonna di questa tavola contiene l' ora del passaggio dell' equinozio per il meridiano, alla qual ora aggiungendo l' ascensione retta, o la distanza dal punto equinoziale, di qualunque stella in tempo, si ha l' ora del suo passare al meridiano (365). Per l' ora del passaggio dell' equinozio, s' intende il tempo a ragion di 15 gradi per ora, in cui passa il complemento dell' ascensione retta del sole; rapporto alle stelle s' intende il vero momento del passaggio. L' altezza della stella è in cima alla colonna sua.

Tavo-

*Tavola dell' ora , in cui passano per il meridiano le principali stelle
nel primo giorno di ciascun mese , coll' altezza.
meridiana per Parigi .*

	Aldebaran	la Capra	d'Orione	Sirio	Procione	Regolo
Altezza merid.	Alt. 57° 12'	86° 54'	39° 46'	24° 46'	47° 3'	54° 13'
Gennajo	9 ^h 38'	10 ^h 9'	10 ^h 34'	11 ^h 44'	12 ^h 36'	13 ^h 4'
Febbrajo	7 20	7 57	8 22	9 32	10 25	12 53
Marzo	5 32	6 9	6 34	7 44	8 36	11 4
Aprile	3 39	4 16	4 41	5 51	6 43	9 11
Maggio	1 48	2 25	2 50	4 0	4 52	7 20
Giugno	23 41	0 22	0 47	1 57	2 50	5 18
Luglio	21 37	22 14	22 39	23 49	0 46	3 14
Agosto	19 33	20 10	20 35	21 45	22 37	1 10
Settembre	17 37	18 15	18 39	19 50	20 43	23 10
Ottobre	15 50	16 27	16 51	18 2	18 54	21 22
Novembre	13 54	14 30	14 55	16 5	16 58	19 26
Dicembre	11 50	12 27	12 51	14 2	14 54	17 22

segue

	la Spica	Arturo	Antares	la Lira	Fomahant	l'equi- nozio
Altezza merid.	31° 13'	61° 34'	15° 16'	79° 45'	10° 22'	— —
Gennajo	18 ^h 21'	19 ^h 13'	21 ^h 23'	23 ^h 36'	3 ^h 55'	5 ^h 11'
Febbrajo	16 9	17 1	19 11	21 24	2 43	2 59
Marzo	14 21	15 13	17 23	19 36	23 51	1 10
Aprile	12 28	13 20	15 30	17 43	21 58	23 17
Maggio	10 37	11 29	13 39	15 52	20 7	21 25
Giugno	8 34	9 26	11 36	13 50	18 5	19 23
Luglio	6 30	7 22	9 32	11 46	16 1	17 18
Agosto	4 26	5 18	7 28	9 41	13 56	15 14
Settembre	2 30	3 22	5 32	7 46	12 1	13 18
Ottobre	0 42	1 34	3 44	5 58	10 13	11 30
Novembre	22 43	23 34	1. 48	4 2	8 17	9 33
Dicembre	20 38	21 30	23 40	1 58	6 13	7 29

233. Esempio . Il primo d' Ottobre voglio conoscere in cielo la stella chiamata Sirio , o il cane maggiore ; vedo nella tavola precedente che nel primo giorno di Ottobre passa per il meridiano a 18^h 21', cioè ai 2 d' Ottobre a 6^h 2' della mattina , e che la sua altezza meridiana per Parigi è di 24° 46'; alle 6^h 2' della mattina tengo disposto il quadrante

H

nel

nel piano del meridiano all' altezza di $24^{\circ} \frac{3}{4}$; m' accorgo nell' istante, che il quadrante è diretto verso una bella stella, che riconosco per Sirio. Ho scielto per la tavola un anno medio tra i due bissestili, potendovi esser 2 minuti di differenza tra l'osservazione, e la tavola, in differenti anni. Questa tavola potrà servire a trovar l'ora che è, quando si riconoscano le stelle, ed il meridiano. Le altezze notate per Parigi si ridurranno ad un altro paese, conoscendo la differenza di latitudine; così a Venezia essendo l'altezza di polo $45^{\circ} 26'$, quella di Parigi $48^{\circ} 50'$ colla differenza di $3^{\circ} 26'$, l'altezza di *aldebaran*, che per Parigi è $57^{\circ} 52'$, aggiungendovi $3^{\circ} 24'$, farà di $60^{\circ} 36'$.

234. Bisogna osservare, che i tempi notati nella tavola precedente sono tempi contati all' astronomica, vale a dire da un mezzodì all' altro per 24 ore. Così nella prima colonna *aldebaran* passando al meridiano al 1. Giugno a ore 23 41', vuol dire all' uso ordinario, li 2 Giugno a 11 41' della mattina, o sia all' italiana, 19 minuti avanti mezzodì dei 2; perchè all' astronomica il primo Giugno non comincia che a mezzodì, e termina nel mezzodì del giorno seguente.

235. Questo metodo è lungo; dunque s' indicheranno qui alcune collinzioni per conoscere le principali costellazioni, senza il soccorso d'istromenti, nè di carte; dove non si dovrà esigere un estremo rigore, bastando un certo indizio.

Descrizione generale delle costellazioni, e metodo di conoscere le stelle per via di certe collinzioni...

236. Suppongo, che in una sera d'inverno nel mese di Gennaio o di Febbrajo un si trovi in un luogo aperto verso 7 in 8 ore della sera: si vedrà dalla parte di mezzodì, almeno in Europa, la gran costellazione d'*orione*; essa è formata da tre stelle di seconda grandezza assai vicine tra loro, e in linea retta, in mezzo d' un gran quadrilatero; se ne vede la forma nella figura 19, e senza questa figura è impossibile sbagliarla coi caratteri indicati.

237. Queste tre stelle che si chiamano la cintura d'*orione*, volgarmente la *falce*, o i *tre Re*, colla loro direzione, da una parte mostrano *Sirio*, dall' altra le *plejadi*; *Sirio*, la più bella stella del cielo, si fa rimarcare per il suo splendore, e la sua scintillazione; si trova alla parte di levante, al sud-est rapporto ad *orione*.

238. Le *plejadi*, volgarmente la *chiocciatta*, sono dalla parte di ponente, tirando verso il nord: è un gruppo di stelle piccole, ma vivissime che si distingue facilmente; s' incontra nel prolungamento della linea tirata da *Sirio* per il mezzo delle stelle della cintura d'*orione*; la direzione di queste stelle tende un poco verso mezzodì dalle *plejadi*; sono nel dorso del Toro.

239. *Aldebaran*, o il *palidico* de' latini, che forma l'occhio del Toro, è una stella di prima grandezza, situata assai presso le *plejadi* a levante sci-

te scirocco, sulla linea, tirata dalla spalla occidentale d'orione γ alle plejadi stesse. (Tutti gli astronomi per disegnar le stelle si servono di lettere Greche, ad esempio di Bayero nell' *Uranometria*, pubblicata nel 1603.) *Prozione*, o il *can minore*, è una stella di prima grandezza situata al nord di Sirio, più orientale d'orione: con Sirio e la cintura d'orione fa un triangolo quasi equilatero, il che basta per distinguerla.

240. *Arturo*, che è la stella principale del bubulco, è una stella di prima grandezza, per conoscer la quale si può impiegare l'orfa maggiore più tosto che orione; ella è quasi disegnata dalla coda dell'orfa che si gira con altre in cerchio fino ad esta: le due ultime stelle dell'orfa ζ , ed ϵ (*fig. 1*) formano una linea retta, che si dirige ad arturo.

241. I *Gemelli*, sono due stelle della seconda grandezza, molto vicine, in mezzo l'orfa e l'orione. Si distinguono anche per mezzo d'orione, perchè tirando una linea da rigel o sia ϵ d'orione, la più occidentale e meridionale del quadrilatero, per la stella ζ , la terza e la più orientale delle tre della cintura, si dirige verso le due teste de' gemini; finalmente le due prime stelle della coda dell'orfa ζ , ι , colla diagonale del quadrato tirata per δ , e ϵ forma una linea, che va pure a dirigersi verso le teste de' gemelli, passando per una zampa dell'orfa.

242. La medesima linea prolungata di là dalle teste de' gemelli, passa per li piedi de' gemelli, che sono quattro stelle in linea retta alla prima, e prolungata arriva alla spalla orientale d'orione, α .

243. La linea tirata da rigel per la spalla occidentale d'orione γ , va ad incontrare al nord il *corno australe del Toro*, della terza grandezza, in egual distanza da una parte, che rigel dall'altra da γ , intorno 14° . Il corno boreale del Toro β , è della seconda grandezza, sta sulla linea, tirata per la spalla orientale α e per il corno australe ζ , 80° sopra. L'eclittica passa tra i due corni del Toro.

244. La costellazione del *lione*, può riconoscersi da due stelle precedenti α , β del quadrato della grand'orfa; poichè queste due stelle, che servono a trovar la stella polare dalla parte del nord, dalla parte di mezzodì colla loro linea mostrano il *lione*, a 45° dell'orfa maggiore. Il *lione* è un gran trapezio, in cui si distingue una stella di prima grandezza chiamata *regolo*, o il *cuor del lione*.

245. Il *cuor del lione* α , è sulla linea menata da rigel per *prozione*, a 37° da questa: così v'è una seconda maniera di conoscerlo. La coda del *lione* β è una stella di seconda grandezza, situata un poco al mezzodì della linea tra *regolo* ed *arturo*: ella è 15° a levante da *regolo*.

246. Il *cancro* è una costellazione formata di piccole stelle, difficili da discernersi. La *nebulosa del granchio* è un ammasso di stellette, meno sensibile che le plejadi; si trova a presso poco andando dal mezzo de' gemelli, al cuor del *lione*, e del *can minore* alla coda dell'orfa maggiore.

247. Al mezzodì delle tre stelle nella cintura d'orione si vede una lista di stelle, che forma ciò che si chiama la *spada*, e la *nebulosa d'*

orione (296) : la direzione di queste stelle prolungata sopra la stella ϵ , al mezzo della cintura, va a passare sul corno australe ζ del Toro, e poi sul mezzo della costellazione del *cocchiere* : questo è un gran pentagono irregolare, di cui la parte più settentrionale ha una stella di prima grandezza, chiamata la *capra*. La capra s' incontra ancora col mezzo d'una linea menata sulle due stelle δ , α , le più boreali del quadrato della grand' orsa.

248. Il *montone*, o l' *ariete*, la prima delle 12 costellazioni del *Zodiaco*, si distingue principalmente per due stelle di terza grandezza, assai vicine, di cui la più occidentale ϵ è accompagnata d' una stella più piccola di quarta grandezza, chiamata γ , o la *prima stella d' ariete*, perchè una volta era la più vicina al punto equinoziale. Questa costellazione si riconosce per una linea tirata dal can minore a aldebaran, che si dirige all' ariete, 36° a ponente d' aldebaran.

249. La *cintura di perseo* è composta di tre stelle, di cui una di seconda grandezza, passa vicino al zenit di Parigi : formano come un arco incurvato verso l' orsa maggiore. La linea tirata dalla stella polare alle *plejadi* passa sulla cintura di perseo; ma si può fare un' altra collineazione tra i gemini e la capra. La linea tirata dalla cintura d' orione per aldebaran, va sulla testa di medusa β , che perseo tiene in mano.

250. Il *cigno* è una costellazione assai rimarcabile, forma una specie di croce nella via lattea, ed ha una stella di seconda grandezza. Una linea tirata dai gemini alla stella polare va ad incontrare di là a pari distanza il cigno. Questa linea non serve, che quando sono ambedue sopra l' orizzonte; or ora si darà un' altra linea (256).

251. Il quadrato di *pegafo* è formato da quattro stelle di seconda grandezza, la più boreale è la *testa d' andromeda* : la linea tirata dalle due precedenti dell' orsa maggiore ϵ , ed α , per la stella polare va di là dal polo a passare per il mezzo del quadrato di pegafo. Una linea tirata dalla cintura d' orione, per il montone, va sulla testa d' andromeda : una linea tirata dalle *plejadi* per il medesimo montone, va sull' ala di pegafo γ , detta *algenib*, una delle quattro del quadrato : le due altre sono all' occidentale, la più boreale delle quali β , si chiama *scheat*, la più meridionale α , *markab*.

252. *Cassiopea* è una costellazione direttamente opposta all' orsa maggiore, rapporto alla stella polare, in modo che una linea, o un cerchio, che dal mezzo dell' orsa o dalla stella ϵ passa per la stella polare va nel mezzo di cassiopea. Questa costellazione viene formata da sei sette stelle d' un γ largo, o d' una sedia rovesciata; forma assai equivoca; ma le stelle di cassiopea essendo molte di seconda grandezza la fanno facilmente distinguere.

253. *Cefeo* è una costellazione compresa tra la stella polare, cassiopea, ed il cigno. Una linea tirata dalla stella polare alla coda del cigno α , passa presso delle stelle β ed α di cefeo, una sul ventre, l' altra sulla spalla, lasciandole ambedue un poco verso cassiopea. Avanti d' arrivare a ϵ , si lascia più lungi dall' istessa parte la stella γ , che si trova sulla li-

la linea tirata dalle *guardie* dell' orsa minore per il mezzo di cassiopea.

254. L' *orsa minore* ha quasi l' istessa figura, che l' orsa maggiore, e le è parallela, ma in situazione inverfa. La stella polare (δ) ch' è di terza grandezza, forma l' estremità della coda; le quattro stelle seguenti sono assai picciole, non essendo che di quarta grandezza; ma le due ultime del carro piccolo sono ancora di terza grandezza, chiamansi le *guardie* dell' orsa minore.

255. Il *dragone* sta in parte tra la lira e l' orsa minore, colla testa, ove quattro stelle fanno un parallelogrammo assai visibile; la coda è tra la stella polare, e il quadrato dell' orsa maggiore. Una linea tirata per le guardie dell' orsa minore ϵ , e γ , si dirige verso la stella α del dragone (nel planisferio di Senex marcata ϵ per errore). Questa stella giace tra θ , più meridionale, e ζ più boreale, in una linea diretta quasi nel polo dell' eclittica (28°), e un poco più avanti verso δ , ed ϵ del dragone, per andare in seguito a traversare cefeo tra β , ed α .

256. Una delle diagonali del quadrato di pegaso si dirige verso maestro verso la coda α del cigno, l' altra diagonale verso la cintura di perseo: questa passa prima verso la stella ϵ della cintura d' andromeda, e poi verso il piede γ di andromeda. Queste due stelle β , e γ , della seconda grandezza dividono in tre parti eguali lo spazio compreso tra la testa d' andromeda e la cintura di perseo; la linea che le giunge, passa tra cassiopea ed ariete.

257. Le costellazioni, che si veggono in estate la sera, non anno caratteri così marcati, come quelle d' inverno: ma si conosceranno per mezzo delle precedenti. Quando il mezzo della coda del carro, o la stella ζ , si trova nel meridiano sopra la stella polare al più alto del cielo, cioè che accade a 9^h della sera alla fine di Maggio, si vede nel meridiano a mezzodì la *spica della vergine*, stella di prima grandezza. La diagonale del quadrato del carro tirata per α , e γ , va a ferire appresso poco la stella medesima, benchè lontana di 68° . Finalmente questa stella forma appresso poco un triangolo equilatero con arturo e la coda del leone, da cui è lontana intorno 33° .

258. Un poco a dritta e più basso della *spica* si vede un trapezio formato dalle 4 principali stelle del corvo, che si trovano continuando la linea della lira e della spica.

259. Una linea tirata dall' ultime stelle del carro δ , γ , per regolo, va ad incontrare il *cuor dell' idra* 22° più a mezzodì. La testa dell' idra si trova a mezzodì del granchio, tra procione e regolo, un poco più meridionale. L' idra s' estende dal can minore fin sotto la spica della vergine.

260. La *coppa* giace tra l' idra, e il corvo, a ponente di questo: 4 stelle della coppa formano un trapezio assai visibile.

261. La *lira* è una stella di prima grandezza, una delle più belle del cielo, che fa quasi un triangolo rettangolo con arturo e la stella polare, l' angolo retto essendo nella lira verso oriente.

262. La

262. La *corona* è una piccola costellazione situata presso di arturo sulla linea d' arturo , e della lira . Si conosce facilmente per le 7 stelle in forma di semicerchio che la compongono ; ve n' è una di seconda grandezza . Le due prime stelle della coda dell' orsa ϵ , e ζ , formano un' altra direzione alla corona .

263. L' *aquila* contiene una bella stella di seconda grandezza , che sta a mezzodì della lira , e del cigno : si distingue facilmente , perchè giace tra due stelle β , e γ , della terza grandezza , che formano una linea retta colla bella stella , e le sono vicine .

264. *Antinoe* è una piccola costellazione situata sotto l' aquila .

265. Una linea , o un cerchio , che passa per regolo e per la spica della vergine (questa è appresso poco l' eclittica) va a trovare a levante la costellazione dello *scorpione* , assai osservabile : è composta di tre stelle nel fronte dello scorpione , di cui una di seconda grandezza , che formano un grand' arco dal nord al sud , ed una stella più orientale , ch' è come il centro dell' arco ; è stella di prima grandezza , e si chiama *antares* (tutti nomi arabi) o il cuore dello scorpione . Le stelle del fronte , cominciando da nord sono β , δ , π , ρ .

266. La *bilancia* contiene due stelle di seconda grandezza , che ne formano i due bacini : la linea di queste due stelle è appresso poco perpendicolare al mezzo di quella che da arturo va alla fronte dello scorpione ; vale a dire che sono al mezzo dell' intervallo benchè un poco all' occidente . Il bacino australe giace tra la spica ed antares , tutte tre assai vicine all' eclittica : vi ha $21^{\circ} \frac{2}{3}$ tra la spica e il bacino australe , e $24^{\circ} \frac{2}{3}$ tra questa ed antares .

267. Il *sagittario* è una costellazione che seguita lo scorpione a levante : ella è sulla direzione della spica ed antares dietro l' eclittica . Il sagittario contiene molte stelle di terza grandezza , che formano un gran trapezio , e due stelle del trapezio ne formano un più piccolo con due altre stelle ; ma questo secondo trapezio è in un senso perpendicolare al primo .

268. Questa costellazione viene marcata ancora da una linea tirata dal mezzo del cigno per il mezzo dell' aquila ; poichè il sagittario è 35° al mezzodì dell' aquila , come questa del cigno . Il sagittario viene ancora indicato dalla diagonale del quadrato di pegaso tirata dalla testa d' andromeda per α di pegaso , e prolungata verso mezzodì ; la medesima diagonale prolungata al nord indicava la cintura di perseo (256) .

269. Il cerchio tirato da antares fino alla stella polare traversa prima la costellazione d' ofiuco , o del *serpentario* , e più in alto incontra *ercole* . Queste due costellazioni sono un poco difficili da distinguere ; perciò le seguirò con qualche dettaglio . La linea tirata da antares fino alla lira , passa tra le due teste d' ercole e d' ofiuco , che sono due stelle di seconda grandezza , assai vicine , e la linea delle quali si dirige verso la corona : la più meridionale ed orientale è la testa d' ofiuco .

270. Una

270. Una linea tirata per le due teste va ad incontrare γ d' ercole 13° più lungi, e la stella ϵ d' ercole è 3° al nord-est di γ . La linea menata per γ e ϵ verso il nord trova δ d' ercole, e verso mezzodì, o piuttosto a sciocco, α del serpente: quest' anche forma un triangolo equilatero colla testa d' ercole, e la corona. La linea tirata dalla testa d' ofiuco al bacino australe della bilancia, passa sopra le stelle ϵ , e δ del medesimo ofiuco, una della quarta grandezza, l' altra della terza, che sono discoste una dall' altra $10^{\circ} \frac{1}{2}$, sopra una direzione perpendicolare al mezzo di questa linea: la stella δ è la più settentrionale e più occidentale. Queste stelle si dirigono al sud-est verso ζ al ginocchio occidentale d'

ercole, che sta a $7^{\circ} \frac{1}{2}$ di ϵ , e quasi verso ν nel ginocchio orientale che è $9^{\circ} \frac{1}{2}$ più lontano che ζ dalla parte di maestro. Quest' istesse stelle si dirigono un poco sotto α del serpente, l' istesso gruppo di ϵ , e δ d' ofiuco forma appresso poco un triangolo equilatero con ϵ della bilancia nel bacino boreale, ed α del serpente, presso di questa è la δ del serpente, $4^{\circ} \frac{1}{2}$ a maestro, ed ϵ che sta 2° a sciocco. La direzione di queste tre stelle indica ancora δ ed ϵ d' ofiuco che sono discoste 10° da ϵ del serpente.

271. Le stelle β , e γ sulla spalla orientale d' ofiuco, si trovano sopra la linea menata dalla testa d' ercole a quella del sagittario (267) sul medesimo meridiano che la testa d' ofiuco; β sta lungi 8° , e γ 10° più al mezzodì che la testa d' ofiuco; la loro direzione passa tra le due teste d' ofiuco, e d' ercole.

272. La linea tirata dalla testa d' ercole a quella d' ofiuco, si dirige verso θ estremità della coda del serpente, lontana 21° dalla testa d' ofiuco verso occidente: è una stella cangiante (291) che si disegnerà ancora qui dopo (276).

273. Una linea tirata dalle stelle più orientali della corona, che guardano la lira, fino ad α del serpente, passa sopra la testa del serpente tra γ , e ϵ della terza grandezza; questa β è la più occidentale, il piede occidentale d' ofiuco giace tra antares, e ϵ , o la boreale nel fronte dello scorpione; il piede orientale tra antares ed μ , che è la superiore ed occidentale, o sia la precedente dell' arco del sagittario. I due piedi d' ofiuco sono sull' eclittica istessa.

274. Il capricorno è disegnato dal prolungamento della linea che passa per la lira, e per l' aquila: sonovi due stelle della terza grandezza α , e ϵ , due gradi distanti l' una dall' altra poste in questa linea prolungata, che marcano la testa del capricorno, e due a levante per 20° segnate γ , e δ , che marcano la coda del capricorno, distano 2° l' una dall' altra, in senso d' oriente e d' occidente.

275. *Fomahant*, o la bocca del pesce australe, stella di prima grandezza, viene indicata da una linea menata dall' aquila, per la coda di capri-

pricorne, prolungata 20° di sotto. Ticone la chiama *fomahant*, il Sig. Hyde *Pham-Al-Hut*, Flamstedio *fomalhaut*.

276. Il *delfino* è una piccola costellazione, 15° in circa a levante dell'aquila, formata con un parallelogramo di 4 stelle della terza grandezza. Una linea tirata dal delfino per mezzo le tre stelle dell'aquila perpendicolare alla linea di queste, va a passare verso θ , estremità della coda del serpente, dalla parte d'occidente.

277. L'*acquario* è indicato da una linea tirata dalla lira sul delfino, prolungata verso mezzodì 15 gradi: l'acquario è un poco a levante. Andando dal delfino a *fomahant*, si traversa in tutta la sua lunghezza la costellazione di acquario, passando tosto tra le due spalle α , e β , che sono due stelle di terza grandezza, discoste l'una dall'altra 10° , le più osservabili di tutta questa costellazione; l'acqua sparfa dall'urna d'acquario va a terminare nella bocca del pesce australe, o *fomahant*.

278. La *balena* è una gran costellazione situata al mezzodì d'ariete, sotto lo spazio tra le pleiadi, ed il quadrato di pegaso. Una linea tirata dalla cintura d'andromeda, tra le due stelle d'ariete, va a passare sulla stella α , nella mascella della balena, che è una stella di seconda grandezza, 25° discosta dai corni dell'ariete. Viene indicata ancora dalla linea, che dalla capra passa per le pleiadi. Una linea tirata per aldebaran e la mascella della balena passa sulla coda ϵ , altra stella di seconda grandezza, 42° di là, vicina all'acqua di acquario.

279. I *pesci*, che formano il duodecimo segno del Zodiaco, sono poco rimarcabili; uno è posto lungo il lato meridionale del quadrato di pegaso, sotto α , e γ d'effo; l'altro giace al levante dell'istesso quadrato, tra la testa d'andromeda, e la testa dell'ariete. La stella α , nel nodo del *limo* dei pesci, che è della terza grandezza, giace sulla linea tirata dal piede d'andromeda, per la testa d'ariete, e sopra un'altra per li piedi dei gemelli, e d'aldebaran, 40° all'occidente; fa anche un triangolo rettangolo con α della balena e ϵ , o γ d'ariete, al mezzodì di queste: è questa la stella più rimarcabile nella costellazione dei pesci.

280. Io non m'estenderò più a lungo nel dettaglio delle costellazioni, perchè l'altre essendo più piccole, e meno osservabili, per ben distinguere vi vorrà l'aiuto delle carte celesti.

281. Avendo conosciuto il polo del mondo (5) farà molto bene conoscere il polo dell'*eclittica*, essendo un punto de' più rimarcabili in cielo. Il polo boreale dell'*eclittica* dunque è situato nella costellazione del dragone, sopra una linea tirata per le due seguenti γ , e δ dell'orsa maggiore; fa un triangolo quasi equilatero colla lira ed α del cigno; è anche sopra la linea tirata per le due precedenti del quadrato dell'orsa maggiore, e le guardie dell'orsa minore, 3° di là dalla stella ϵ del dragone, che giace appresso poco sulla medesima linea delle stelle θ , ι , ζ , η , ϕ del dragone, la direzione delle quali s'estende da arturo a cefeo, e cassiopea: la stella κ è quella, a cui si dirigono le guardie dell'orsa minore. Finalmente il polo dell'*eclittica* fa un triangolo rettangolo, ed isoscele

scelse colla stella polare, e ϵ o sia la maggior guardia dell' orsa minore, la più settentrionale; e l'angolo retto è in questa.

282. Per mettersi a portata di estimare le distanze delle stelle in gradi, bisogna misurarli sul globo, ed avvezzarsi a riportarli in cielo: si vedrà, per esempio, che Arturo è lontano 300 29' dall'ultima stella α della coda dell'orsa maggiore; le due estreme stelle delle tre nella cintura d'orione sono lontane $20^{\circ} \frac{3}{4}$; le due spalle d'orione 70° ; aldebaran da Sirio 46° ; molte altre distanze si sono indicate negli articoli precedenti; si può rifletter anche che il diametro del sole e della luna è d'incirca mezzo grado.

Delle stelle cangianti e nebulose.

283. L'istoria fa menzione di molte stelle rimarcabili, che sono comparse di nuovo, e poi sparise totalmente: ancora ne conosciamo di quelle, che spariscono di tempo in tempo; che crescono di grandezza sensibilmente, e poi diminuiscono. Ve ne sono altre descritte dagli antichi come stelle rimarcabili, che non compariscono più; altre finalmente, che si vedono costantemente in oggi, benchè non descritte dagli antichi; si può però attribuire una parte di queste differenze alla loro disattenzione, o all'error del catalogo degli antichi, che non si ha se non dall'Almagesto di Tolomeo con molti falli.

284. Gli autori più antichi come Omero, Attalo, e Gemino, non contavano se non 6 plejadi; Simonide, Varrone, Plinio, Arato, Ipparco, e Tolomeo nel testo Greco; le mettono 7; e si pretese che la settima era comparsa avanti l'incendio di Troja; ma questa differenza ha potuto venire dalla difficoltà di distinguerle, e di contarle colla semplice vista.

285. L'istoria racconta più precisamente apparizioni di stelle nuove, 125 anni avanti G. C. all'età d'Ipparco (Ved. Plinio lib. II. c. 24. 26); e all'età dell'Imperatore Adriano, 130 anni dopo G. C.

286. Fortunio Liceto celebre medico morto a Padova nel 1556 ha composto un trattato *de novis astris*, in cui si trova un' ampia tradizione sulle stelle nuove, delle quali annoparlato gli antichi. Riferisce pag. 259, che Cuspiniano osservò una stella nuova l'anno 389 presso dell'aquila; ella parve risplendente quanto Venere, per tre settimane, in seguito disparve. Ne cita molte altre di differenti secoli.

287. Ma la più famosa tra tutte le stelle nuove è stata quella del 1572: scoperta al principio di Novembre, e faceva un rombo perfetto colle stelle α , ϵ , γ , di Cassiopea: comparve con grande splendore, come forta all'improvviso, sorpassava Sirio, e Giove stesso perigeo; si vedeva anche di giorno. Dal mese di Dicembre 1572 cominciò a diminuire fino al Marzo 1574, in cui si perdette di vista. Non aveva parallassi sensibile (A. 441); nè alcun moto proprio apparente; donde è facile concludere, che era molto più lontana da noi, che Saturno il più remoto di

tutti i pianeti, senza di che avrebbe avuto una parallasse annua sensibile: non aveva capigliatura, come le comete, ma brillava come le stelle fisse.

288. La nuova stella del serpentario, che comparve li 10 Ottobre 1604, fu quasi tanto risplendente, come quella del 1572. Keplero assicurò, che non aveva veruna parallasse, nè moto, rapporto altre stelle; e perciò era molto al di sopra della sfera di saturno; perchè la parallasse annua prodotta dal moto della terra l'avrebbe fatta variare in apparenza di molti gradi; se fosse stata alla distanza di saturno (447).

289. Si sono osservate nel cigno tre stelle cangianti; la più rimarcabile è quella segnata γ da Bayero, e di cui si osservano ancora le variazioni. Il Sig. Kirch osservò le diversità di lume nel 1686. Dopo, i Sigg. Maraldi e Cassini avendo osservato molte volte questa stella, trovarono il periodo del suo più grande splendore di 405 giorni; negli anni prossimi al suo splendore, cade ai 29 Aprile 1773; 9 Giugno 1774; 19 Luglio 1775; 27 Agosto 1776; 7 Ottobre 1777. (mem. Accad. 1759). Si osservi, che questi ritorni vanno soggetti a delle irregolarità fisiche.

290. La seconda stella cangiante del cigno è situata presso la stella γ , che è nel petto. Fu scoperta da Keplero nel 1600; per 19 anni, che l'osservò, parve sempre della stessa grandezza, meno grande di γ nel petto, ma più grande di quella che è nel becco. Il Sig. Cassini la osservò di nuovo nel 1655; l'Evelio nel 1665; nel 1677, 1682, 1715 non era che come una stella di sesta grandezza.

291. La terza cangiante del cigno fu scoperta dal P. Anfelmo li 10 Giugno 1670 presso la testa del cigno, dalla parte della freccia: ella era di terza grandezza; e li 10. Agosto non più che di sesta; la rivide li 17 Marzo 1671, e la giudicò di quarta grandezza. Il Sig. Cassini in quell'anno vi osservò molte variazioni: dopo il 1672 non comparve più. Il Sig. Cassini il figlio ha parlato di molte altre stelle, o nuove, o che sono perdute, o che appariscono cangianti, come quelle di cassiopea, dell'eridano, della balena ecc. (Elem. d'astron.)

292. E' difficile formarli un'idea chiara della cagione che può far cangiare, e sparire le stelle, o mostrarcene di nuove. Il P. Riccioli credeva, che vi sieno forse delle stelle, che non sono luminose in tutta la loro estensione, e delle quali la parte oscura poteva voltarsi più o meno verso di noi nella loro rotazione (1931). Il Sig. di Maupertuis nel suo discorso sulle differenti figure degli astri pubblicato a Parigi nel 1732, avendo fatto vedere, che il moto di rotazione d'un astro sul proprio asse, può produr in esso un appiattimento considerabile, se ne serve per spiegare il fenomeno delle stelle nuove: se alcuna di queste stelle plane ha intorno d'essa un qualche grosso pianeta; in un'orbita assai eccentrica, ed inclinata al piano dell'equatore della stella, l'attrazione del pianeta quando s'accosta al suo perielio, cambierà l'inclinazione della stella schiacciata, che perciò apparirà più o meno luminosa: ed una stella, che noi non scoprivamo, perchè ci si presentava di taglio, può diventar visibile, presentando una parte del suo disco: così si può render ragione del-

della mutazione di grandezza, osservata in alcune stelle, delle loro disparizioni, dei loro ritorni, benchè a prima vista l'ipotesi sembri poco verisimile.

293. La *via lattea* è una bianchezza irregolare, che circonda tutto il cielo in forma di fascia. Democrito pensò, che il candore di questa fascia dovesse esser prodotto da una moltitudine di piccolissime stelle impercettibili; così pensava anche Manilio. Per quanto ciò sia probabile, bisogna confessare, che non è niente meno, che dimostrato; poichè per tutto il cielo, coi telescopj si scoprono appresso poco tante stelle, come nella *via lattea*, e un tal candore rimane sempre nel fondo come dietro alle stelle. La *via lattea* si troverà disegnata nel mio nuovo globo celeste, più esattamente che altrove.

294. Come la *via lattea* forma un candore intorno del cielo, così in altre parti, dove la *via lattea* non arriva, s'incontrano delle piccole macchie bianche, che alla vista semplice somigliano a delle stelle poco luminose, e che nel telescopio fanno un candore sparso, in cui non si trova stella, o pure forma degli spazj misti di bianchezza, e di piccole stelle. Sono queste, che propriamente si chiamano stelle *nebulose*; perchè alcune in vero nel cannocchiale non appariscono altro, che ammassi di piccole stelle.

295. La prima nebulosa propriamente detta, che si scoprì dopo l'invenzione del cannocchiale, fu quella d'*andromeda*, vista da Simon Mario nel 1612: all'occhio nudo compariva una nuvoletta, ma nel cannocchiale pareva formata da tre raggi bianchi, pallidi, irregolari, che erano più chiari verso il centro. Il Sig. Gentil dice che cambia forma (*mem.* 1759); occupa in circa un quarto di grado: il Bullialdi fu persuaso, che era stata veduta più di 600 anni avanti.

296. La nebulosa d'*orione* sta sotto la cintura (247): è la più rimarcabile di tutte le nebulose; e pure l'Ugenio fu il primo che la osservò per caso nel 1656; ella è d'una figura irregolare, bislunga, e curva; la sua bianchezza nel cannocchiale riesce viva, e pure non vi si discernono, che 7 piccole stelle d'una chiarezza pallida, ma uniforme. Vi sono molte altre nebulose in sagittario, antinoo, ercole, centauro, andromeda, serpentario ec. Il Sig. de la Caille, mentre travagliava al suo catalogo delle stelle australi al capo di Buona speranza, ne ha rimarcato 42, di cui ha dato la posizione; e il Sig. Messier ne ha osservato molte nell'emisfero boreale.

297. Il *lume zodiacale*, che il Sig. di Mairan compara a quello delle nebulose, è una chiarezza o un candore sovente assai simile a quello della *via lattea*; si vede dopo il tramontar del sole, finito il crepuscolo, sopra tutto al principio di Marzo, in forma di piramide, o di mezzo fuso, alla cui base è il sole; ha talora più di 100° in lunghezza. Pare, che questo lume non sia altro, che l'atmosfera del sole, poichè ha una situazione simile a quella dell'equatore solare (959) e apparisce in forma di sferoidi appiannata, come lo esige la rotazione del sole (945).

Questo lume zodiacale si trova ampiamente descritto nel *trattato dell' aurore boreali* del Sig. di Mairan.

298. Le *aurore boreali*, che fanno il soggetto principale di quest' opera, sono un fenomeno luminoso così chiamato, perchè suol apparire nella parte boreale del cielo, ed il suo lume presso l'orizzonte somiglia a quello dell'aurora. Si vedono sovente dell'aurora boreali nei paesi del nord, di rado in Italia. Se ne vide una famosa li 19 Ottobre 1716 a Parigi, seguitata da molte altre, che indussero il Sig. di Mairan a ricercare la cagione di questi fenomeni, e pensò d'averla ritrovata nell'atmosfera delle folie, che venendo ad incontrare le parti superiori della nostr' aria, vi deponga delle particelle luminose, che cadendo nell'atmosfera terrestre, più o meno avanti secondo la loro gravità specifica, formano tali fenomeni.

299. Ma le aurore boreali sembrano più legate coi fenomeni elettrici: fanno variare sensibilmente la direzione degli aghi calamitati; elettrizzano delle punte isolate, piantate in gran tubi di vetro; si crede anche aver sentito uno scoppio simile a quello delle scintille elettriche. Su i rapporti, che si osservano tra la materia magnetica, ed elettrica, non farei stupito, che la materia elettrica si portasse al nord, e fortisse per li poli della terra, verso le parti specialmente, ove v'è copia di minerali; in tal caso potrebbe produrre le aurore boreali, che sono quasi continue nei paesi settentrionali, come si vede nella *figura della terra* del Sig. *Maupertuis* ec.

In questo primo libro abbiamo compreso i primi principj della sfera, e la cognizione più semplice delle stelle fisse: il dettaglio dei loro moti, reali o apparenti, si troverà nel libro VII. secondo l'ordine dei tempi, e delle difficoltà, in cui si presentarono.



LIBRO SECONDO.

I fondamenti dell'astronomia, e i sistemi del mondo.

300. I primi fondamenti dell'astronomia sono quelli, l'applicazione dei quali deve esser la più generale, e maggiormente influire in tutto il rimanente dell'opera. Sotto questo titolo dunque ho compreso 1°. la ricerca dei moti del sole, a cui siamo sforzati di riferire tutti gli altri moti; 2°. le posizioni delle stelle fisse che servono a conoscere esattamente quelle di tutti gli altri astri; 3°. la misura del tempo, le sue irregolarità, e l'equazione, ch'è un preliminare d'ogni calcolo astronomico; 4°. la maniera di trovar l'ora del passaggio per il meridiano, del levare, e del tramontare d'un astro; finalmente, a misura che l'occasione lo portava, ho aggiunto i problemi, che sono i più usati nell'astronomia sferica.

301. Parerebbe che non si potesse leggere questa parte senza sapere un poco le regole di trigonometria sferica, o almeno saperle adoprare, che vuol dire, fare una regola del tre coi seni, e coi logaritmi. Ma si può avere un'idea assai completa dell'astronomia senza eseguire i calcoli, e si può anche eseguirli senza conoscere le dimostrazioni della trigonometria sferica. Nei trattati del Sig. des Parcieux, Mauduit, Ozanam, Rivard, de la Caille, Bezout, come nella mia grand'opera d'astronomia si troverà ciò che occorre (e senza ricorrere ai libri Francesi, nell'introduzione alle tavole trigonometriche 1769, 1773 in Padova appresso Giovanni Manfrè, dove si troverà una quantità d'esempi dettagliati ed applicazioni). Dopo una prima lettura dei principj di questa scienza, si potrà esercitarsi in problemi sferici, per ripassare con frutto maggiore l'astronomia, specialmente volendo internarsi in questa scienza.

302. Importa solo di ben osservare tre cose prima d'entrare in materia. 1°. Gli angoli sferici in cielo s'intendono formati dall'incontro di due cerchi massimi, e sono misurati da un altro arco di cerchio massimo, che ha il polo nel vertice dell'angolo medesimo, che vuol dire lontano 90° gradi. Così l'angolo Υ (Fig. 18) formato dall'equatore ΥQ , e dall'eclittica ΥC , è di tanti gradi che l'arco CQ descritto in distanza di 90° dal vertice Υ ; quell'arco è la misura dell'angolo Υ . 2°. Gli archi perpendicolari ad un cerchio vanno ad incontrarsi nei poli di questo cerchio. 3°. In ogni triangolo sferico conoscendo tre cose prese ad arbitrio tra i tre angoli e i tre lati, colle regole della trigonometria sferica, si possono sempre trovare le tre altre. Queste tre regole generali bastano per intendere tutto ciò che s'ha a dire in questo libro: non ho voluto imbarazzare i principj di questo trattato con un dettaglio noioso di formole, e di calcoli.

Del

Del moto, e delle disuguaglianze del sole.

303. Un osservatore che voglia da se solo formarli un corso d'osservazioni, e seguire il progresso degli astronomi antichi nelle loro ricerche, deve cominciare da determinare l'altezza del polo, o sia la latitudine del luogo del suo osservatorio; riconoscerà la direzione dell'eclittica, o del cerchio che descrive il sole in un anno; finalmente riconoscerà i punti, in cui l'eclittica taglia l'equatore (66), l'angolo che essa fa con questo cerchio, o sia la sua lontananza nei punti solstiziali (70); allora farà in istato di determinare il progresso del sole nell'eclittica e i punti, nei quali si trova ciascun giorno; questa è la prima specie d'osservazione, di cui ha bisogno.

Sia EQ (fig. 21) l'equatore, HO l'orizzonte, ES l'eclittica inclinata in E di $23^{\circ} \frac{1}{2}$ sopra l'equatore; S il sole a mezzodì nel momento che passa il meridiano SAB. Se io osservo (23) quanti gradi ha di altezza sopra l'orizzonte, vale a dire, la misura dell'arco SB, e da questo sottraggo l'altezza AB dell'equatore, che in undato luogo è sempre la medesima (a Parigi di $41^{\circ} 10'$) io conoscerò SA distanza del sole dall'equatore che si chiama *declinazione del sole* (91). Ora nel triangolo sferico SEA, formato dagli archi dell'equatore, dell'eclittica, e del meridiano, si conosce l'angolo E di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, e il lato opposto SA che è la declinazione del sole, con l'angolo retto A, perchè i meridiani sono perpendicolari all'equatore (21); colla trigonometria sferica si troverà l'ipotenusa ES, che è la longitudine del sole che si cerca, vale a dire, la sua distanza dal punto equinoziale E, misurata lungo l'eclittica.

304. Esempio: li 22 Marzo 1752 nell'osservatorio Reale di Berlino con un quadrante di 3 piedi di raggio io ho osservato l'altezza del lembo del sole, ed ho conchiuso dall'osservazione, che l'altezza vera del centro del sole era di $38^{\circ} 21' 27''$; precedentemente avevo determinato l'altezza dell'equatore $37^{\circ} 28' 30''$; levando questa da quella del sole, resta $0^{\circ} 53' 57''$ per la declinazione vera del sole; e supponendo l'obliquità dell'eclittica per quell'anno $23^{\circ} 28' 11''$, per isciogliere il triangolo sferico ESA, colle regole della trigonometria, ho fatto questa proporzione; il seno di $23^{\circ} 28' 11''$, o sia dell'angolo E, sta al seno di $53' 57''$, che è il lato AS, come il seno tutto, che è sempre l'unità, è al seno dell'ipotenusa ES, o sia della longitudine del sole, che dunque s'è trovata di $2^{\circ} 17' 29''$.

305. Il lato ES trovato con questa proporzione non è che la distanza dall'equinozio più vicino E; se l'osservazione fosse stata fatta nel mese di Settembre, tempo in cui il sole s'accosta all'equatore e la sua declinazione va calando, il risultato della nostra proporzione sarebbe solamente la distanza dall'equinozio d'autunno, misurata lungo l'eclittica. Sia

YDKCB

YDKCB $\triangle$ NR (fig. 21) l'equatore disteso in linea retta, YH $\triangle$ l'eclittica, di cui la metà prima YH $\triangle$ essendo sopra, o sia al nord dell'equatore, ha una declinazione boreale, quando gli altri sei segni l'anno australe; se il sole fosse stato in G colla declinazione BG, la regola precedente avrebbe fatto trovare l'ipotenusa G $\triangle$, di cui il supplemento a 6 segni, o sia 180° , YSHG, farebbe la longitudine del sole. Se la declinazione del sole fosse australe come AF, la sua altezza farebbe minore dell'altezza dell'equatore nei nostri paesi settentrionali; bisognerebbe sottrarre l'altezza osservata del sole dall'altezza dell'equatore; l'ipotenusa trovata coll' analogia precedente farebbe $\triangle$ A, distanza dall'equinozio d'autunno, e bisognerebbe aggiungervi 180° o sia il semicerchio YH $\triangle$ per aver la longitudine del sole, che si deve sempre contare dall'equinozio di primavera, o sia da ariete, e farebbe l'arco YH $\triangle$ A. Finalmente se la declinazione del sole, parimente australe, fosse come PQ, tra il solstizio d'inverno $\triangle$, e l'equinozio di primavera Y, colla nostra regola non si troverebbe che l'ipotenusa PR; e per aver la vera longitudine bisognerebbe prender il complemento di quest'arco a 12 segni, o sia 360° , cioè tutto l'arco YSHGAP, contato da occidente in oriente dal principio delle longitudini, cioè da ariete.

306. Tal è il metodo adoprato dagli astronomi antichi, per ritrovare giorno per giorno la longitudine del sole, col mezzo della sua altezza e della sua declinazione (Copernico lib. II. c. 14). Gli astronomi moderni anno cercato di sopprimere in questo metodo la necessità di conoscere l'altezza dell'equatore, e in conseguenza la declinazione del sole. Secondo il metodo di Flamstedio, seguito dal Sig. de la Caille, e da tutti gli astronomi, si confronta il sole con una stella E; o pur L (fig. 22); quando si trova nel medesimo parallelo della stella, o almeno egualmente discosto da queste due osservazioni, fatte 4 in 5 mesi l'una dall'altra, si anno le differenze d'ascensioni rette BC, CD, vale a dire il moto totale BD del sole in ascensione retta, di cui la metà BK è il complemento di B $\triangle$ o sia YD che dunque si conosce. Così si determina il luogo del sole, e per conseguenza le sue irregolarità. Conoscendo poi la durata dell'anno solare, cioè il tempo che impiega a descrivere 360° , è facile trovare, quanti gradi di longitudine deve avere ogni giorno dell'anno, e conoscere se s'accordano coi gradi di longitudine vera osservata di giorno in giorno. Presto s'accorsero, che il sole si trovava talor più avanzato, fin quasi 2° , di quello dovesse essere secondo questa longitudine media uguale e uniforme, distribuita proporzionalmente per tutti i giorni dell'anno, e che sei mesi dopo la longitudine vera si trovava all'opposto meno avanzata, o minore 2° , della longitudine media.

307. Quando si dividono 360° , o sia $1296000''$, in $365 \frac{1}{4}$ parti, si trova, che il sole deve fare ogni giorno $59' 8'' \frac{3}{10}$; onde sommando di seguito questa quantità, è facile trovare per ciascun giorno, quanti gradi e minuti-

minuti deve avere la longitudine del sole, supponendo che cresca regolarmente e in modo uniforme, cioè ogni giorno della stessa quantità (tale longitudine per il sole, e per tutti i pianeti si ritrova calcolata nelle tavole astronomiche). La longitudine così trovata per ogni giorno coll'addizione successiva del moto diurno, o sia di $59' 8''$, si chiama la *longitudine media*.

308. Avendo gli astronomi osservato per un anno di seguito col metodo precedente (303) il vero luogo del sole nell'ecclittica, tutti i giorni a mezzodì, trovarono, come si accennò, che questa longitudine vera ed osservata non era sempre uguale alla longitudine media calcolata innanzi; non era uguale se non al principio di Gennajo e di Luglio; nel mese di Aprile la longitudine vera è maggiore di 2 gradi, o più esattamente $10^{\circ} 55' 31''$, vale a dire, che al primo di Aprile il sole è realmente nel punto, in cui secondo la longitudine media doveva esser ai 3, due giorni dopo; all'opposto verso il principio d'Ottobre la longitudine vera è minore della longitudine media della stessa quantità: questa inegualità del sole, o questa differenza si chiama *equazione dell'orbita*, o sia *equazione del centro*.

309. La prima idea, che si dovette avere sulla cagione di questa inegualità, fu ch'era solamente apparente: il sole, dicevano i primi filosofi, deve descrivere un cerchio vero, perchè questa è la più perfetta di tutte le figure, e deve descriverlo uniformemente, perchè il moto uniforme è il più perfetto di tutti. Or se la terra, da cui noi vediamo il moto del sole, non fosse nel centro di questo cerchio, le parti più remote di esso devono apparire più piccole delle parti più vicine, quindi il moto del sole nelle parti più lontane sembrare più lento e più piccolo. Sia E (fig. 23) il centro del cerchio N A P B, che il sole descrive ogni anno, ed F un altro punto in cui si trovi la terra; il sole trovandosi in N sarà più lontano da noi, che se fosse nel punto P; e però gli spazi, che ivi avanza ciascun giorno pareranno più piccoli, ed il sole starà più lungo tempo a percorrere la porzione B A, che la parte C D, benchè eguali, l'una e l'altra di 90° , essendo supposti angoli retti B F A, C F D. Se per il centro E si tirano le linee G E, H E, parallele alle prime, si vede che un quarto della rivoluzione media si compie da G, in H, benchè il quarto della rivoluzione vera ed osservata non si verifica se non da A in B, in uno spazio di tempo più lungo del quarto. Questi spazi A G, H B, o sia gli angoli A F G, B F H, o i loro eguali E G F, H E B, fanno l'inegualità, o l'equazione del sole. Prendendo il moto del sole dal punto N, giunto che sia in H, il suo moto medio è misurato dall'angolo N E H; il moto vero ed osservato dall'angolo N F H, minore del primo dell'angolo E H F, che forma l'equazione, ed è da sottrarre dal moto medio per avere il vero, sino ad un segno; dopo il quale sarà viceversa da aggiugnere, come se il sole fosse arrivato in G, perchè l'angolo G F P del moto vero è maggiore dell'angolo G E P del moto medio; e però questa equazione dai Greci fu detta *prophæresis*, *addiziona*. Il tutto sarà spiegato ancora più chiaramente nel seguito.

310. II

310. Il punto N dell' orbita il più lontano dalla terra si chiama *apogeo* (lungi dalla terra), e il punto P opposto ed il più vicino ; si chiama *perigeo* (presso la terra); la quantità EF, cioè la distanza tra il centro dell' orbita, ed il punto in cui si suppone l' osservatore che qui è la terra, dicesi *eccentricità* ; la distanza del sole dal suo apogeo dicesi *anomalìa* (irregolarità, inegualità) (che qui è più tosto l' indizio o l' argomento dell' inegualità) ed il corso del sole , o d' un altro astro preso da questo punto dell' apogeo , si chiama *rivoluzione anomalistica* . Quando avremo dimostrato in seguito, che è veramente la terra quella che descrive un' orbita simile intorno del sole situato in F, noi chiameremo *afelio* (lungi dal sole) il punto N, in cui sarà la terra più lontana che possa essere dal punto F; e *perielio* (presso del sole) il punto P in cui sarà più prossima ; gli stessi termini serviranno per le orbite degli altri pianeti . In generale chiamansi *apsidi* (curvature) questi due punti estremi N, P, d' un orbita considerata relativamente al punto F, mentre l' astro arrivato al più lontano ricomincia ad avvicinarsi, e giunto al più vicino ricomincia ad allontanarsi.

311. E questa è l' *ipotesi dell' eccentrico* . Si può ancora cogli antichi spiegare l' istessa irregolarità del sole con un *cerchio omocentrico* , il cui centro cioè risponde al centro istesso della terra , ma allora bisogna caricare questo cerchio d' un *epiciclo* . Sia F (fig. 24.) il centro del cerchio ABL che il sole. si suppone descrivere e quello insieme della terra ; GHK un piccolo cerchio chiamato *epiciclo* (sopra cerchio), il cui centro B percorre uniformemente la circonferenza ABL da occidente in oriente , nell' atto che il sole istesso col suo centro scorre l' epiciclo in senso contrario, e con eguale moto angolare da G in H, o sia da oriente in occidente . Supponesi che il punto G dell' epiciclo chiamato l' apogeo , perchè è il più lontano dalla terra ; si sia trovato al principio sul raggio prolungato FA in N ; si prende l' arco GH dell' istesso numero di gradi ; che l' arco AB ; ed il punto H è il luogo in cui supponesi il sole nell' atto che il centro dell' epiciclo è nel punto B . Ora se prendiamo FE parallela ed eguale a BH, e dal punto E, come centro, si descriva un altro cerchio NHP, il cui raggio EH sia uguale ad FB, o FA ; questo cerchio NHC sarà precisamente l' istesso , che l' eccentrico descritto nell' ipotesi precedente , come Tolomeo lo supponeva : l' angolo HEN è il medesimo in ambi i casi, cioè il moto uniforme del sole in se stesso sull' arco NH, misurato dall' angolo HEN, mentre il moto veduto dal punto F della terra, misurato dall' angolo NFH più piccolo, apparisce minore : l' arco NH dell' eccentrico è l' istesso , che l' arco AB nell' ipotesi dell' epiciclo, l' uno e l' altro proporzionale al tempo , crescenti di 59' 8" per giorno .

312. Questa inegualità del sole , che gli antichi ingegnosamente spiegavano per il mezzo d' un' orbita eccentrica , o d' un epiciclo , fu egualmente osservata nei pianeti , che tutti in effetto anno dell' orbite eccentriche . Ma questa loro inegualità non si può misurare , se non nei tempi delle loro congiunzioni, ed opposizioni col sole, cioè quando sono nella

la medesima linea col sole. Fuori di questa linea, quando sono a destra o sinistra rapporto a noi, i pianeti soffrono un'altra irregolarità, ancora più considerabile: essa nasce dall'esser noi fuori del sole, al quale si riferiscono i moti, e l'orbite de' pianeti, che girano intorno il sole; ma gli antichi non conoscendo questa spiegazione, e non comprendendo la causa di questa *seconda inegualità*, si contentavano di spiegarla, ponendo un secondo epiciclo sopra il primo, o pure con un eccentrico che insieme portasse un epiciclo (380).

313. L'altezza meridiana del sole, che ha servito a determinare la sua longitudine (303.) può servire egualmente a trovare la sua ascensione retta. Quando si conosce la declinazione AS (fig. 21) nel triangolo SEA in cui si conoscono tre cose, si può egualmente trovare il lato AE, che è la distanza del sole dall'equinozio contata sull'equatore, e l'angolo S formato dall'eclittica ES, e dal meridiano; o cerchio di declinazione SA: il complemento di quest'ultimo angolo, che farà formato dal cerchio di latitudine, che passa per l'istesso punto col cerchio di declinazione, chiamasi *angolo di posizione*. Si tenga bene a mente, poichè se n'avrà bisogno nel calcolo dell'eclissi.

314. Conoscendo ciascun giorno la longitudine, o l'ascensione retta del sole, è facile vedere il giorno e l'ora dell'equinozio, vale a dire il punto, in cui il sole non ha nè longitudine, nè ascensione retta, nè declinazione. Gli antichi osservavano gli equinozi per mezzo d'un cerchio, o anello di bronzo inclinato come l'equatore, di cui però la concavità cessava d'essere illuminata dal sole nel giorno in cui si trovava nel piano dell'equatore; ma questa maniera era fallace per le rifrazioni.

315. La *lunghezza dell'anno* è una conseguenza della determinazione degli equinozi, poichè l'intervallo tra un equinozio, e quello dell'anno prossimo, forma la durata dell'*anno solare*, o del ritorno delle stagioni. Prendendo due equinozi osservati mille anni uno dall'altro, e dividendo l'intervallo totale in mille parti, si avrà più esattamente la lunghezza dell'anno; si trova con questo metodo di $365^{\text{h}} 5^{\text{h}} 48' 45''$. Si parlerà dopo dell'*anno siderale*, che si rapporta alle stelle, e non agli equinozi, ciò che fa una piccola differenza nei ritorni del sole (322).

316. L'ascensione retta del sole trovata immediatamente col metodo precedente, serve a trovar quella delle stelle, e a formare i nostri cataloghi. Di fatto per conoscere la longitudine d'una stella, o di qualunque astro, bisogna osservarne l'ascensione retta, e la declinazione. Per conoscer l'ascensione retta d'un astro, basta compararlo con il sole, di cui l'ascensione retta si può conoscer ogni giorno col metodo dell'art. 313, o pure con una stella, che si sia determinata nello stesso tempo. Così il problema si riduce a trovare l'ascensione retta del sole: questo è il termine suggerito dalla natura, dal quale bisogna assolutamente partire, ed a cui tutto si deve riferire. Di fatto le longitudini si contano da un punto che non è dato e cognito se non che per il moto del sole (essendo l'intersezione della strada del sole coll'equatore); questo punto non è marcato nel cielo, il sole ce ne mostra solo il luogo: dunque solamente

per

per mezzo del sole si può determinare la distanza d' un astro dal punto equinoziale , determinando separatamente la distanza dell' astro dal sole , e quella del sole dall' equinozio .

317. Quando una volta si conosce esattamente l' ascensione retta del sole , o d' una stella , si osserva la differenza di tempo tra il suo passaggio per il meridiano , e quello d' altre stelle , e si conchiude l' ascensione retta di ciascuna . Per aver l' ora del passaggio d' una stella per il meridiano si potrebbe servirsi d' una meridiana sopra la quale fossero elevati dei fili a piombo , o un triangolo filare ; ma al giorno d' oggi si adopra il metodo dell' altezze corrispondenti (312) o pure un cannocchiale meridiano , che gira sopra un asse ben orizzontale senza scostarsi dal piano del meridiano . Per aver la declinazione basta osservare l' altezza meridiana della stella , e prender la differenza tra l' altezza dell' equatore , e questa , come si è detto per il sole (303) .

318. Conoscendo l' ascensione retta , e la declinazione d' un astro , colla trigonometria sferica si troverà la longitudine e la latitudine ; ma per l' uso dei seni bisogna guardare di prendere talora , in luogo dell' ascensione retta data , la distanza dall' equinozio più vicino (305) . Sia A E (fig. 25) l' ascensione retta d' un astro qualunque ; la sua distanza dall' equinozio più prossimo , contata sull' equatore , e minor di 90° ; A S la declinazione dell' astro , E C l' ecclittica , S B la latitudine cercata , e misurata per un arco perpendicolare all' ecclittica ; E B la longitudine , o la distanza dall' equinozio prossimo contata sull' ecclittica : s' immagini un cerchio massimo E S , che passi per il punto equinoziale più vicino , e per la stella , per formar un triangolo sferico S A E , rettangolo in A , coll' ascensione retta , e la declinazione dell' astro ; ed un altro triangolo sferico S B E , rettangolo in B , colla longitudine , e la latitudine . Si risolverà prima il triangolo S A E , in cui , oltre l' angolo retto in A , sono cogniti due lati A S , A E ; e si troverà l' angolo S E A , coll' ipotenusa S E ; per mezzo dell' angolo S E A ora trovato , e B E A (che è l' obliquità dell' ecclittica di $23^{\circ} \frac{1}{2}$ o meglio determinata per quell' anno) si conoscerà l' angolo S E B , che è la differenza loro , se il punto S , ed il punto B sono dall' istessa parte dell' equatore , ma che sarà la somma , se uno sia da una parte , l' altro dall' altra dell' equatore come nella fig. 26 . Formato l' angolo S E B coll' ipotenusa S E , e l' angolo retto B , si troverà la longitudine E B , e la latitudine B S d' una stella rapportata all' ecclittica . Così si sono formati i cataloghi delle stelle , nei quali sono marcate le longitudini e le latitudini di tutte , in segni , gradi , minuti , e secondi : i più considerabili sono il Catalogo Britannico di Flamsteed , e quello delle stelle australi del De la Caille . Nell' atto poi che si calcola la longitudine d' una stella , facile è il calcolare l' angolo di posizione B S A , o B S P , formato dal cerchio di latitudine B S , e dal cerchio di declinazione S A . Si troverebbe egualmente per la figura 27 supponendo B Z sia il colaro dei solstizj , P il polo del mondo , Z il polo dell' ecclittica , l' angolo P il complemento dell' ascensione retta , l' angolo Z il complemento

mento della longitudine, PS il complemento della declinazione, ZS il complemento della latitudine: si possono prendere tre qualunque di queste cose per trovar l'angolo di posizione PSZ.

319. Quando si furono così determinate le posizioni delle stelle, non si tardò molto ad accorgersi, che le loro longitudini poco a poco crescevano. Ipparco di Rodi, il più celebre tra gli astronomi antichi, 120 anni avanti l'era volgare, riconobbe, che le longitudini delle stelle, rapporto agli equinozi, erano maggiori di quello portavano le osservazioni di Timocari e d'Aristillo, 294 anni avanti G. C. e la sfera d'Eudossio, che ha scritto 400 anni avanti G. C. ma aveva preso la descrizione delle stelle da secoli più rimoti. Al giorno d'oggi il cambiamento delle stelle in longitudine è troppo sensibile, confrontando il catalogo di Tolomeo coi nostri, e le osservazioni ch'ei riferisce con quelle che facciamo noi. La spica della vergine, secondo le osservazioni d'Ipparco 228 anni avanti G. C. precedeva di 6 gradi l'equinozio d'autunno; vale a dire, che la sua longitudine era di $5^{\circ} 24' 0''$ ma ella si trova nel 1750 di $6^{\circ} 20' 21''$.

La differenza in aumento è di $2^{\circ} 26' 21''$.
320. Dopo un gran numero di simili comparazioni io trovo che questo cambiamento delle stelle, che si dice la *precessione degli equinozi* è di $1^{\circ} 23' 10''$ per secolo, e che la rivoluzione totale delle stelle (o piuttosto quella degli equinozi rapporto alle stelle e contro l'ordine de' segni) si compie in 25972 anni. Questa quantità non è perfettamente uniforme, e vi si trova qualche differenza d'un secolo all'altro. (758.)

321. Le stelle non essendo sempre nella medesima distanza dagli equinozi ed allontanandosi ogni anno $50''$, il sole non ritorna alle stesse stelle se non 20 minuti di tempo più tardi che agli equinozi, poichè ci vuole il tempo di $20''$ per correre $50''$ di grado. Questo ritardo è ciò che si chiama l'*anno siderico*, e la sua durata è di $365^{\circ} 6' 9'' 11''$, quando il ritorno delle stagioni, che si chiama anche l'*anno tropico*, non è che di $365^{\circ} 5' 48' 45'' \frac{1}{2}$; per formare l'anno civile si adopra quest'anno tropico, e si anno gli anni di 365 giorni, talvolta di 366.

Metodo delle altezze corrispondenti.

322. Poichè le differenze d'ascensione retta sono il fondamento del metodo, col quale abbiamo determinato i luoghi del sole, e delle stelle fisse (316), egli è necessario di spiegar qui il metodo il più naturale ed il più esatto che si abbia per determinare queste differenze d'ascensione retta, o sia i passaggi per il meridiano di due astri, che vuol dire, il momento, in cui ciascun dei due astri è passato per il meridiano. Si è veduto all'occasione del metodo di disegnare una meridiana (155), che gli astri sono egualmente elevati un'ora avanti che passino per il meridiano, come un'ora dopo. Perciò per aver rigorosamente il tempo,

po, in cui un astro è passato per il meridiano, basta osservare col mezzo d'un orologio a pendolo, il momento, in cui s'è trovato ad una certa altezza verso levante ascendendo e avanti che passi per il meridiano, ed osservar dopo, il momento in cui si trova alla medesima altezza discendendo verso ponente, dopo il suo passaggio per il meridiano: il mezzo tra questi due istanti dell'orologio, farà il tempo che l'orologio mostrava, quando l'astro fu nel meridiano.

323. Supponiamo, che il lembo del sole sia stato osservato alla mattina col quadrante che or ora si descriverà, e che si sia trovata la sua altezza di 21° , l'orologio mostrando $8^h 50' 10''$; supponiamo che molte ore dopo, il sole essendo passato per il meridiano, si ritrovi ancora la sua altezza di 21° verso ponente, nel momento, che l'orologio mostrava $2^h 50' 30''$: bisogna sapere quanto tempo è scorso tra $8^h 50' 10''$ della mattina, e $2^h 50' 30''$ della sera; si prenderà il mezzo di questo intervallo, e questo farà il momento del mezzodì sull'orologio adoprato, sia che corrispondesse, o no; all'ora del cielo; purchè il suo moto sia regolare.

324. Per prendere il mezzo tra questi due istanti, basta con una regola della più semplice aritmetica sommare insieme questi due numeri, e prender la metà della somma; ma in vece di 2 ore dopo mezzodì bisogna scrivere 14 ore, perchè si suppone, che l'orologio abbia marcato l'ore di seguito nell'ordine naturale da 8 fino 14, quando in fatto, e nell'uso finite le 12, comincia a segnare 1, 2 ec. Questa irregolarità dell'orologio si regola come s'è detto.

Ora, in cui il lembo del sole era a 21° , la mattina, $8^h 50' 10''$.
Ora, in cui il lembo era a 21° , nella sera, $2^h 50' 30''$.

Somma dei due numeri $23^h 40' 40''$.

Metà della somma $11^h 50' 20''$.

Perciò quando il sole era nel meridiano nella maggior altezza, in distanza eguale dalle due altezze eguali osservate, l'orologio mostrava $11^h 50' 20''$, e ritardava $9' 40''$ dal sole. Gli astronomi s'inquietano poco, che i loro orologi avanzino, o ritardino, purchè conoscano esattamente la quantità dell'avanzo, o del ritardo, e la conoscono sempre col metodo precedente. Questa operazione non ha bisogno d'esser dimostrata. Si vede affai, che da $8^h 50' 10''$ fin a $11^h 50' 20''$, vi sono $3^h 0' 10''$ d'intervallo, e che il medesimo intervallo v'è tra $11^h 50' 20''$, e $2^h 50' 30''$ della sera.

325. Gli astronomi non si contentano ordinariamente, per determinar l'istante del mezzodì, di prender una sola altezza la mattina, ed una la sera: ne prendono 8, 10 la mattina, ed altrettante la sera nel medesimo lembo, superiore, o inferiore del sole, e nei medesimi gradi corrispondenti; paragonano ciascuna altezza della mattina colla corrispondente della sera, e si anno tanti risultati differenti quante sono state le altezze differenti paragonate. Se si avesse operato rigorosamente bene in tutte, si troverebbe per ciascuno lo stesso risultato; ma è raro, che non vi sia diffe-

differenza d'un secondo; allora si prende il mezzo di tutti i risultati sommati insieme, e divisa la somma per il numero d'essi, se non ve ne sia alcuno di troppo esorbitante.

326. La precedente operazione suppone, che il sole abbia descritto la mattina e la sera un solo e stesso parallelo, che l'arco ascendente sia stato eguale all'arco discendente, cioè che dopo ore 9 della mattina, sino a 3 ore della sera, sia stato egualmente distante dall'equatore, affinché il suo angolo orario (301) sia stato l'istesso nell'istessa altezza avanti e dopo. Questa supposizione per tanto non è rigorosamente esatta, perchè il sole describendo ogni giorno obliquamente nell'eclittica un arco d'intorno 1 grado, s'accosta o s'allontana necessariamente dall'equatore, e la quantità talora arriva a 1 minuto di grado per ora.

327. S'è veduto (119) che l'arco diurno del parallelo che un astro descrive nella sfera obliqua, è tanto maggiore, quanto l'astro è più vicino al polo elevato, il settentrionale rapporto a noi; l'istesso è dell'arco *semidiurno*, compreso tra il meridiano e l'orizzonte. Se il sole tramontando è più vicino al polo che non era levando, l'arco semidiurno della sera è maggiore dell'arco semidiurno della mattina, vale a dire, che il tempo dal mezzodì al tramontare su più lungo di quello dal levare al mezzodì: perciò il vero mezzodì non su a distanza uguale tra il levare e il tramontare, e prendendo il mezzo tra il levare ed il tramontare del sole, non si ha il giusto momento del mezzodì: tanto farebbe sommare i due archi disuguali, e prenderne la metà. Se uno dei due numeri fosse maggior dell'altro di 40", la metà della somma sarà maggiore di 20" del primo numero, e nel risultato si avranno 20" di troppo; bisognerebbe dunque levar 20" (nel caso che il sole si sia avvicinato al polo elevato) dalla metà della somma, o dal mezzo trovato tra il levare ed il tramontare, per avere il momento del vero mezzodì. Il mezzo preso tra i due istanti è ben in mezzo tra i momenti del levare e del tramontare, ma non già il meridiano, il quale è più vicino al sole che leva, che al sole che tramonta. In questo caso; il sole dunque è arrivato al meridiano più presto, che non sia giunto al mezzo dei due momenti del levare e del tramontare; bisogna dunque sottrarre qualche cosa da questo mezzo, per aver il momento del vero mezzodì.

328. Quanto s'è detto del levare, e del tramontare del sole, è da dirsi a proporzione di qualunque altezza per esempio di 31°; il tempo, che il sole impiegherà per passare da un parallelo all'orizzonte, alto 21°, sino al meridiano, sarà minore del tempo che impiegherà dopo dal meridiano ad arrivare a questo parallelo a ponente, se il sole s'è accostato al polo elevato; di tanto l'angolo orario della sera sarà cresciuto; bisognerà sottrarre come si è detto qualche cosa dal mezzo tra i due tempi di queste due altezze eguali. Il contrario poi si dovrà fare, se il sole in vece d'accostarsi al polo elevato dalla mattina alla sera, se ne sia scostato, e bisognerà in vece aggiungere qualche cosa all'istante del mezzo per aver quello del mezzodì.

329. Sia P il polo elevato (fig. 27), Z il zenit, S il sole, HO l'oriz-

orizzonte, AS BC un parallelo all'orizzonte, di modo che i punti B ed S sieno all'istessa altezza; PS sia la distanza del sole dal polo alla mattina, PB la distanza dal polo diventata più piccola alla sera. Nel momento, in cui il sole sarà pervenuto alla sera nel punto B, che suppongo alto 21° come la mattina, l'angolo orario della sera ZPB, cioè la distanza del sole e del suo cerchio orario PB dal meridiano PZA, sarà maggiore dell'angolo orario della mattina ZPS; dunque si anno due triangoli ZPS, ZPB, che anno ciascuno il lato comune PZ, e i lati eguali ZS, ZB, ambedue di 69° , essendo complementi di 21° , d'altezza; i due lati PS, PB differiscono della quantità, cui s'è cambiata la declinazione del sole nell'intervallo delle due altezze; risolvendo separatamente questi due triangoli, si troveranno differenti i due angoli orari ZPS, ZPB; la metà della loro differenza, ridotta in tempo a ragione di 15° per ora, farà la correzione da farsi al tempo del mezzo tra le due altezze eguali, per aver il vero istante del mezzodì.

330. Per esempio, nel principio di Marzo, tempo in cui il sole cangia declinazione $22^{\circ} 33'$ per giorno, se si prendono delle altezze a 9 ore della mattina, e a 3 ore della sera, si troveranno $20'$ da levare dall'ora trovata coll'alttezze corrispondenti. Vi sono delle formole per trovare quella equazione del mezzodì senza risolvere i due triangoli; ma basta aver indicato il metodo più facile da comprendere.

Descrizione del quadrante mobile.

331. Il principale istromento d'astronomia che serve per le altezze corrispondenti delle quali abbiamo parlato, è il *quadrante mobile*: questo tra tutti i nostri istromenti è quello, il cui uso è il più antico, il più generale, il più indispensabile, il più comodo: perciò ne darò la descrizione: già s'è veduto la maniera di concepir l'uso del quadrante per misurare le altezze (23). Ora resta solo di descrivere in dettaglio l'istromento condotto alla sua ultima perfezione.

Suppongo un quadrante di 3 piedi di raggio CBA (fig. 33 Tav. III.): il lembo, che forma la circonferenza ADB è legato con il centro C per via di tre verghe di ferro CA, CD, CB, larghe due pollici, fortificate ciascuna per di dietro da un regolo in taglio, che loro impedisce di piegarsi. Verso il centro di gravità X della massa intiera del quadrante, è fissato un asse, o cilindro grosso due pollici, lungo sei, perpendicolare al piano dell'istromento; questo cilindro entra in un tubo, o cilindro vuoto E rappresentato seperatamente in EE (fig. 37); questo pezzo, che si chiama il *ginocchio*, è composto non solo d'un tubo orizzontale E, ma d'un altro cilindro e, che porta il tubo d'un pezzo solo di getto, e fuo col tubo istesso, che si pone verticalmente in n sul piede dell'istromento che si vede di sotto, sul quale gira liberamente. Per impedire, che il quadrante non si muova fuori di luogo dietro il cannone E (fig. 33) si pone una placa di ferro, che copre tutto, e che viene fermata da una forte vite,

vite; che penetra nell'asse del quadrante e che gira coll'asse istesso solamente, impedendoli d'uscire dal canale.

Il doppio ginocchio rappresentato in TSV (fig. 37.) non serve, se non nei casi, nei quali si voglia porre il quadrante orizzontalmente, o inclinarlo all'orizzonte, per prender degli angoli sul terreno.

Vi sono delle viti di pressione sopra il canale orizzontale E, ed a fianco del canale verticale F, come si vede nella Figura, con le quali si preme il cannone sopra il cilindro quando si vuol fissare il quadrante ad un'altezza data, o in un dato verticale; ed impedirli di girare.

332. Verso uno de' raggi CB del quadrante si fissa un cannocchiale MG; serve questo di traguardo, e fu un'importante scoperta, che fece l'Abbate Picard nel 1667. Questo cannocchiale passa in un tubo d'ottone in G fissato con delle sponde, ove per mezzo di forti viti resta attaccato fermamente al corpo dell'istromento. All'altra estremità M sta la cassetta del micrometro, fissata anche essa per li suoi sporti. Rispetto al tubo del cannocchiale, che s'estende da M in G non importa di qual maniera sia fatto, perchè non serve se non a dar dell'oscurità al cannocchiale: ma la posizione dei due pezzi G, M, che portano le lenti del cannocchiale, è essenziale, perchè la loro solidità assicura l'asse ottico del cannocchiale medesimo, che deve essere esattamente parallelo al piano dell'istromento, e al primo raggio che passa per il punto B di 90°.

333. Nel centro C dell'istromento sta un cilindro d'ottone, esattamente tornito, che nel suo centro deve avere un delicatissimo e finissimo punto. In questo punto si mette la punta d'un ago, in cui si fa passare l'asola del filo a piombo. Questo pezzo si vede separatamente nella fig. 34, col cilindro AA; e l'ago posto nel centro, portato da un pezzo d'acciajo a curvato, e trasformato a traverso il quale passa l'ago per penetrare nel centro del cilindro. Quando l'ago è ben posto si ferra bene con una vite che si vede sopra di *a*, intorno l'ago *a* si fa un'asola, o bucola, con un capello o fil d'argento finissimo. A questa bucola posta in faccia del cilindro si sospende il filo a piombo, caricato d'un peso come si vede in *q* (fig. 33); questo filo sulla divisione del lembo mostra il grado di altezza, a cui è diretto il cannocchiale MG.

L'estremità del cilindro AA (fig. 34) che porta il punto di centro, e la punta d'ago, deve essere un poco rotundata, o convessa, perchè il filo non abbia mai a provare resistenza, o sfregamento. In vece dell'ago *a* si può porre una vite, che termina in una punta finissima, e che giri nel pezzo *a*, come in una spezie di ponte.

334. Intorno del cilindro, che porta il centro del quadrante, si mette una lastra d'ottone più larga, rotonda, e fissata sul corpo dell'istromento. Su questo pezzo è sospeso il guarda piombo CH (fig. 33); è questa una cassetta lunga d'ottone, sottile, sostenuta verso il centro, intorno il quale gira liberamente, per mettersi sempre a piombo, e contenere e difender dal vento il filo a piombo, o capello, che pende dal centro, per mostrare i gradi. Questo guarda-piombo ha una lunga porta, che si chiude con due uncini, per garantire meglio il filo dall'agitazione dell'aria;

ve-

vedesi aperta a sinistra. Nella parte inferiore H, tiene una cassetta più larga, nella quale alcuni astronomi pongono un vaso d'acqua, in cui s'immerge il piombo, affine che la resistenza dell'acqua tolga, o abbrevi le oscillazioni. Questa cassetta inferiore ha una porta, o finestra Z, in cui sta attaccata una lente, o microscopio, e una lampana con due micie; la lampana serve ad illuminare il lembo, e il filo a piombo, per vedere su qual grado casca; il microscopio serve a ingrossare i punti, per metter facilmente ed esattamente il filo del quadrante sul punto che si vuole.

335. L'asta di richiamo LKI si adopra per far girare il quadrante, e mettere il filo sul punto del lembo, che si vuole; si vede rappresentata separatamente in IL (fig. 35 36, che ne fanno una sola) con tutte le sue parti; e bisogna supporre che la parte L (fig. 35) sta collocata in continuazione della parte I (fig. 36). La riga o asta interna ha tre piedi di lunghezza, ed è inserita per li due capi nelle bussole di ottone I, L. Quando quest'asta è fissata a un dato sito in I (fig. 33) per mezzo della vite c, che non la lascia scorrere nel braccio I, fissato anch'esso all'albero dell'istrumento, l'estremità inferiore serve di punto d'appoggio: allora girando nella parte superiore la vite femmina in B, si fa muovere la bussola L (fissata per una mascella o morfa r dietro il quadrante al regolo del lembo per via d'un cavicchio che traversa la morfa, ed il regolo) facendo muover così la bussola L, si fa avanzare il quadrante giù per l'asta.

336. La maniera, con cui la vite femmina è tenuta sulla bussola L, si vede nella fig. 35. Questa bussola è scavata in alto; e nella base superiore è fatta una scannellatura, in cui gira la vite, ritenuta per mezzo d'un colletto, o solamente per esser ritorta dentro, e di sotto. Questa vite, che necessariamente tiene alla bussola, avanza quando si gira sul maschio vite B, che è all'estremità dell'asta, essendo questa fissata nell'estremità inferiore. La vite così fa avanzare il quadrante, obbligato a seguire la bussola L, fissata per la parte r sull'istrumento. Così si opera per dare un più lungo tratto di moto all'istrumento.

337. Per li piccioli moti, ben fermato tutto alla parte superiore B, si fa muover la parte inferiore. Perciò all'estremità inferiore I dell'asta si applica un moto simile affine che l'osservatore occupato a guardare il filo a piombo in q, possa far girare il quadrante per poco spazio, volendo porre il filo esattamente su quel punto della divisione che più s'avvicina all'altezza dell'astro che si vuol osservare. A tal fine la bussola I (fig. 36) è fissata ed unita ad una zanca, o pezzo di ferro angolato f, che passa in un'altra bussola g; e che si termina in una vite m maschio e femmina, che gira, e perciò fa avanzare la verga; poichè girando la vite madre m da una parte, si fa avanzare il braccio o la verga f colla bussola I, in cui è ben serrata l'asta colla vite c; con ciò si muove tutto il quadrante.

338. Il piede ON del quadrante è un albero di ferro, grosso 2 pollici, lungo 3 piedi e mezzo, che termina in quadrato al basso; passando

L

per

per le traverse del piede PP, e fermato di sotto colla chiave Q; questa chiave si ferra a colpi di martello quando l'albero è passato di sopra per li contraforti RR, ciò che fa che si stringa ad essi, e formi un'unione ferma ed invariabile tra l'arco, e i contraforti RR, e le traverse PP.

339. Per livellare l'istromento s'impiegano le quattro viti all'estremità delle traverse del piede PP, che sono di ottone d'un pollice di diametro: servono a sostenere il piede dell'istromento, ad inclinarlo, a render l'albero ON esattamente verticale, perchè girando l'istromento resti sempre il suo piano verticale, almeno sensibilmente. Le quattro viti non terminano in punta, ma in conchette di ferro, che per la maggior base stanno più ferme.

340. Il cerchio azimutale *pb* ha 6 pollici di diametro: è fissato in una canna d'ottone, attaccata nell'albero. Il cannone F del ginocchio descritto da principio (EE e, fig. 37) porta un'alidada, o raggio *k*, che gira con il quadrante sopra il cerchio azimutale fisso, e così mostra il grado di azimuto, o il punto d'orizzonte, al quale è diretto il piano del quadrante, a cui il raggio deve esser parallelo.

341. Il lembo ADB del quadrante è la parte più essenziale; ha due pollici di larghezza, 4 linee di grossezza, ed è formato da due lamine, una sopra l'altra, l'una di ferro di sotto, l'altra di sopra di ottone; e questa, in cui devono esser le divisioni, deve esser ben liscia, e pulita, affine che tutte le sue parti si trovino in un solo e istesso piano col centro. Per pervenire a questa operazione difficile, bisogna far girare una riga ben retta intorno un asse ben disposto, e vedere se l'estremità della riga si trova sempre egualmente vicina al lembo in tutti i suoi punti. Per conoscere, se il lembo d'un istromento è in un solo e istesso piano, postolo orizzontale si può circondare con un canale d'acqua, che parte dal centro e tocca la circonferenza: in quest'acqua, che è sempre orizzontale, si fa nuotare una barchetta, che per l'albero porta un filo di ferro incurvato, che toccando quasi tanto il centro, che il lembo, colla sua distanza in diversi punti indica, se tutti sono nell'istesso piano orizzontale: questo è anche il modo di livellare le grandi meridiane.

342. Le divisioni più ordinarie del lembo consistono in finissimi punti, segnati di 10 in 10 minuti, ma che nella figura non sono che di 3 in 3 gradi. Il filo del micrometro M, supplisce per li minuti intermedj. Quando non si ha micrometro, si divide il lembo in minuti per via di trasversali come nella fig. 38. Tav. II. l'arco AB, e l'arco CD, essendo ciascuno di 10 minuti, e la linea AC divisa in 10 parti uguali tirando una trasversale AD, con 10 cerchi concentrici nell'intervallo AC, il filo a piombo AC, mostrerà un minuto, 6 minuti ec. secondo che cascherà sulla prima intersezione *a*, o sulla sesta *f*.

343. In Inghilterra i quadranti si tengono fermi, e in vece del quadrante, si fa girare l'alidada, o il cannocchiale, come nel quadrante murale, fisso nel muro. Allora basta un filo a piombo sull'ultimo punto della divisione, parallelo al raggio verticale di 90°; talora in vece di piom-

piombo s'adopra un livello, che è ancora più comodo, purchè sia ben fatto. In un tal quadrante bisogna impiegare la divisione del Nonio, o sia del Verniero.

344. Questa divisione fu immaginata nel 1631 ad imitazione d'un'altra divisione insegnata dal Nonio nel 1542. L'autore ne fu *Pietro Vernier*, di cui si dà il nome a questa parte de' nostri istromenti: è il Verniero un'alidada, o pezzo di ottone AB (fig. 39), che scorre sul lembo del quadrante, e di cui le divisioni in numeri pari corrispondono a un numero impari della divisione del lembo: se il Verniero è diviso in 20 parti uguali, si porrà sotto una porzione di parti 21 nel quadrante; e con ciò dividerà ciascuna di queste in 20 parti. Di fatto, se si avvanza l'alidada d'un ventesimo della divisione, si vedrà concorrer la seconda divisione del Verniero con una divisione del lembo; e se sia la terza che concorre, sarà segno, che l'alidada è avanzata di 2 parti, o di 2 ventesimi della divisione.

Della misura del Tempo.

345. Il sole, come quello che è il più illustre oggetto dell'universo, è stato preso in tutti i secoli, e appresso tutti i popoli del mondo, per la misura naturale del tempo. I giorni marcati dalle sue apparizioni, sono state le prime porzioni di tempo che s'ensi contate; in seguito i mesi lunari, in fine gli anni solari anno servito a contare i tempi rimoti, come le ore sono state introdotte per suddividere i giorni, ed esprimere piccoli intervalli di tempo.

Tutti questi intervalli sono supposti prima uguali tra loro: le 24 ore del giorno sono 24 intervalli uguali, le ore d'oggi devono esser eguali a quelle di jeri, e il moto diurno del Sole intorno la terra, che si divide in 24 parti uguali, deve esser supposto uniforme per formare tutti i giorni 24 parti uguali, ciascuna delle quali corrisponde a 15° dell'equatore, o d'un angolo pari al polo (202°). Questo cambiamento diurno è prodotto, come si farà vedere qui dopo, dalla rotazione della terra intorno il suo asse, rotazione supposta uniforme, perchè non s'è ancora scoperto fenomeno, che possa dinotare qualche inegualità, e si suppone egualissima, tanto per il tempo in cui siamo, che per li secoli passati.

346. Il sole col suo moto proprio da occidente in oriente avvanza tutti i giorni in circa un grado, o $59' 8''$, rispetto alle stelle fisse (61.307): perciò quando una stella, che era passata per il meridiano con il sole, sembra aver fatto il giro del cielo, ed esser ritornata al meridiano il giorno seguente, il sole non v'è ancora giunto per esser rimasto addietro un grado verso levante; e perchè ricerca 4 minuti di tempo per percorrere un grado di moto diurno (202), il sole passerà per il meridiano 4' più tardi che la stella, o la stella 4' più presto del sole: il sole essendo il principale, si contano le 24^h con esso; e perciò si dirà, che le stelle ritornano all'istesso meridiano in 23^h 56'. Gli orologi a pendolo, per compendio detti *Pendoli*, usati nella società, e regolati sul moto me-

dio del sole, marcano le ore solari medie, che vuol dire, a capo d'un anno si trovano d'accordo con il sole, come lo erano al principio; e in ogni giorno mostrano $23^h 56'$ per l'intervallo tra due prossimi passaggi d'una stella per il meridiano. Gli astronomi per lo più regolano i loro penduli in questo modo, per indicare presso poco l'ora che è, per gli usi della società, e dare presso poco il tempo vero delle differenti osservazioni che anno da fare. E pure le stelle essendo sisse intanto che il sole sembra avanzare ogni giorno d'un grado, più o meno, il ritorno d'una stella al meridiano farebbe una misura più fissa, e più uguale che il ritorno del sole: il ritorno della stella indica l'intero moto della sfera, e la rotazione completa della terra: perciò qualche astronomo celebre, come il Sig. de l'Isle, il Sig. de la Caille, regolavano i loro orologi sulle stelle, e per ciò li facevano avanzare di $4'$ ogni giorno sopra il sole. Trovavano in ciò un vantaggio, ed è, che quando era scorsa un'ora su questo orologio, era sicuro, che erano passati per il meridiano 15^o della sfera stellata: così si anno le differenze d'ascensione retta tra gli astri, che s'osservano, convertendo a ragion di 15^o per ora, i tempi osservati tra i loro passaggi. Chiamasi questo il *tempo del primo mobile*, di cui un'ora, fa sempre 15^o del cielo, che si chiamava il *Primo Mobile*.

347. Le ore solari sono più lunghe dell'ore del primo mobile: perchè il sole impiega $4'$ di più, che una stella, a ritornare al meridiano. Parliamo prima dell'ore solari medie, cioè di quella che il sole indica facendo astrazione dalle disuguaglianze del suo moto (308): parleremo poi delle ore solari vere (362).

348. Le 24 ore del sole corrispondono a $360^o 59' 8''$, poichè in questo intervallo ritorna al meridiano non solo la stella, che compie 360^o , ma il sole stesso che era indietro $59' 8''$. Un orologio regolato a questo modo non indica più 15^o per ora, ma $15^o 2' 8''$ che è la vigesima quarta parte di $360^o 59' 8''$, e così dell'altre parti del tempo: questo è ciò, che si chiama *convertir le ore solari medie in gradi*; Inserviente a questo oggetto si trova una tavola nella *Connoissance des temps* di ciascun anno, ed è di un uso continuo per gli astronomi, gli orologi de' quali seguono le ore solari medie; perchè osservano la differenza d'ascensione retta da un astro all'altro prendendo per ciascun' ora del loro orologio $15^o 2' 8''$ della sfera stellata.

349. Gli orologi regolati sull'ore del primo mobile, che seguono il moto diurno delle stelle, o la vera rotazione della terra (346) avanzano ogni giorno di $3' 56''$, al mezzodì medio, sul moto medio del sole, e non marcano mai l'ora del sole se non nel giorno dell'equinozio. Vi è un vantaggio in questo metodo di regolare un orologio; le stelle passano ogni giorno all'istessa ora per il meridiano, in luogo che sugli orologi regolati al sole ritardano ogni giorno $3' 56''$: e ciò procura una gran facilità per quelli che osservano molte stelle, di vedere in un'occhiata sull'orologio l'ascensione retta della stella che sta per passare; ma vi è anche un inconveniente, di dover fare una regola del tre per sapere

pare il tempo vero d'ogni osservazione, e per prepararsi ad osservare il passaggio del sole, e d'ogni pianeta per il meridiano.

350. L'accelerazione diurna delle stelle fisse è la quantità, per cui una stella precede ogni giorno il sole, contata in tempo solare medio; nell'istante che la stella passa per il meridiano; la quantità, che manca al passaggio del Sole per il meridiano, o per scorrere $59' 8''$, che rimane addietro a levante rapporto alla stella, in 24 ore solari medie; quest'accelerazione si trova facendo questa proporzione: $360^\circ : 59' 8'' \frac{1}{2}$ sono a, 24^h , come 360° a $23^h 56' 4''$, 098 (maniera di scrivere le decimali de' secondi) tempo, che la stella impiega a scorrere 360° . Per andare a 24^h vi vogliono $3' 55''$, 902, e questa è l'accelerazione delle stelle. Li $59' 8''$ impiegati per il moto diurno del sole sono di $0''$, 1264 meno del moto diurno, che s'impiega nelle tavole astronomiche di $59' 8''$, 3305, rapporto agli equinozi; perchè nel calcolo dell'accelerazione si adopra il moto rapporto alle stelle, che è minore, essendo solo la differenza tra il moto del sole, e quello delle stelle (330).

351. L'orologio regolato sulle stelle fisse, o sul primo mobile, marca sempre $0^h 0'$ nel momento che l'equinozio passa per il meridiano, e mostra sempre l'ascension retta del punto culminante (177) ridotta in tempo a ragione di 15° per ora; perciò nel momento che il sole è sul meridiano, l'orologio delle stelle mostra l'ascensione retta del sole in tempo, e per sapere qual ora mostrerà ciascun giorno a mezzodì, basta convertire in tempo l'ascension retta del sole per quel giorno. Nella *Connaissance des temps* si trova ogni anno una colonna col titolo, *distanza dell'equinozio dal sole*, che non è se non il complemento a 24 ore dell'ascension retta del sole. Per quelli dunque che avranno questo libro alla mano, basterà prender ciascun giorno il complemento a 24 ore della detta distanza dell'equinozio dal sole, e sarà questa l'ora dell'orologio a mezzodì. Così, il primo di Gennaio, la distanza dell'equinozio è $5^h 11'$ (233), il complemento è $18^h 49'$; questa è l'ora, che l'orologio deve mostrare a mezzodì, o piuttosto nell'uso comune $6^h 49'$.

352. Le ore solari vere differiscono pure dalle ore solari medie; ma la differenza non va mai oltre li 30 secondi; se ne parlerà dopo di avere spiegato la differenza che passa tra il tempo medio ed il tempo vero (362).

Trovare il tempo vero d'una osservazione.

353. Trovata l'ora del mezzodì per via dell'altezze corrispondenti del sole (332), si avrà facilmente l'ora vera d'ogni altra osservazione. Suppongo, che con tal metodo siasi trovato, che al primo Gennaio un orologio a mezzodì mostrasse $0^h 3' 57''$, e che ai 2 mostrasse a mezzodì pure $0^h 4' 45''$, vale a dire, $48''$ di più che il giorno avanti: si vede, che l'orologio avanzava sopra il sole $48''$ per giorno, facendo 24^h e $48''$, mentre doveva fare 24^h giuste rispetto al tempo vero. Supponiamo ora, che

che siasi osservato la sera un fenomeno celeste, per esempio, il principio d'un'eclisse, mentre l'orologio mostrava $9^h 30' 57''$: si cerca, qual sia il tempo vero, che corrisponde a quest'ora dell'orologio. Si prende tosto, sottraendo, la differenza tra $0^h 3' 57''$, e $9^h 30' 57''$, e si trova che l'eclisse cominciò $9^h 27'$ dopo il mezzodì dell'orologio. Ma perchè l'orologio avanza $48''$ per giorno, si farà questa regola del tre: $24^h 0' 48''$ sono a $48''$, come $9^h 27' 0''$, intervallo tra l'ora dell'osservazione e il mezzodì dell'orologio, sono a $19''$, che è la quantità di cui l'orologio dovette avanzare tra il mezzodì e l'osservazione. Si aggiunge: anno questi $19''$ a $0^h 3' 57''$, ora del mezzodì nell'orologio, perchè va avanzando, e si avrà $0^h 4' 16''$, quantità per cui l'orologio avanzava all'ora dell'osservazione; e tanto conviene sottrarre dall'ora, che mostrava al momento dell'osservazione, che era $9^h 30' 57''$; resta $9^h 26' 41''$, per il tempo vero cercato.

354. Egli è indifferente per gli astronomi, che l'orologio sia d'accordo, o no, coll'ora del sole, che le ore sieno più lunghe, o più corte; col metodo indicato si trova in ogni caso la quantità, per cui l'orologio avanza, o ritarda, al momento dell'osservazione, nè gli astronomi cercano altro. Quel che si suppone necessariamente in questo calcolo, è l'uniformità del moto dell'orologio: se in 24 ore avanza $48''$, bisogna che in 12 ore avanzi $24''$, senza di che non vi sarebbe uniformità e il suo moto non potrebbe servire per misurare il moto diurno degli astri, che è uniforme, o almeno supposto tale (345).

Dell'equazione del tempo.

355. Sin ora s'è parlato del tempo vero, o del tempo apparente, che noi osserviamo per via dell'altezze corrispondenti, del tempo marcato dal sole sulle meridiane, e su gli orologi solari, che s'impiega nei differenti usi della società non meno, che in astronomia. S'è supposto, che il sole ritorna al meridiano a capo di 24^h , e che impiega l'istesso tempo da un mezzodì al seguente, e da questo al terzo; gli astronomi antichi per gran tempo dovettero così supporre. Ma osservando meglio si rimarcò, che il sole non aveva moto uniforme (308), e che il tempo vero misurato da questo moto ineguale non poteva essere regolare ed eguale. Però il sole a parlar propriamente non è una giusta misura del tempo, e l'ora che mostra, non può servire a misurare una cosa, di cui l'essenza è l'egualità. Non ostante perchè il tempo vero ha il vantaggio di poter essere osservato ad ogni momento, s'adopra per trovar poi un tempo medio, ed uniforme per li calcoli.

356. Il tempo medio, o uguale, è quello che ad ogni istante mostrerebbe un orologio assolutamente perfetto, che nel corso d'un anno continuasse a muoversi senza alcuna inegualità, mostrando mezzodì il primo e l'ultimo giorno dell'anno nel momento che il sole si trova nel meridiano. Tale orologio non ha potuto egualmente mostrare mezzodì col sole negli altri giorni, poichè per ciò il sole dovrebbe aver avuto tutti i giorni l'istessa

istessa velocità, il che non è (308) ; quando il sole parte dal meridiano, e vi ritorna il giorno seguente, ha descritto 360° in apparenza, ma realmente ha percorso non solo i 360° , che fanno una rivoluzione intera del cielo stellato, ma ancora un grado di più, per cui nell' intervallo da un mezzodì all' altro, è rimasto indietro dalle stelle fisse (61 346).

357. Affine che i ritorni del sole al meridiano fossero uguali, bisognerebbe, che questo moto proprio del sole verso levante, fosse ogni giorno della stessa quantità, cioè di $59' 8''$; ma a causa dell' inegualità, di cui s' è parlato, succede che al principio di Luglio il sole non fa che $57' 12''$ per giorno verso l' oriente, ed al principio di Gennaio ne fa $61' 11''$, che vuol dire $4'$ di più che nel mese di Luglio, lungo l' ecclittica di moto proprio. Tal è la prima causa, che rende i giorni disuguali; si contano sempre 24 ore da un mezzodì all' altro; ma queste 24 ore sono più lunghe, quando il sole ha da fare $61' 11''$, che quando ha da fare solo $57' 12''$ a levante, perchè bisogna che scorra $4'$ di più di moto diurno avanti d' arrivare al meridiano.

358. A questa prima sorgente, che dipende dall' inegualità del moto solare nell' ecclittica, se ne aggiunge un' altra, che dipende dalla posizione dell' ecclittica: non basta, che il moto proprio del sole nell' ecclittica fosse uguale, per render uguali i giorni; bisogna, che questo moto sia uguale rapporto all' equatore, e al meridiano, ove s' osserva.

359. Sia O il sole (fig. 21), SB il meridiano, a cui deve arrivare il sole quando il punto O farà avanzato, e il punto Q dell' equatore giunto al punto A del meridiano, essendo OQ un cerchio orario che al mezzodì si confonde col meridiano SA: qualunque sia la lunghezza dell' arco SO dell' ecclittica, quest' arco non impiegherà a passare, se non il tempo misurato dall' arco AQ dell' equatore, per esempio se l' arco AQ è d' un grado, l' arco SO, grande, o piccolo, starà $4'$ minuti a traversare il meridiano; ora fa sua posizione obliqua, o inclinata, può render la sua lunghezza OS maggiore o minore di quella dell' arco AQ; la sua distanza ancora dall' equatore può fare che l' arco OS sia minore dell' arco AQ, per esser compreso tra due cerchi di declinazione SA, ed OQ, che vanno ad unirsi nel polo, avendo minor distanza verso O che verso Q; comunque sia, il solo arco AQ dell' equatore regola il tempo impiegato dal sole per andare dal punto O, fino al meridiano S A B.

360. Per combinar insieme queste due cause, che rendono disuguali i ritorni del sole al meridiano, fingiamo un sole medio ed uniforme, che giri di moto proprio nell' equatore, e faccia ogni giorno al moto diurno $59' 8''$ oltre li 360° nell' istesso tempo, che il sole effettivamente fa il suo cerchio col suo moto proprio nello spazio d' un anno, e parta dall' equinozio di primavera nel momento, che la longitudine media del sole è nulla; ogni volta che questo sole medio arriverà al meridiano, si dirà che è mezzodì medio, e se il vero sole si trova più o meno avanzato, allora la differenza si chiamerà equazione del tempo.

361. L' ascensione retta media del sole è marcata dal luogo di questo sole medio, che gira uniformemente nell' equatore; l' ascension retta vera del

del sole, quella cioè, che è marcata dal cerchio di declinazione, che passa per il luogo vero del sole, per le due cagioni precedenti può differire dalla media di 4 gradi, e il sole vero può passare un quarto d'ora più presto, o più tardi, del sole medio; l'equazion del tempo va fino a $16' 10''$, in circa, al primo di Novembre. Segue da questi principi, che la differenza tra l'ascensione retta media del sole, e l'ascensione retta vera, convertita in tempo, dà l'equazione del tempo. Ma l'ascensione retta media è l'istessa, che la longitudine media; perchè l'una e l'altra principia e finisce nell'equinozio, l'una e l'altra è proporzionale al tempo, e cresce ogni giorno di $59' 8''$, perciò l'equazione del tempo è la differenza tra la longitudine media, e l'ascensione retta vera del sole, convertita in tempo. Ma in pratica questa differenza non si può trovare, che per una doppia operazione, e per due principi (357 358.); perciò ha due parti; la prima è la differenza tra la longitudine media e la vera, o sia l'equazion dell'orbita (308 497.) convertita in tempo; la seconda è la differenza tra la longitudine vera, e l'ascensione retta vera, convertita pur in tempo. In tutte le tavole del sole si trovano tavole dell'una, e dell'altra parte.

362. La prima parte, che ha per argomento l'anomalia del sole, o sia la sua distanza dall'apogeo, va fino a $7' 43''$ di tempo, quando il sole è nelle sue distanze medie, a 3, e 9 segni d'anomalia media; questa parte è ogn'anno la stessa, perchè l'equazion del centro è sempre di $10' 51' 31''$, 6; ma il tempo dell'anno in cui cade, non è sempre l'istesso, perchè il sole arriva ogn'anno un poco più tardi al suo apogeo, a cagion del moto progressivo di questo (514).

La seconda parte dell'equazion del tempo, che ha per argomento la longitudine vera del sole, va fino a $9' 53''$, 7, quando il sole è verso $46^\circ \frac{1}{4}$ dagli equinozi. Ma come questa parte dipende dall'obliquità dell'eclittica, che a poco a poco diminuisce, anche essa diminuisce di $0''$, 014 per ogni secondo di diminuzione nell'obliquità dell'eclittica, ciò che fa $1''$ di tempo nello spazio d'anni 71 incirca: è facile assicurarsene calcolando la differenza tra ES, ed EA (fig. 21), essendo ES $46^\circ \frac{1}{4}$; poichè questa differenza è di $2^\circ 28' 24''$, 8, supposto l'angolo E di $23^\circ 28' 20''$, che fa $9' 53''$, 7 di tempo; ma sarà minore, se l'angolo E sia minore.

La combinazione di queste due cause d'equazione, che si aumentano, o si distruggono scambievolmente, forma l'equazione del tempo, che non passa mai $16' 12''$, e che quattro volte all'anno diventa nulla. Questa equazion del tempo, che varia talvolta di $30''$ per giorno, fa che le 24 ore solari vere differiscono dalle 24 ore solari medie, ora in più, ora in meno; le ore solari vere sono più lunghe alla fine di Dicembre, che alla fine di Marzo, di 2 secondi ciascuna.

Del passaggio per il meridiano, del levare e del tramontare degli astri.

363. Il passaggio per il meridiano si calcola per la differenza d' ascensione retta tra il sole e la stella ; se questa differenza è di 15° nel momento, che la stella passa per il meridiano, la stella passa a 1 ora : tal è lo spirito del metodo generale ; si aggiunga qualche riflesso. Da tutte le ascensioni rette, che si trovano nel catalogo delle stelle espresse in gradi, minuti e secondi, convertite che sieno in tempo, sottraendo l' ascension retta del sole, convertita anche essa in tempo, per il giorno dato, si avrà l' ora del passaggio di ciascuna stella per quel giorno. S' è veduto in che consiste la conversion dei gradi in tempo (302).

364. Sia Y (*fig. 29*) l' equinozio di primavera (che io pongo sempre all' occidente, o sia a destra, in tutte le figure), M una stella nel meridiano, YM l' ascension retta della stella in M ; contata da occidente in oriente, o da destra a sinistra, guardando mezzodì ; $Y\odot$ l' ascension retta del sole ; $M\odot$ la loro differenza, o l' ascensione retta della stella meno quella del sole ; questa distanza $M\odot$ del sole dal meridiano, marca sempre l' ora, o il tempo vero (301); la distanza di 15° fa un' ora, di 30° fa due ore ec. La figura fa vedere, che per aver l' ora del passaggio al meridiano, basta sottrarre l' ascension retta del sole per quell' istante da quella della stella. Per evitar le conversioni di tempo in gradi, e di gradi in tempo, gli astronomi sogliono impiegare queste ascensioni rette del sole, e delle stelle, già ridotte in tempo.

365. Si dimanda il passaggio della Lira per il meridiano il primo maggio 1760, contato all' astronomica, che vuol dire, dopo il mezzodì del primo maggio nello spazio di 24 ore. Suppongo l' ascension retta apparente della lira per tal giorno $277^{\circ} 22' 17''$, che convertita in tempo è $18^h 28' 49''$: la distanza dell' equinozio dal sole al mezzodì del primo maggio, cavata dall' efemeridi, o sia il complemento dell' ascension retta del sole, è di $21^h 23' 51''$. Sommo l' ascension retta della Lira colla distanza dell' equinozio ; la somma è di $39^h 53'$; levo 24^h , che fanno un giorno, resta $15^h 53'$ per l' ora cercata. Questa prima regola d' approssimazione potrebbe esser difettosa di $4'$, se la stella passasse a 23^h , per essersi presa la differenza d' ascension retta per il mezzodì, e non per 23^h ore, che era cambiata ; la differenza d' ascensione retta dà il tempo vero per il momento, in cui la stella passa per il meridiano. Questo cambiamento però non è considerabile nello spazio di poche ore ; se non sia per la luna ; in tal caso basta rifar il calcolo, per correggere l' errore del primo.

Si fa talora un' idea poco giusta di questo calcolo : per esempio, si dice, l' equinozio il primo maggio passava per il meridiano a $21^h 24'$; la lira $28^h 29'$ più tardi ; dunque passava ai 2 Maggio a $15^h 53'$. Ciò andrebbe bene, sentuti questi tempi fossero tempi solari veri ; ma come questo tempo solare è troppo ineguale in differenti mesi dell' anno, si

M

pre-

preferisce di convertire le ascensioni rette in tempo del primo mobile ; ed allora non è più esatto il dire , che l'equinozio passava a $21^h 24'$, e la lira a $18^h 29'$; v'è qualche minuscola di differenza ; si leva ogni imbarazzo calcolando la differenza d'ascensione retta per l'ora istessa in cui la stella è nell' meridiano . E' vero , che allora si suppone cognita la cosa stessa che si cerca , cioè l'ora del passaggio ; ma si suppone cognita a presso poco , indi si cerca esattamente ; per conoscerla poi a presso poco non è bisogno di queste cautele , bastando sommare la distanza dell' equinozio dal sole coll' ascensione retta della stella .

366. L'angolo orario d'un astro è l'angolo nel polo , formato dal meridiano , del luogo dell'osservatore , e dal cerchio di declinazione che passa per l'astro ; o sia l'arco d'equatore compreso tra questi due cerchi , ed è la distanza dell'astro dal meridiano . Quest'angolo orario è essenziale nei calcoli astronomici , per trovare l'altezza d'un astro nel momento dato , il suo azimuto , o il suo angolo parallattico . Sia QEM l'equatore (fig. 30) , MCD il meridiano , M il mezzo del cielo , ME l'arco d'equatore , che misura l'angolo orario , o la distanza d'una stella dal meridiano , contabile di seguito per tutti li 360° da oriente in occidente ; QV è l'ascensione retta del sole , QM l'angolo orario del sole misurato dal tempo vero dato ; si sommano per avere YM ascensione retta del mezzo del cielo ; si sottrai l'ascensione retta YE della stella , si avrà l'arco ME , misura dell'angolo orario della stella : d'onde risulta la seguente regola : il tempo vero ridotto in gradi , meno la differenza delle ascensioni rette (quella dell'astro meno quella del sole) farà l'angolo orario dell'astro , contato fino a 24 ore , e da oriente verso occidente . Questo è l'istesso che sommare l'ascensione retta del sole col tempo vero ridotto in gradi , e sottrarre l'ascensione retta dell'astro , per aver l'angolo orario .

367. Quando un pianeta o una stella si trova precisamente nell'orizzonte , la sua distanza dal meridiano , o il suo angolo orario (366) chiamasi arco semidiurno ; ed è la prima cosa , che bisogna conoscere per calcolar l'ora del levare , o del tramontare degli astri (171). Sia HZO (fig. 31) la metà del meridiano , HO la metà dell'orizzonte , EQ la metà dell'equatore , P il polo , Z il zenit ; L un astro nell'orizzonte nel momento del suo levare , ZL la sua distanza dal zenit di 90° ; intendo la sua distanza apparente ; poichè questa distanza dal zenit apparisce cresciuta per la parallassi , e diminuita dalla rifrazione ; PL è la distanza vera dell'astro dal polo boreale , che è il complemento della declinazione ; L.A. , se sia boreale , ma la somma di 90° , e della declinazione , se sia australe (fig. 32) . L'arco PZ è la distanza del polo dal zenit nel luogo , o il complemento della latitudine ; ZE , o sia dell'altezza del polo PO . Or , conoscendosi i tre lati PL , PZ , ZL , s'inferisce il valore dell'angolo P colle regole della trigonometria sferica ; e quest'angolo P , o ZPL , è l'angolo orario dell'astro , la sua distanza dal meridiano nel momento che leva , che vuol dire l'arco semidiurno . Quando l'arco semidiurno del sole è di 8^h , il sole leverà a 4^h della mattina . L'istesso deve dirsi dell'ora del tramontare , o dell'arco semidiurno della sera .

Per-

Perciò per calcolare esattamente il levare , o il tramontare del sole , basta avere la sua declinazione per il momento che leva o tramonta ; l'altezza di polo col suo complemento è sempre nota ; il terzo lato ZL si farà di $90^\circ 32' \frac{1}{2}$, perchè la rifrazione orizzontale innalza $32' \frac{1}{2}$ (744) ; la parallassi del sole $8''$, 5 , si può qui trascurare . Riguardo ai pianeti e le altre stelle fisse , bisogna conoscere l'ora del passaggio per il meridiano (363) non meno , che la declinazione : quando s'è trovato l'arco semidiurno , si aggiunge all'ora del passaggio per il meridiano per aver l'ora del tramontare , si sottra per aver quella del levare .

368. I calcoli dell'eclissi , ed altre osservazioni , richiedono che si conosca l'altezza d'un astro sopra l'orizzonte per un momento dato . La si trova supponendo cognite le quantità seguenti : 1.^a La distanza del polo dal zenit , o il complemento della latitudine del luogo ; 2.^a La distanza dell'astro dal polo , uguale a 90° , più o meno la declinazione ; 3.^a L'angolo orario formato nel polo del mondo dal meridiano del luogo e dal cerchio di declinazione che passa per l'astro : quest'angolo orario se sia del sole , dopo mezzodì , è uguale all'ora data convertita a ragion di 15^o per ora ; ma per la mattina è il complemento di 12^h convertito parimenti in gradi . Per una stella , è l'ascensione retta del sole , meno quella della stella sominata col tempo vero ridotto in gradi (366) . Bisogna allora risolvere il triangolo PZS (fig. 31) , in cui si conoscono due lati PZ , PS , coll'angolo intercetto P , onde si trova il lato ZS opposto all'angolo cognito , il cui complemento a 90° farà l'altezza SL dell'astro sopra dell'orizzonte .

369. L'angolo formato dal verticale , e dal cerchio di declinazione , che passa per l'astro , si chiama talvolta *angolo parallattico* , perchè serve principalmente a calcolare le parallassi : tal è l'angolo PSZ ; e si trova risolvendo il triangolo PZS cogli stessi dati .

Nell'istesso triangolo PZS , conoscendo l'angolo orario P , e i due lati adjacenti PZ , PS , si troverà l'angolo PZS , o l'angolo HZL , che è l'*azimuto* ; esso è uguale all'arco LH dell'orizzonte , compreso tra il punto di mezzodì H (fig. 31. 32) , ed il punto L dell'orizzonte , a cui l'astro corrisponde perpendicolarmente .

L'*amplitudine* è l'arco d'orizzonte QL , compreso tra il vero punto di levante o di ponente Q , ed il punto dove l'astro L leva o tramonta (175) ; quest'amplitudine si trova come l'azimuto , essendo il complemento a 90° dell'azimuto , o l'avanzo di questo sopra 90° , quando l'azimuto si voglia sempre cominciare dal punto di mezzodì .

Del Sistema del Mondo .

370. La quistione del moto della terra è uno degli oggetti , che furono i più discussi tra gli astronomi . E pure non era cosa difficile per dei veri Fisici ; ma la pena , che gli ingegni trovano sempre ad alzarsi sopra gli antichi pregiudizj , in seguito lo scrupolo mal inteso de' Teologi , anno-

ritardato lungo tempo, il progresso de' buoni lumi: finalmente da un secolo circa non vi fu astronomo un poco distinto, che siasi opposto all'evidenza del *sistema di copernico*: e questo perciò è quello, ch'io chiamerò il *sistema del mondo*; nè parlerò degli altri, se non perchè l'istoria dei progressi dello spirito è sempre legata coll'istoria de' suoi errori.

371. Il sistema del mondo; vale a dire, la *costituzione*, o la distribuzione de' corpi celesti; abbraccia i pianeti principali, i satelliti, e le comete. I pianeti principali sono, 1° il sole, o la terra in luogo del sole nel sistema di copernico; 2° mercurio; 3° venere, 4° marte; 5° giovè, 6° saturno: i loro particolari elementi, o il dettaglio di ciascuno faranno la materia del libro seguente: qui non si tratta se non che della loro generale disposizione. La luna è riputata un satellite rapporto alla terra; e come ella soffre delle inegualità d'una specie tutto differente, farà sola la materia del libro IV. la teoria de' satelliti di giovè, e di saturno, sarà spiegata nel libro IX, e quella delle comete nel libro X.

372. Ma avanti di parlare della vera situazione dell'orbita planetarie, che per esser conosciuta richiedeva delle osservazioni e delle riflessioni profonde, parleremo di ciò che v'è di più apparente e più semplice da concepire, e prima dell'ipotesi antica, immaginata per rappresentare il moto annuo del sole: è questo il sistema, secondo il quale Tolomeo e molti antichi astronomi spiegavano la disposizione generale del mondo; passeremo in seguito al sistema di Copernico, e daremo le prove dei moti reali della terra, di cui importa che il lettore sia ben convinto avanti di passare alla teoria de' pianeti. Il sistema di Ticon-Brahe, posteriore a quello di Copernico, si troverà confutato dalle prove istesse di questo; finalmente i fenomeni, che risultano dal moto della terra, verranno naturalmente in seguito delle prove di questo moto.

373. I filosofi antichi che pochissimo conoscevano le circostanze del moto de' pianeti, non avevano mezzi evidenti per conoscere la vera disposizione delle loro orbite, perciò molto variarono a questo riguardo. Pitagora ed alcuni de' suoi discepoli supposero da principio la terra immobile nel centro del mondo, come ciascuno è portato a credere avanti d'aver discusso le prove del contrario. E' vero, che dopo molti discepoli di Pitagora abbandonarono questo sentimento, fecero della terra un pianeta, e collocarono il sole immobile nel centro del mondo. Ma Platone fece rivivere l'immobilità della terra; Eudossio, Calippo, Aristotele, Archimede, Ipparco, Sofigene, Cicerone, Vitruvio, Plinio, Macrobio, e Tolomeo seguirono questa sentenza, (*Riccioli Almagestum* tom. II. pag. 276.). Si può veder in Plinio (l. II. c. 22) e in Censorino (*de die natali* c. 13) la maniera, con cui Pitagora applicava gl'intervalli de' toni a quelli delle distanze de' pianeti dalla terra.

374. Tolomeo, che scrisse intorno l'anno 140. di G. C. o verso li primi anni dell'imperator Antonino, è quello che ha dato il nome a questo sistema, perchè il suo *Almagesto* è il solo libro dettagliato che ci sia pervenuto dell'astronomia antica: cerca di provare in due capitoli di quest'opera, che la terra è veramente immobile nel centro del mondo.

e met-

e mette gli altri pianeti intorno d'essa con quest'ordine: la luna, mercurio, venere, il sole, marte, giove, saturno. La principal ragione di porre mercurio e venere sotto il sole era di seguire in ciò il sistema più antico, e di porre il sole in mezzo dei pianeti, in oltre di porlo tra i pianeti, che poco se ne scostano, e quelli che talora gli vanno opposti. Quanto a questi tre altri pianeti pensò che dovevano esser tanto più vicini a noi, quanto meno durava il loro corso: questa legge almeno era indicata dall'esempio della luna; che girando molto più presto del sole; era manifestamente a noi più vicina, poichè sì sovente eclissava il sole: vedeva anche saturno essere il meno luminoso di tutti i pianeti, ciò che lo faceva presumere il più remoto, nel mentre che era anche il più lento. Io riduco a questo le nove ragioni apportate dal P. Riccioli nel suo *Almagestum novum* (T. II. pag. 279) in favor di questa parte del sistema di Tolomeo. Esso è espresso nella fig. 40 secondo il Lib. IX. dell'*Almagesto* di Tolomeo; ogni pianeta è marcato nella sua orbita col segno che gli conviene (83), e però questa figura non ha bisogno di spiegazione.

375. Platone aveva cangiato qualche cosa nel sistema di Pitagora; molti autori dicono, che metteva mercurio e venere di là dal sole; la sua ragione, dicono, era, che venere e mercurio non avevano mai eclissato il sole, ciò che doveva succedere se questi pianeti fossero come la luna più bassi del sole. Questo sistema fu sostenuto da Trone nel suo commentario dell'*Almagesto*, poscia da Græber, il solo tra gli Arabi che si sia scostato dal sistema di Tolomeo.

376. I primi osservatori rimarcarono certamente che venere non s'allontanava mai dal sole, che d'in circa 45° ; era però naturale di credere, che se girasse come il sole intorno la terra, sarebbe stata spessissimo opposta al sole, o sia lontana di 180° ; perciò gli Egiziani immaginarono che venere doveva girare intorno del sole, come in un epicyclo, con che spiegavano benissimo perchè compariva più, o meno brillante in certi tempi, senza mai cessare di accompagnar il sole, e lo stesso era di mercurio. Macrobio racconta con elogio questo sentimento degli antichi Egiziani, (*Somn. Scip. Lib. I. c. 19.*)

377. Cicerone, facendo parlar Scipione sul sistema del mondo, sembra dire, che le orbite di venere e di mercurio accompagnano, e seguono il sole; *hunc ut comites sequuntur Veneris alter, alter Mercurii cursus* (*Somn. Scip.*) Vitruvio dice formalmente, che mercurio e venere circondano il sole, e girano intorno il suo centro, ciò che produce le loro stazioni, e le loro retrogradazioni apparenti (*Archit. lib. IX. c. 4.*), di modo che Vitruvio si può considerare come uno degli antichi, che anno sostenuto il sistema degli Egizi.

378. Marciano Capella, autore che si crede aver vissuto nel V. secolo, sviluppa ancora meglio questo sistema, e v'è un capitolo espresso nelle sue miscellanee, di cui questo è il titolo: *quod tellus non sit centrum omnibus planetis*: spiega benissimo in questo capitolo, che le orbite di venere e di mercurio non circondano la terra, ma solamente il sole, ch'

ch'è nel centro de' loro cerchi; che questi pianeti sono ora di là; ora di qua dal sole; che nel primo caso mercurio è meno da noi lontano che venere, nell'altro più. Questo sistema degli Egizj fu il principio delle belle idee di Copernico sul sistema del mondo: indipendentemente dalla prova tratta dalla costante vicinizia di venere al sole, vi si trovava il vantaggio di render ragione delle inegualità chiamate *stazioni*, e *retrogradazioni*, senza il mezzo assurdo degli Epicicli. Questo sistema Egizio è rappresentato nella fig. 41, quale si è descritto: la terra è posta nel centro della figura, è circondata dalle orbite della luna e del sole; il globo del sole descrivendo la sua orbita è circondato ed accompagnato dalle orbite di mercurio e di venere. Sopra il sole seguono le tre altre orbite situate come nel sistema di Tolomeo (374) disegnate coi caratteri indicati (83).

379. L'ipotesi degli Egizj soddisfaceva all'inegualità più osservabili di mercurio e di venere: riguardo a marte, giove, e saturno, restavano delle strane irregolarità da spiegare, tanto nel sistema di Tolomeo, che nell'Egizio. Ogni volta che questi pianeti s'accostano alla loro congiunzione con il sole, anno un moto proprio (85) veloce e diretto (che vuol dir verso oriente); pajono più piccoli, e più lontani. Ma quando sono opposti al sole cioè a 180° , sembrano più grandi, più risplendenti, mostrano di tornar addietro verso occidente, e diventano *retrogradi* (393); Nei tempi intermedi sembrano *stazionari* cioè immobili in cielo, e d'una mediocre grandezza. Queste inegualità ritornando ogni volta che i pianeti si trovano all'istessa distanza del sole, pareva ad alcuni filosofi, che gli aspetti e i raggi del sole avessero una forza, o influenza da produrre queste inegualità costanti nei pianeti. Era quella la *seconda inegualità*, perchè la prima era simile a quella del sole, e non si discerneva sola se non nell'opposizioni.

380. Perchè il lettore potesse paragonare la semplicità del sistema di Copernico coll'assurda complicazione del sistema di Tolomeo, bisognerebbe esporre l'ipotesi della seconda inegualità secondo Tolomeo, col mezzo d'un epiciclo portato sopra un eccentrico; ma è meglio occuparsi in cose più sode. Basti il dire, che ogni pianeta, essendo in congiunzione col luogo medio del sole, si supponeva partire dalla sommità, o dall'apogeo del suo epiciclo; a scorrere questo epiciclo impiegava tutto il tempo, che s'osserva tra una congiunzione media, e la prossima, vale a dire, il tempo d'una *rivoluzione sinodica* (454), saturno un anno e 13 giorni, secondo gli antichi; giove un anno e 34 giorni; marte due anni e 59 giorni; venere un anno e 219 giorni; mercurio 116 giorni, ed intanto ogni epiciclo percorreva il cerchio chiamato allora *deferente* per tutto il tempo della rivoluzione periodica del pianeta (85, 454.) Non parlerò dell'eccezioni a queste regole, nè delle supposizioni che bisognava aggiungerci, per ispiegare il moto degli apsid; si troverebbe tutto questo da chi ne fosse curioso, nel primo Tomo dell'Almagesto nuovo del P. Riccioli, spiegato con un dettaglio immenso, ed un'esattissima esattezza.

381. Copernico, che preferiva i cerchi concentrici agli eccentrici, si serviva d'un primo epiciclo per la prima inegualità, e facendo girare il centro d'un secondo epiciclo sulla circonferenza del primo, avrebbe potuto esprimere la seconda inegualità; ma si vedrà quanto felicemente abbia attribuita quest'apparenza al moto della terra.

Tutti i pianeti descrivevano i loro epicicli, secondo gli antichi, precisamente nell'intervallo di tempo, che loro occorreva per ritornare in congiunzione col sole. Perciò la seconda inegualità sembrava dipender dal sole; e però poté ispirare l'idea di esaminare, se un occhio posto nel sole potesse veder le cose in un ordine più semplice; e se il sole non fosse il vero centro di tutti questi moti che avevano tanto rapporto con esso. Già s'era ricorso a questo espediente per salvare le inegualità di mercurio e di venere; era dunque naturale di ricorrervi per gli altri pianeti.

Del sistema di Copernico.

382. Copernico fu mosso dagli imbarazzi dell'ipotesi antiche, nello spiegare la seconda inegualità de' pianeti (380) a desiderare d'immaginarne una, che fosse meno assurda e meno complicata. Nella prefazione del suo libro de *Revolutionsibus Orbium*, dice, che con questo pensiero aveva cominciato a leggere tutto ciò che poté trovare a questo proposito ne' Filosofi antichi, per vedere se alcuno avesse attribuito alle sfere altri moti, che quelli de' quali si parlava tanto nelle scuole; ed ecco ciò che trovò di più rimarcabile.

Cicerone dice, che Niceta di Siracusa, per detto di Teofrasto, avea pensato, che il cielo, il sole, la luna, le stelle non giravano ogni giorno intorno della terra, ma che la terra sola girando sul suo asse con grandissima velocità faceva parere in moto tutto il resto. Plutarco dice pure, che Filolao, il Pitagorico, avea preteso, che la terra avesse un moto annuo intorno del sole in un cerchio obliquo, come quello che s'attribuiva al sole. Eracleide di Ponto ed Esfanto Pitagoreo davano un moto alla terra, ma solamente intorno il suo asse, simile a quello d'una ruota. Eracleide pure cogli altri Pitagorei sosteneva che ogni stella era un mondo, che avea, come il nostro, una terra, un'atmosfera, e un'estensione immensa di materia eterea: Aristotele (de celo Lib. II. c. 13) dice pure che i Filosofi d'Italia chiamati Pitagorei, mettevano il fuoco nel mezzo dell'universo, e la terra nel numero de' Pianeti, che giravano intorno del sole come loro centro comune.

383. Diogene Laerzio nella vita di Filolao dice, che alcuni attribuivano a lui la prima idea del moto della terra, ed altri l'attribuivano a Niceta. Filolao era stato discepolo di Pitagora, e viveva intorno 450 anni avanti G. C. A queste idee sublimi degli antichi si può aggiungere qualche passo di Seneca, ove in una maniera da gran Filosofo spiega le retrogradazioni dei pianeti: „si trovarono dei Filosofi che ci vennero a dire, voi v'ingannate, credendo che vi sieno degli astri, che retro-

„ gra-

„ gradino , o si fermino ; tal bizzaria non può aver luogo nei corpi celesti ; questi vanno dove sono stati spinti ; non sospendono mai il loro corso , mai non cambiano direzione ; perchè dunque sembrano talora tornar addietro ? La cagione n' è il sole ; i loro cerchi sono posti in modo da ingannarci in certi tempi nella guisa , che spesso si crede immobile un vascello che per tanto va a piene vele „ (*Sen. quæst. nat. L. VII. c. 25. 26*). Autorità così positive diedero della confidenza a Copernico , e gli fecero tosto ammettere il *moto diurno* , o il *moto di rotazione* della terra sul suo asse . Questo semplice moto toglieva dalla Fisica centinaia di moti ciascun giorno : bastava la semplicità di quest' ipotesi per renderla verisimile ; ed in fatti è una vera dimostrazione per ognuno che voglia liberarsi dai pregiudizj dell' infanzia .

384. Realmente quando si vede la concavità immensa del cielo riempita d' una moltitudine di stelle , che sono tutte in distanze prodigiose da noi , di pianeti , che tutti anno dei moti contrarj a questo moto giornaliero ; quando si riflette alla piccolezza della terra in confronto di queste enormi distanze ; diventa impossibile il concepire che tutto ciò possa girare d' accordo , con un moto comune , regolare e costante in 24 ore di tempo , intorno un atomo tale come la terra . Non solamente il moto diurno di tutti gli astri in 24 ore intorno della terra è una cosa poco verisimile , ma oio dire , che ella è assurda , e che bisogna esser acciecati dal pregiudizio o dall' ignoranza , per poter prestarsi a quest' idea . Tutti i pianeti che sono in distanze così differenti , e i moti proprj dei quali tanto differiscono gli uni dagli altri ; tutte queste comete , che sembrano non avere quasi veruna rassomiglianza cogli altri corpi celesti ; tutte queste stelle fisse , che i cannocchiali fanno vedere a milioni in tutte le parti del cielo ; tutti questi corpi , dico , che non anno alcun rapporto gli uni cogli altri , che differiscono quanto il cielo e la terra , che sono indipendenti gli uni dagli altri , in distanze che l' immaginazione sienta a concepire , s' accorderebbero dunque a girare ogni giorno tutti insieme , e come se fossero inchiodati in una tavola , intorno ad un asse , che anche muta di luogo ? L' inegualità nel moto di tanti corpi per ogni conto così disuguali , doveva sola indicare ai filosofi che non v' era niente di reale nei moti diurni ; e quando ben si riflette , prova la rotazione della terra in un modo , che non lascia verun sospetto , e che non ammette replica . Finalmente dopo che col soccorso dei cannocchiali noi vediamo , senza veruna specie d' incertezza , giove ed il sole girare sul loro asse (970) riesce ancora più difficile rievocare in dubbio la rotazion della terra , che indubitabilmente è meno grossa del sole .

385. Gli antichi erano sforzati a supporre delle sfere solide e trasparenti come il cristallo , ove incastavano tutti gli astri , e facevano girare queste galotte sferiche , le une dentro l' altre ; il P. Riccioli stesso dovette ricorrervi (*Almag. novum* II. 188). Ma dopo che si sono veduti i pianeti accostarsi visibilmente a noi , e poscia scostarsene ; dopo che si sono vedute delle comete discendere sin presso la terra , e poscia risalire a perdita di vista , i cieli solidi sono un' assurdità dimostrata . Diventa dunque egual-
men-

mente assurdo il supporre, che il sole intero possa girare ciascun giorno tutto insieme col suo sistema composto di tante migliaia di pezzi distaccati, e in tanti cerchi differenti, quando non si voglia applicarvi dell'intelligenze conduttrici, occupate incessantemente ad impedire l'effetto delle leggi del moto, stabilite per altro in tutta la natura.

386. Il P. Riccioli oppone a tutto questo i passi della scrittura, ove è detto che il sole leva e tramonta (410), propone in seguito 77 argomenti contro il moto della terra, e ne confuta 49, che suppone poterli fare in favor del sistema di Copernico.

Tra tutte le prove, che produce contro il moto della terra, le sole che sembrano meritare qualche riflesso, si riducono al solo argomento di Tolomeo (*Almagesto* lib. I.) che Buchanan ha espresso nei seguenti versi:

*Ipsæ etiam volucres, tranantes aera leni
Remigio alarum, celeri vertigine terra
Abreptas gement sylvas, &c. Sphæz. l. I.*

„ Gli augelli dell' aria vedrebbero fuggir sotto i loro piedi la terra, e i boschi, ec.

387. Copernico (l. 1. c. 8), Keplero, Tolomeo istesso avevano già risposto a questo argomento. E' impossibile che i corpi terreni e l'atmosfera della terra da tanto tempo attaccati ad essa, girando con essa, non abbiano ricevuto un moto comune, un' impressione e una direzione comune. La terra gira con tutto ciò che le appartiene, e tutto succede nella terra mobile, come se fosse in quiete. E' da stupire, che Ticone, il P. Riccioli, e tutti quelli che anno ripetuto lo stesso argomento sotto tante forme, non abbiano saputo, che quando si gioca alle palle o al bigliardo in un vascello, che va forte, l'incontro de' corpi succede colla stessa forza tanto in un senso che in un altro, e quando si getta una pietra dall'alto dell'albero di un vascello in moto, cade direttamente a piè dell'albero come quando il vascello era in quiete: il moto del vascello è comunicato innanzi all'albero, alla pietra; a tutto ciò che esiste nel vascello, in modo, che tutto in esso accade come se fosse immobile. Il solo urto degli ostacoli stranieri fa concepire il moto del vascello. Ma come la terra non incontra verun ostacolo straniero, non v'è assolutamente niente in natura, nè sulla terra, che possa colla sua resistenza, col suo moto, col suo urto farci percepire il moto della terra. Questo moto è comune a tutti i corpi terrestri: anno un bell'alzarsi in aria; anno ricevuto innanzi l'impressione del moto della terra, la sua direzione, e la sua velocità, e quando anche sono al più alto dell'atmosfera, continuano a moverli come sulla terra. Una palla di cannone, che fosse gettata perpendicolarmente verso il zenit, ricaderebbe nella bocca del cannone, benchè, durante il tempo che la palla fosse in aria, il cannone avesse fatto verso levante colla terra molte leghe (deve fare

leghe $6 \frac{1}{4}$ per minuto sotto l' equatore). La ragione è chiara ; questa palla alzandosi in aria non ha perduto niente della velocità circolare che il moto della terra le avea comunicato : queste due impressioni non sono contrarie ; può far una lega in alto , mentre ne fa 6 a levante ; il suo moto nello spazio assoluto è la diagonale di un parallelogramo , di cui un lato ha una lega , e l' altro 6 ; ricadrà per la sua gravità naturale seguendo un' altra diagonale , e ritroverà il cannone che colla palla è sempre stato nella linea , che va dal centro della terra fino all' altezza ove fu lanciata .

388. Perchè la palla restasse in aria sopra la perpendicolare nel punto in cui è partita , senza girar colla terra , bisognerebbe che vi fosse una causa nell' aria , che distruggesse l' impression generale , che ha ricevuto dal moto della terra , ma non se ne conosce alcuna ; la palla dunque deve continuare a girar intorno il centro della terra , sebbene se n' allontanano per l' impulso della polvere : la prima , e la più general legge del moto è , che un corpo determinato una volta a muoversi in una direzione , continua uniformemente , e nell' istessa linea , se non v' è cagione che ritardi , o distrugga il suo moto ; questa legge si osserva , e si verifica da per tutto ; non è dunque maraviglia che gli augelli , le navole , i corpi gettati continuino ad avere lo stesso moto che la terra quand' anche se n' allontanano .

389. Ma se i corpi terrestri non possono scoprire il moto della terra , tutto ciò che è lungi dalla terra ce lo mostra : noi siamo sopra un vascello , che si move tranquillamente , senza che se n' accorgiamo ; ma chi è sul vascello vede le rive , e le case allontanarsi : *provehimur portu , terraeque urbesque recedunt* ; istessamente noi vediamo i pianeti , le stelle , e tutto il cielo , senza eccezione , muoversi dall' istessa parte , e tutto ciò che è fuori della terra ci avverte del nostro moto .

390. Quando non si vede contro il sistema di Copernico veruna forte d' argomento , noi all' opposto abbiamo una prova ben fisica , e ben dimostrativa della rotazione diurna della terra nella diminuzione di peso dei corpi che sono sotto l' equatore , diminuzione che si trova proporzionale alla forza centrifuga che nasce dalla rotazione della terra (816. 1011) che produce anche la figura appianata della terra , che è una nuova prova del moto diurno . L' aberrazione delle stelle (783) , e l' attrazione universale , di cui daremo tante prove nel Libro XII , sono ancora dimostrazioni fisiche e positive del moto della terra .

391. Ammesso una volta il moto diurno della terra sul suo asse , diventava più facile d' ammettere un secondo moto , il moto annuo della terra nell' eclittica . Questo era indicato dal fenomeno delle stazioni , e retrogradazioni dei pianeti (380) che diventano pure apparenze , quando si ammette il moto della terra , e che sono singolarità inesplicabili in ciascun pianeta , quando si suppone la terra immobile .

392. E' questo un fenomeno osservato dal tempo d' Ipparco in tutti i pianeti , che dopo d' aver avanzato qualche tempo da occidente in oriente secon-

secondo l'ordine dei segni, a poco a poco si rallentano, si fermano, e poi retrocedono (379): la retrogradazione di saturno dura 136 in 140 giorni, da una congiunzione all'altra; quella di giove, 118 in 122; quella di marte, tra 59 e 79; quella di venere, 42 in 44; quella di mercurio, 22 per 115 giorni che dura la sua rivoluzione sinodica. L'arco di retrogradazione è di 6 in 7 gradi per saturno, di 10 per giove, di 10 a 19 per marte, di 16 per venere, tra 9 e 16 per mercurio. Queste retrogradazioni ritornano ogni volta, che i pianeti ritrovano in congiunzione col sole, vale a dire che dipendono dal moto annuo del sole. Per spiegarle nel sistema di Tolomeo bisognava far muovere ogni pianeta in un epiciclo, per un moto che dipendeva dalla lunghezza dell'anno, differente per ciascun pianeta (380). Tutta questa complicazione sparisce nel sistema di Copernico (463); perciò questo astronomo doveva esser più portato ad ammetterlo dei Piragorici, che non conoscevano questa irregolarità dei pianeti. Di fatti fu questa la prima ragione che ebbe Copernico di cercare verso l'anno 1507 altra ipotesi, che quelle di Tolomeo, per spiegar le moti planetari. Il suo libro venne alla luce nel 1543; e dal tempo di Galileo e di Keplero nel 1600 tutto ciò, che v'era di più abile in astronomia, era del sentimento di Copernico, e non dubitava più del moto della terra: i progressi fatti dopo in astronomia anno prodotto nuove dimostrazioni a non v'è più ragione da dubitare, nè obbiezione ragionevole da farsi contro il moto della terra.

393. Il sistema di Copernico è rappresentato nella fig. 42: il sole è nel centro del mondo; i pianeti girano intorno il sole nell'ordine seguente: mercurio, venere, la terra, marte, giove, saturno, in distanze dal sole, come 4, 7, 10, 15, 52, 95, benchè queste proporzioni non siano osservate nella figura. Ogni unità di questi numeri vale un poco più di 3 milioni di leghe, da 25 al grado, o di 2263 pertiche ciascuna. Si vedrà qui dopo la maniera di trovar queste distanze (450). Nella figura si vede la terra circondata dall'orbita della luna che trasporta seco, come giove dalle 4 orbite dei suoi satelliti, saturno da 5. Parlerò dei fenomeni che risultano da questo sistema (412), dopo d'aver esposto quello di Ticone.

Del sistema di Ticone-Brabe.

394. Il sistema di Ticone ha del rapporto con quello di Tolomeo, perchè l'uno e l'altro adotta il moto del sole, e suppone la quiete della terra; ma ha rapporto ancor più con quello di Copernico, poichè in ambedue i cinque pianeti girano intorno il sole, e senza le dimostrazioni di Copernico, Ticone forse non si sarebbe elevato così alto. Il sistema di Ticone rappresentato nella figura 43, che ho tratta dalla sua opera sulla cometa del 1577, impressa in seguito delle sue lettere astronomiche col titolo: *Tychonis-Brabæ Dani. de mundi ætherei recentioribus phenomenis, liber secundus*. La terra T è posta nel centro della figura: ella è circondata prima dall'orbita della luna, e poscia quella del sole. Intorno il

N 2

sole

sole S, come centro, sono descritti cinque altri cerchi per rappresentare le orbite di mercurio, di venere, di marte, di giovè, di saturno; e il sole accompagnato da tutte queste orbite è supposto girare intorno la terra T, che tuttavia è più vicina ad esso che le orbite di giovè e di saturno. Io non ho rappresentato in questa figura i satelliti di giovè e di saturno, come nè pure le grandezze proporzionali dell' orbite, per non ingrandire troppo la figura.

395. Il sistema di Ticone in sostanza era quello degli Egizj (376). Avendo conosciuto com' essi, che venere e mercurio manifestamente giravano intorno il sole, credette ch' era lo stesso degli altri tre pianeti; la conclusione era assai naturale, rendeva uniformi le ipotesi di tutti i pianeti, sopprimeva tutti gli epicicli indotti a spiegar la seconda irregolarità, col solo moto del sole. Ticone aveva una ragione di più: Copernico avendo 50 anni avanti dimostrato, che si spiegavano colla maniera più naturale e più semplice i bizzarri e singolari fenomeni delle stazioni e retrogradazioni di tutti i pianeti; facendoli girare tutti intorno del sole; Ticone era troppo illuminato per non veder la bellezza, la semplicità, e per conseguenza la verità di questo sistema. L' avrebbe anche adottato interamente; ma trattenuto per rispetto di qualche passo mal inteso della scrittura, accostumato col volgo a considerare la terra come la base eterna e il fondamento immobile d' ogni stabilità, rigettò i moti della terra, ritenendo il resto del sistema di Copernico.

396. Ticone non ostante non voleva che si credesse non aver lui fatto altro, che voltare il sistema di Copernico. Ecco in qual occasione dice d' averlo immaginato. Avendo osservato nel 1572 marte in opposizione lo ritrovò più vicino a noi che il sole: dunque cadeva l' ipotesi di Tolomeo che fa marte più lontano del sole. D' altra parte credette rilevare, che il moto delle comete osservate in opposizione rapporto al sole, non era alterato dal moto annuo della terra, come doveva succedere nel sistema di Copernico (si vedrà, che ciò accade) (406): ciò gli fece rigettare anche l' ipotesi di Copernico; ed allora non restava altro mezzo di spiegare la prossimità di marte, se non col sistema che propose. Nell' opera indicata all' occasione della cometa 1577 parla Ticone a lungo del suo sistema immaginato verso il 1581. „ Avevo, dice, osservato che l' „ antico sistema di Tolomeo non era punto naturale; la moltitudine de- „ gli epicicli de' quali si serve per ispiegar i moti de' pianeti rapporto al „ sole, se loro stazioni ecc. è superflua: queste ipotesi peccano anche „ contro i principj dell' arte, supponendo questi moti eguali, non intorno il loro centro proprio e naturale, ma intorno un punto straniero, „ cioè un centro d' un altro cerchio eccentrico, che si chiama l' *Equante*. „ Ma nè pure io approvava la novità introdotta dal gran Copernico, all' „ esempio d' Aristarco Samio, di cui parla Archimede nel suo *Arenario* indirizzato a Gelone Re di Sicilia, benchè corregga dottamente quanto „ v' è d' inutile e diserto nel sistema di Tolomeo, e che niente rinchiuda di contrario alla matematica: questa pesante massa della terra, „ tanto poco atta al moto, non potrebbe esser agitata da tre moti, come „ i cor-



„ i corpi celesti, senza offendere i principj della Fisica, l'autorità ancora
 „ delle Scritture s'opponne : parlerò altrove di questi diversi inconvenien-
 „ ti, come anche di quello che vi sarebbe nel supporre uno spazio im-
 „ menso tra l'orbita di saturno e l'ottava sfera, che non sarebbe occu-
 „ pato da verun astro. Vedevo dunque da una parte e dall'altra degli
 „ assurdi; mi posi però ad esaminare seriamente se ci fosse qualche ipo-
 „ tesi, che fosse d'accordo coi fenomeni e i principj di matematica,
 „ senza offender la fisica, nè la teologia: vi sono riuscito oltre la spe-
 „ ranza, ed ecco come. Io penso prima, che senza esitanza bisogna por-
 „ re la terra immobile nel centro del mondo, secondo il sentimento de-
 „ gli antichi, ed il testimonio della Scrittura. Ma non ammetto con Tolo-
 „ meo e gli antichi, che la terra sia il centro dell'orbita del *secondo-mo-
 „ bile* (dei pianeti): penso che la luna ed il sole solamente coll'ot-
 „ tava sfera abbiano il centro del loro moto nella terra: i cinque altri
 „ pianeti gireranno intorno del sole, come loro capo e re, e il sole
 „ sarà perpetuamente nel mezzo de' loro cerchi, che l'accompagneranno
 „ nel suo moto annuo. Così il sole farà la regola e il termine di tutte
 „ queste rivoluzioni; e come Apollo in mezzo alle Muse, regolerà solo
 „ tutta l'armonia celeste di questi moti. „

397. Nel mentre che Ticone riguardava il moto della terra come un
 paradosso di Teologia e di Fisica, riconosceva la sua utilità in astrono-
 „ mia. „ Confesso, dice (*Progymn.* T. I. pag. 661) che le rivoluzioni
 „ de' cinque pianeti, che gli antichi attribuivano a degli epicicli, si spie-
 „ gano facilmente e con poca spesa col semplice moto della terra; che
 „ gli antichi matematici anno adottato molte assurdità, e contraddizioni
 „ che Copernico salva, e che soddisfa meglio all'apparenze celesti. „
 Ma poi Ticone teneva, che il testimonio della scrittura era un grande
 ostacolo al sistema di Copernico.

398. Si vede ancora in una lettera di Ticone a Rothmanno, mate-
 matico del Langravio, in data 21 Febbrajo 1539, ciò che Ticone pen-
 „ sava del sistema di Copernico: „ quando tratterò, dice, *ex professo*
 „ dei moti celesti, farò vedere, che le mie ipotesi soddisfanno pienamen-
 „ te all'apparenze celesti; ch'esse sono di molto preferibili a quelle di
 „ Tolomeo e di Copernico, e meglio s'accordano colla verità. Ma se
 „ esse tanto vi dispiacciono, se voi amate meglio di far girare la terra
 „ e i mari, accompagnati dalla luna, con un moto annuo e dare un
 „ triplice moto ad un corpo semplice ed unico; se voi volete che questa
 „ terra, benchè così poco atta al moto, le tanto al di sotto degli astri,
 „ sia non ostante portata come un astro nella regione eterea, siete pa-
 „ drone... ma non è questo confondere le cose di quaggiù con le
 „ cose celesti, e rovesciare da capo a fondo tutto l'ordine della natura?
 „ Guardate di non ingannarvi, credendo, che Copernico abbia bastan-
 „ te risposto alle assurdità fisiche, che risultano dalla sua ipotesi:
 „ vi dimostrerò un giorno, che quanto dite per difenderla, non basta
 „ per metter la cosa fuor di dubbio; molto meno sono da accordarvi le
 „ interpretazioni, che voi date ai passi della scrittura contrari al vostro
 „ siste-

„ sistema „ ec. e quivi Ticone si sforza di provare al suo amico, che il sistema di Copernico è incompatibile colla scrittura. Leggendo le lettere di Ticone e di Rothmanno, si può osservare, quanto questo matematico fosse più sodo nel suo ragionare di Ticone.

399. Longomontano astronomo celebre che visse per 10 anni con Ticone a Uraniburgò, grato al suo maestro, e che contribuì all'edizione delle sue opere; non poté indursi ad abbracciar intieramente il sentimento di Ticone. Come Niceta ammise il moto di rotazione della terra (*Astron. Danica* pag. 161. 220) per evitare di dar a tutta la macchina celeste questa velocità incredibile del moto diurno, che per la sua forza centrifuga disperderebbe ben tosto le stelle, e i pianeti, quando non si volesse supporre i cieli solidi come l'istesso P. Riccioli fu sforzato, o dell'intelligenze conduttrici. Questo sistema *semi-Copernicano* che fu adottato da Origano nella Dedicatoria delle sue *Effemeridi*, e dall'*Argolo* nel suo *Pandolfium* Cap. 3. soffrì meno difficoltà del Ticonico; ma il moto annuo non è meno manifesto del diurno (392).

Obbiezioni contro il sistema di Copernico.

400. La semplicità e l'eleganza del sistema di Copernico, col suo accordo perfetto a tutti i fenomeni, forma una dimostrazione per ogni sistema non prevenuto; rispondendo alla difficoltà niente resterà a desiderar nelle nostre prove. Rispondo volentieri sopra tutto all'obbiezioni di Ticone; perchè il suo testimonio è d'un peso sì grande, la sua fama in astronomia merita tanto rispetto, che importa per il sistema di Copernico dimostrare che se Ticone avesse avuto meno pregiudizj, e avesse saputo ciò che si osservò dopo la sua morte, non sarebbe rimasta alcuna delle obbiezioni, che faceva contro questo sistema.

401. Dimanda a Rothmanno (*Epist. astron.* p. 167.), come può darsi, che una palla lasciata cadere da una torre, cade perpendicolarmente al piede della torre; se la terra intanto è scappata verso levante? si è risposto coll'esempio dal vascello (357.).

402. Si dirà, che la terra si rovescierebbe tutti i giorni, e che in 12 ore noi avremmo la testa a basso: ma è dimostrato, dall'esperienza de' viaggiatori, che vi sono degli antipodi (147.).

403. La terra, diceva Ticone, è una massa pesante, inerte, vile, grossolana, inetta al moto, fatta per esser il solo fondamento d'ogni stabilità; voi volete farne un astro, e porla nel cielo. Che solidità v'è mai in questo discorso? Non si vede un uomo prevenuto, come il popolo, dall'idee ricevute nell'infanzia? Perchè la terra molto più picciola del sole; per consenso di Ticone, sarebbe meno propria al moto, del sole? E perchè sarebbe più vile e più grossolana dei pianeti, che sono spacci ed oscuri, come la terra, quando il sole non gli illumina, e che sono la maggior parte, per confession di Ticone, tanto e più grossi della terra, rotondi come essa?

404. Ticone era offeso dalla distanza enorme, in cui devono trovarsi le

le stelle nel sistema di Copernico, perchè l'orbe annuo della terra vi apparisca come insensibile: non è verisimile, dice, che lo spazio compreso tra il sole e saturno sia 700 volte più piccolo della distanza delle stelle fisse, senza che in tale intervallo sianvi degli altri astri, e pure così convien supporre. In oltre le stelle della terza grandezza, delle quali il diametro apparente è d'un minuto, sarebbero eguali all'orbe annuo della terra tutto intero, se solamente anno una parallassi annua di mezzo minuto: che sarà dunque delle stelle di prima grandezza, che anno 3, o 3 minuti di diametro apparente?

Queste obbiezioni di Ticone, per altro speciose, non avrebbero avuto luogo in questo secolo: avrebbe saputo, che le comete con orbite molto più estese di quella di saturno riempiono una parte dello spazio immenso, il cui moto gli pareva inconcepibile; avrebbe saputo colla scoperta de' cannocchiali, che il diametro apparente delle stelle di prima grandezza non arriva a un secondo ($\cdot 769$), e che perciò niente obbliga a supporre d'una grandezza sì prodigiosa. Ma quand' anche bisognasse ammettere un intervallo immenso vuoto di stelle e di pianeti, e convenire, che le stelle fisse che vediamo, sono incomparabilmente più grosse del sole, non vedo, che risultasse niente di positivo contro il sistema di Copernico; se stelle, che nel sistema di Ticone diventano più vicine e più piccole, sono una cosa troppo indifferente per formare una prova in suo favore, poichè non abbiamo altronde alcun' idea della loro grandezza reale, nè della loro distanza.

405. Ticone domanda ancora; come possa concepirsi il *moto di parallelismo dell'asse della terra*, e come un solo e istesso corpo può avere così tre moti differenti, uno intorno l'asse, uno che trasporta il centro del globo, ed il terzo che cambia la posizione dell'asse. Ma il parallelismo dell'asse della terra non è punto nè un terzo moto, nè un moto particolare, come Ticone lo suppone: non è altro che una situazione dell'asse che non cambia, perchè non v'è causa, che lo faccia cambiare; basta che l'asse sia stato diretto una volta verso un punto del cielo, perchè continui ad esservi sempre diretto (417), benchè la terra abbia un moto annuo in certa direzione: non v'è ragion fisica nè matematica, che provi l'asse del moto diurno doverli dirigere perpendicolarmente all'orbe annuo; non v'è tra questi moti nè connessione nè dipendenza: nel tempo che tutte le parti della terra sono lanciate dall'istessa parte per un moto di proiezione, acquistano tutte direzioni parallele; questo nulla cambia nella loro situazione. Si può supporre che la terra (che avesse girato prima intorno un'asse immobile) sia slanciata in una qualunque direzione; tutte le parti ricevendo le stesse impressioni, v'è un'intera compensazione tra le parti superiori ed inferiori; conservano tutte il moto di rotazione, che avevano avanti, cioè, ciascuna particella si move in una direzione parallela a quella che aveva prima quando la terra era fissa. Quando una trottoia gira sopra una tavola col moto di rotazione; che le fu impresso, questa tavola può esser trasportata, gettata da altro al basso, da destra sinistra, obliquamente, circolarmente, senza che il moto della

trot-

trottola si alteri; si può slanciare la tróttola in qualunque direzione, senza che perciò cessi digirare sullo stesso asse. Una palla di cannone gira quasi sempre sul suo asse, ma ora in un senso, ora in un altro, secondo gli ostacoli incontrati nell'uscir dal cannone; ciò non è incompatibile coll'esplosione, nè punto ne dipende. Vedete li *nouveaux principes d'artillerie* de Robins, tradotti dal Sig. Dupuy 1771.

406. Ticone credeva trovare nelle comete un' obbiezione assai forte contro il sistema di Copernico, dicendo che non erano affette dal moto annuo della terra. Questa obbiezione era certamente grave; e se fosse stata vera sarebbe stata senza replica; ma Ticone aveva osservate poche comete; se avesse veduto quella del 1681, di cui la strada è così complicata e bizzarra in apparenza, che il Cassini ne fece due comete differenti, ma che diventa una curva regolare tenendo conto del moto della terra; se avesse veduto quelle comete, di cui la strada tortuosa è rappresentata coll'ultima precisione con una sola curva, descritta intorno il sole, e combinata col moto della terra, come si vedrà nel libro X, avrebbe mutato linguaggio; e ciò che fu per lui una ragione di rigettare il sistema di Copernico, sarebbe stato all'opposto la più forte dimostrazione.

407. Ticone per far girar i pianeti intorno il sole, era obbligato d'immaginare una specie di forza centrale e magnetica, una tendenza occulta verso quest'astro (*epist. astron.* p. 148). Concepiva dunque una certa forza di connessione tra i pianeti ed il sole, come si ammette generalmente a' nostri tempi (999); or questa forza s'estende dal sole fino a saturno, che vuol dire, ben di là dalla nostra terra. Come dunque immaginare, che la forza del sole, capace di ritenere dei pianeti più grossi della terra, a maggiori distanze, non potesse niente sulla terra? e che all'opposto il sole, armato di questo vasto corteggio, estendendo la sua forza fino all'estremità di questo immenso sistema, fosse non ostante sforzato a girar incessantemente intorno questa terra così piccola, e meno lontana dei pianeti, ai quali estende la sua azione? E' chiaro, che nel sistema di Ticone è questa una vera assurdità.

408. In materia di fisica non si può dare una dimostrazione rigorosa e precisa, come nella geometria pura. Se un uomo posso fermamente e da bambino in un naviglio sopra un fiume si fosse fortemente persuaso da qualche motivo di prevenzione, che questo naviglio è immobile, vedendo in esso tutto restare a suo luogo; si avrebbe bel mostrargli la terra, le rive, gli alberi in moto; dirgli, che tutto questo non potrebbe muoversi d'accordo ad una parte; che il solo moto del naviglio è la cagione di queste apparenze, e basta a spiarle; se non ha mai provato egli stesso scendendo a terra, nè veduto mai il naviglio muoversi sull'acqua; se anche cento volte sente a dir il contrario, potrà sempre rispondervi, che forse avete ragione, ma che non ha mai provato, se questo sia vero. Tal è il caso del filosofo, che volesse dimostrar al popolo il moto della terra: gli sarà vedere migliaja di stelle, che pajono avanzare dall'istessa parte, benchè in distanze prodigiose le une dall'altre;

tre ; gli dirà , che non si può nè pure immaginare una causa comune per tanti corpi isolati , e scambievolmente indipendenti , capace di trasportarli d'accordo , in una volta , e far loro fare ogni giorno un intero giro intorno una piccola massa di terra , che non si scoprirebbe da chi fosse verso una stella : il filosofo gli dirà ancora , che un semplice moto di rotazione nel piccolo globo della terra , che ha solo 1432 leghe di raggio , basta per produrre quest'infinità di moti apparenti : tutto ciò non convincerebbe quelli che non anno assai di fisica per elevarsi sopra i pregiudizj . Non è questa una dimostrazione propriamente detta ; in fisica non ve n'è , ma il filosofo non la richiede nè pure ; e gli basta d'avere una folla di ragioni da proporre , nel mentre che non si potrebbe proporre una sola obbiezione fisica e soda contro il moto della terra .

409. Per altro si devono considerare come dimostrazioni dirette e positive del moto della terra , il fenomeno dell' aberrazione delle stelle (lib. VII), la figura appianata della terra (lib. VIII), l'accorciamento del pendolo verso l'equatore (807), e tutti i fenomeni che provano l'attrazione generale dei corpi celesti (lib. XII) ; perchè questa legge non può sussistere senza il moto della terra , ed è il primo fondamento di tutta l'astronomia , e di tutta la fisica celeste .

410. Il P. Riccioli impiega più di 200 pag. in fol. nel II volume dell' *Almagesto* a quistionare sul sistema di Copernico ; sopra tutto batte su i passi della scrittura : Giofue c. 10. v. 13 ; Ps. 92 , v. 1 ; Ps. 103. v. 5 ; Ecclef. c. 1. v. 5 ; Isaja c. 34. v. 8 ; Giudici c. 5. v. 20 ; lib. III. Esdra c. 4. v. 38. Quando si leggono questi passi senza pregiudizio , vi si vede un linguaggio ordinario , che non poteva esser diverso senza diventare inintelligibile ; niente si trova , che sembri tenere al dogma , nè alla fisica . Per altro molti autori ecclesiastici anno accumulato ragioni d'ogni specie per provar., che i diversi passi della scrittura che parlano del moto del sole , possono intendersi del moto della terra , senza far loro violenza ; farebbe un zelo bene strano pretendere di escluder dal libri santi ogni espressione popolare . Per altro la Corte di Roma non ha sopra di ciò più di scrupolo . Anzi nell'ultima edizione dell' *Indice* si è levato l'articolo concernente i libri ove si sostiene il moto della terra ; e quando ero a Roma , vidi che si potea sperare che si renderebbe presto a' fisici un' espressa libertà a questo riguardo .

411. La conclusion naturale di tutto ciò che precede , è , che il sistema di Copernico è il solo , che si possa ammettere : esso è provato , quanto può esserlo cosa fisica . Dunque la terra gira veramente sul suo asse , e intorno del sole , come gli altri pianeti ; non v'è obbiezione fisica nè morale , che si possa fare contro questi due moti . Sarà meglio dimostrato ancora dopo che avremo spiegato tutti i fenomeni dell' astronomia per mezzo di questo doppio moto .

Spiegazione dei fenomeni nel sistema di Copernico.

412. Il moto diurno di tutto il cielo si spiega com'estrema facilità nel sistema di Copernico; s'è veduto (384), che questa era la principale ragione per adottarlo. Basta di fatto che noi giriamo intorno l'asse della terra da occidente in oriente, perchè tutti gli astri abbiano a parere girare al contrario da oriente in occidente. Sia BDAE (fig. 44) il globo della terra; BA l'asse della terra diretto verso il polo P del cielo, D è il parallelo circolare, che un punto D della terra descrive col suo moto diurno; F il punto della sfera celeste che corrisponde verticalmente al punto D della terra; G il punto verticale del punto E; la linea CDF, ch'è la linea del zenit, o la verticale del punto D, gira con questo punto intorno l'asse CP, e descrive con questo moto la superficie d'un cono, di cui la punta è nel centro C della terra, e di cui la base s'estende da F in G; il circolo celeste FG parallelo all'equatore è questa base; non è già nello stesso piano col parallelo terrestre DE, ma gli corrisponde essenzialmente, poichè tutti i punti di questo parallelo celeste FG sono lontani dal polo celeste P l'istesso numero di gradi, che i punti DE sono lontani dal polo della terra A: la linea del zenit CDF nelle 24^h incontra tutti i punti del cielo che sono nella medesima distanza dal polo P, cioè tutti i punti del parallelo celeste FHG, e tutti successivamente appariranno nel zenit. Così a Parigi si vede successivamente passare per il zenit le costellazioni di cassiopea, di andromeda, di perseo, del cocchiere, dell'orsa maggiore, del dragone, perchè la nostra linea verticale va ad incontrarle una alla volta.

413. Il moto annuo si spiega colla stessa facilità; quanto s'è detto del moto apparente del sole nell'eclittica (309) ha luogo in conseguenza nel moto della terra. Quando la terra è in ariete, il sole pare nel segno opposto della bilancia; se la terra avanza di 30° ed entra nel toro, il sole pare avanzar altrettanto, e si vede nello scorpione, il luogo apparente del sole essendo sempre opposto di 180°, o di 6 segni al luogo della terra. Sia S il sole (fig. 47); TR l'orbita della terra, Y $\overline{QD}$ $\overline{AC}$ il cerchio celeste chiamato *eclittica*, in cui s'immaginano i 12 segni, a una distanza infinita da noi. Il sole S pare rispondere alla $\overline{AC}$, quando la terra è in T; perchè il raggio visuale tirato dalla terra al sole in grandissima distanza s'estende verso il segno $\overline{AC}$, ed allora diciamo, che il sole è nella libra; ma se la terra T fosse veduta dal sole S secondo il raggio STY, essa parerebbe in Y, cioè in ariete. Dunque il luogo della terra nell'eclittica è sempre diametralmente opposto a quello del sole, l'uno si move contro l'altro. Perciò la terra descrivendo un'orbita annua TR, che la fa passar successivamente sotto i punti Y $\overline{QD}$ $\overline{AC}$, essa vedrà il sole corrispondere a tutti i punti opposti dell'eclittica, e ne seguirà il moto annuo apparente del sole che osserviamo.

414. La *mutazione delle stagioni* si spiega benissimo nel sistema di Copernico per mezzo dell'inclinazione, e del parallelismo costante dell'asse del-

della terra ; ma ciò ricerca più d' attenzione , e tra tutti i fenomeni fix quello che meglio mostrò l'ingegno di Copernico. Il fenomeno delle stagioni si riduce a questo : i paesi della terra situati sotto il tropico del cancro , o sia a $23^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine settentrionale , come sono appresso poco l'antica città di Syene , quelle di Canton e di Chandernagor , veggono il sole passare per il loro zenit , a mezzodì , al tempo del solstizio d'estate , come tutti i luoghi che anno la medesima latitudine. Quelli all'opposto che sono a $23^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine meridionale , e sotto il tropico di Capricorno , come Rio-Janeiro nel Brasile , anno il sole nel zenit li 21 Dicembre , nel solstizio d'inverno . Perchè questo abbia luogo col moto della terra , basta porla in maniera , che il raggio solare diretto verso il centro della terra passi nel primo caso per il tropico del cancro , nel secondo per il tropico opposto. Sia S il sole (fig. 46) , C , D due punti diametralmente opposti dell'orbe annuo della terra ; il punto C dove si trova ai 21 Giugno , il punto D ai 21 Dicembre ; EF il diametro dell'equatore terrestre , GH il tropico di cancro , IK il diametro del tropico di capricorno ; se l'asse PA della terra è inclinato in modo , che l'equatore EF faccia un angolo di $23^{\circ} \frac{1}{2}$ col raggio solare SC , cioè coll' eclittica , (perchè il raggio solare è sempre nell' eclittica) l'angolo HCF , o l'arco HF essendo di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, il raggio solare tenderà al punto H del-

la terra lontano dall' equatore F dell' istessa quantità di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, vale a dire , che Syene , e tutti i luoghi dell' istesso parallelo in quel giorno avranno il sole nel zenit . Se all' opposto l' asse PA fosse retto o perpendicolare al raggio solare SC , il diametro ECF dell' equatore si dirigerebbe secondo CS , e si confonderebbe con esso ; perciò il sole sarebbe perpendicolare a tutti i luoghi dell' equatore terrestre , e allora i paesi situati sotto l' equatore (44) avrebbero il sole nel zenit . (Ciò accade nei due giorni degli equinozi , figurandosi SC eretta , e perpendicolare alla figura , e compito il cerchio del diametro ECF , il che succede tre mesi dopo il solstizio).

Sei mesi dopo la terra si troverà dall' altra parte del sole , nel punto D , diametralmente opposto al punto C , ai 21 Dicembre . Supponiamo allora che l' asse TB sia situato come era prima , cioè sia parallelo all' asse PA , o sia inclinato nello stesso senso , coll' istesso angolo , e verso l' istessa parte del cielo , che era 6 mesi avanti ; il tropico del cancro GH farà nella situazione LM , e il raggio solare SRD , in vece di dirizzarsi al tropico del cancro in L , come nel primo caso , risponderà in R al tropico RV , che è quello di Rio-Janeiro , e dei paesi tutti situati a $23^{\circ} \frac{1}{2}$ di latitudine meridionale ; perciò tutti questi paesi passeranno successivamente per il punto R girando intorno l' asse TB , tutti avranno,

l'un dietro l'altro il sole nel zenit, e perciò il sole avrà descritto il parallelo di $23^{\circ} \frac{1}{2}$, come deve fare per il moto diurno (27. 73. 412.)

415. Quando il sole corrispondeva al tropico del cancro, ed era perpendicolare al punto H, tutti i paesi situati dalla parte del polo artico P avevano l'estate, gli opposti, avendo il sole obliquo, l'inverno; e viceversa; i siti intermedj danno le stagioni medie.

416. Poichè nei passaggi dall'inverno all'estate, e dall'estate all'inverno, non può il sole passare da $23^{\circ} \frac{1}{2}$ di declinazione boreale a $23^{\circ} \frac{1}{2}$

di declinazione australe, senza incontrare successivamente tutti i punti di mezzo, e diventar loro perpendicolare a mezzodì, come lo era ai tropici: perciò anche l'equatore; ed allora illuminerà mezza la terra per l'asse. Possio un lume in mezz'una tavola, e facendovi girar intorno una palla coll'asse inclinato, e sempre parallelo, si vedranno seguire tutti questi fenomeni.

417. Copernico, che immaginò il primo questa spiegazione delle stagioni col moto della terra (de Revolutionibus L. 1. c. 11.) chiama questo parallellismo della terra un terzo moto, un moto di declinazione, un moto conico, contrario al moto annuo: accade, dice, che per questi due moti uguali, e che scambievolmente si contrariano, l'asse della terra ed il suo equatore sono sempre diretti nell'istesso modo, e verso l'istessa parte del cielo. Ma Copernico avrebbe ben potuto dispensarsi da nominar questo un terzo moto; la meccanica dimostra piuttosto, che il parallellismo dell'asse non è che la negazione d'un terzo moto; ve ne vorrebbe uno, perchè l'asse cessasse d'esser parallelo a se stesso, come s'è spiegato art. 405.

418. Molti anno rappresentato con macchine planetarie il moto annuo della terra intorno il sole, ed il moto diurno, sull'asse costantemente parallelo a se stesso. Si trova una macchina di questa spezie descritta da Niccolò Mullero, nell'edizione, che ha data nel 1617 del libro di Copernico pag. 29; in Ferguson (Astronomy explained, 1764, Tav. VI.) e non è difficile immaginarne di differenti spezie (se ne vendono a Parigi chez Passeman, au Louvre; chez Vaugondt, quai de l'Horloge; chez Fortin, rue de la Harpe). Per rappresentare il parallellismo dell'asse della terra, basta che sia fissato in una girella l'asse e che nel centro del sole sia posta una girella eguale alla prima, con un cordone senza fine, che passi per queste due taglie legandole l'una coll'altra, allora si potrà far girare la terra intorno del sole senza che l'asse cessi d'essere inclinato e diretto verso l'istessa regione del cielo, e parallelo a se stesso: qui s'impiega un moto particolare per mantenere il parallellismo; ma in cielo è un effetto naturale, e che niente dimanda di particolare.

419. Avanti di spiegare le altre mutazioni che produce nel cielo il moto della terra, è essenziale di ben comprendere la proposizione seguente: se l'occhio dell'osservatore, trasportato dal moto annuo della terra, continua a vedere successivamente un astro istesso con raggi paralleli tra di loro, l'astro parerà non avere alcun moto. Suppongo che l'osservatore situato in O

(fig. 45)

(*fig. 45*) veda un astro per il raggio OS , e che essendo arrivato in P lo veda per un altro raggio PM parallelo al precedente ; dico che durante il tempo dell'andare dell'occhio da O in P , l'astro non gli è parso avere alcun moto, vale a dire, che lo vede nella medesima situazione, nella medesima regione del cielo, e che giudicherà l'astro immobile o stazionario. Di fatto come noi non possiamo giudicare della situazione d'un astro, che comparandolo con qualche punto del cielo, a qualche oggetto, a qualche astro, a qualche piano, o linea, sia OPR la linea o la direzione primitiva, che noi prendiamo per termine di comparazione; l'angolo SOR e l'angolo MPR sono perfettamente uguali, poichè OS per ipotesi è parallela a PM ; dunque la distanza apparente di S e di M , rapporto al termine di comparazione OPR , sarà in ambici casi di 90° . Questa distanza essendo l'istessa, non vi sarà verun indizio, veruna apparenza di moto nell'oggetto S ; dunque non si potrà a meno di giudicarlo immobile. Per poco che si rifletta, si capirà ch'è manifesto, come si ha supposto, che non si può percepire il moto d'un oggetto che per confronto d'un altro. S'io fossi solo nell'universo coll'astro S , e se fossimo trasportati insieme d'un moto comune a traverso gli spazj immaginari, sarebbe impossibile che potessi scoprire questo cambiamento, poichè qual indizio potrei averne?

420. Si dimanderà ora qual è l'oggetto di comparazione di cui si deve far uso; si dimanderà se v'è un termine fisso, come la linea OR , al quale un astronomo possa comparare gli astri, per giudicare se anno qualche moto apparente. Risponderemo che vi sono molti di questi termini fissi, quali il piano dell'equatore, o quello dell'eclittica, trattandosi delle stelle fisse: come questi piani sono fissi, o che almeno si conosce bene la loro variazione, ad essi si riferiscono le variazioni apparenti delle stelle fisse, per averne la quantità e la misura.

421. Il punto equinoziale, o la linea tirata al primo punto d'ariete, è ancora un termine fisso di comparazione rappresentato dalla linea OR , e s'impiega anche per li pianeti: ogni volta che il raggio SO , che marca il luogo dell'eclittica, dov'è la stella, farà un angolo retto colla linea OR , che va verso l'equinozio, giudicheremo necessariamente, che l'astro ha 90° di longitudine; questa longitudine non si cangerà finchè l'angolo MPR sarà uguale all'angolo SOR ; noi terremo l'astro per *stazionario* finchè l'angolo P continuerà a parer eguale all'angolo O , che vuol dire, il pianeta continuerà ad aver 90° di longitudine rapporto all'eclittica.

Moti de' pianeti veduti dalla terra.

422. Dopo d'aver provato, che come i pianeti principali, così la terra, gira intorno del sole, è necessario spiegare le apparenze, che risultano da questo moto; ma una parte di queste irregolarità procede dall'inclinazione dell'orbite planetarie rispetto all'eclittica; perciò cominceremo dallo spiegare gli effetti di questa inclinazione. Quando si osservano i pia-

I pianeti nelle loro rivoluzioni periodiche attraverso le stelle fisse, si trova, che non rispondono affatto agli stessi punti del cielo passando all'istessa longitudine, e verso le stelle medesime: un pianeta che farà passato al nord, o di qua da una stella, nella rivoluzione seguente potrà passare di sotto, o di là della stella medesima, esser più o meno lontano dall'eclittica, cioè aver più o meno di latitudine; inoltre passano ora al nord, ora al mezzodì dell'eclittica, e ciò fin a 90° circa. Ciò prova, che le orbite planetarie non sono nel piano medesimo coll'eclittica, ma che sono inclinate le une più, le altre meno, sebbene tutte passino per il centro del sole, perchè s'osservano scostarsi egualmente da una parte e dall'altra dell'eclittica.

413. Le orbite de' pianeti essendo tutte in piani differenti, e diversamente inclinati, bisognò riferire questi diversi moti a un piano solo, per poterli calcolar tutti con metodo uniforme: si è scielto per tal effetto il piano dell'eclittica, come s'è spiegato (98), e ciò per due ragioni; la prima, perchè il sole essendo il più osservabile tra gli astri, è più naturale di sceglierlo per termine di comparazione, e di riferire alla sua orbita, che per noi è stabile, quelle degli altri pianeti (gli astronomi d'un altro pianeta sceglierebbero l'orbita propria); la seconda ragione di questa preferenza è, che l'orbite planetarie si scostano poco dall'eclittica, e fanno con essa angoli piccolissimi, in modo che le riduzioni sono minori e più comode, che rapportando le orbite ad un altro piano, come farebbe quello dell'equatore, al quale altra volta si rapportavano i moti celesti.

414. Un piano in generale è una superficie, sulla quale si può tracciare per ogni senso una linea retta: questa è la definizione più esatta, che si possa darne, perchè una superficie non è più un piano, se una linea retta non vi si confonde, e non lo combacia in tutti i punti, e per ogni verso. Da questa definizione si possono cavare tutte le proprietà de' piani, come lo fece Euclide nel Lib. XI. degli elementi; eccone una di grande uso per noi.

415. Un piano inclinato sopra un altro lo taglia (ogni piano essendo per se infinito) in una linea retta, chiamata la comune sezione. Così il piano DABC (fig. 48), ed il piano FABE, passano ambedue per la linea AB, che loro è comune, e perciò si chiama la comune sezione dei due piani. L'angolo dei due piani è uguale a quello che formano due rette, una in un piano, l'altra nell'altro, perpendicolari in un punto della comune sezione, come farebbero CB, EB, o pure DA, FA; non v'è altro mezzo di conoscere l'inclinazione scambievolmente di due piani; se quest'angolo si volesse misurare con due linee oblique come HB, GB, non vi sarebbe più misura certa dell'angolo, potendo queste linee esser più o meno oblique, e formare maggiore o minor angolo secondo che i piani sono più o meno inclinati; ma le due perpendicolari sole si avvicinano, e si scostano del pari coi piani.

416. L'orbita d'un pianeta veduta dal sole si rapporta all'eclittica, considerandola come un cerchio massimo della sfera, nel modo che abbiamo

mo rapportato l'eclittica all'equatore (94). Sia ALN l'eclittica (fig. 49), $APMN$ l'orbita d'un pianeta, P il luogo del pianeta, PL un arco di cerchio di latitudine che passi pel centro del pianeta, perpendicolare all'eclittica ALN ; il punto L farà il luogo del pianeta, ridotto all'eclittica, e che marca la longitudine del pianeta. I punti A, N , ne' quali l'orbita del pianeta traversa l'eclittica, sono i *nodì del pianeta*. Il nodo A , in cui si trova il pianeta, mentre passa dal mezzodì al nord dell'eclittica, chiamasi *nodo ascendente*, perchè allora il pianeta ascende verso il polo, che per noi è il più elevato; il nodo N , in cui passa il pianeta per ritornar al mezzodì dell'eclittica, è il *nodo discendente*; ne' libri d'astronomia il nodo ascendente è figurato col carattere Ω , il discendente col medesimo rovesciato $\varnothing$. Sarà spiegato qui dopo (516) il modo di determinare coll'osservazione il sito del nodo.

427. L'arco PL del cerchio di latitudine compreso tra il pianeta e l'eclittica si chiama *latitudine del pianeta*; se gli archi AP , AL e PL anno il loro centro nel centro del sole, la latitudine PL si chiama *latitudine eliocentrica*, come quella che si osserverebbe dal centro del sole; ma se il pianeta si rapporta a cerchi, il centro de' quali sia supposto nel centro della terra, allora l'arco PL chiamasi *latitudine geocentrica*. La latitudine eliocentrica PL è chiamata ancora *inclinazione* da alcuni autori come la Hire, ed Halley; ma io chiamerò sempre *inclinazione l'angolo A che l'orbita AP fa coll'eclittica AL* , e latitudine eliocentrica la distanza dall'eclittica veduta dal sole.

428. L'arco AP dell'orbita d'un pianeta, contato dal nodo ascendente verso levante, chiamasi *argomento di latitudine*, perchè la latitudine PL dipende dalla quantità AP . Per aver l'argomento di latitudine si sottra la longitudine del nodo dalla longitudine del pianeta, la differenza è l'argomento di latitudine: dico che conviene sottrarre il luogo del nodo dal luogo del pianeta, e non questo da quello; e qui devo notare cosa, che sarà d'uso in molte circostanze. L'argomento di latitudine è la quantità, o l'arco, per cui il pianeta è più avanzato in longitudine del nodo ascendente. Accade sovente, che la longitudine del nodo che si deve sottrarre è maggiore di quella del pianeta; allora per poter far la sottrazione, si aggiungono alla longitudine del pianeta 12 segni, o sia 360° .

429. La latitudine dei pianeti è boreale nei 6 primi segni dell'argomento di latitudine, in qualunque sito dell'eclittica si trovi il nodo; così quando il pianeta percorre il semicerchio $APMN$ della sua orbita, che si trova al nord dell'eclittica partendo dal nodo ascendente A la sua *latitudine è boreale*, e il suo argomento di latitudine minore di 180° . Dopo d'aver corso 6 segni, o 180° , il pianeta passa il suo nodo discendente N , e al mezzodì dell'eclittica, la sua *latitudine è australe*, e il suo argomento di latitudine sorpassa 6 segni.

430. Per calcolare la latitudine d'un pianeta, quando si ha l'argomento di latitudine, e l'angolo d'inclinazione dell'orbita sull'eclittica, basta risolvere il triangolo APL , di cui si conosce l'ipotenusa AP , e l'an-

l'angolo A, oltre il retto L, si trova il lato PL opposto all'angolo cognito, ed è la latitudine del pianeta.

431. La *riduzione all'ecclittica* è la differenza tra l'argomento di latitudine, e la distanza del pianeta dal nodo, contata su l'ecclittica, cioè la differenza tra AP ed AL. Perciò per calcolare la riduzione all'ecclittica, basta risolvere l'istesso triangolo APL colle regole della trigonometria sferica, e cercare l'arco AL dell'ecclittica; la differenza tra AP ed AL sarà la riduzione cercata.

432. Questa riduzione si sottra dall'argomento della latitudine AP per avere AL sull'ecclittica, fin che la distanza AP è minor di 90° ; ma nel secondo quarto dell'argomento l'ipotenusa AP diventa più piccola dell'arco AL dell'ecclittica, ed allora bisogna aggiungere la riduzione, come ognun riflettendo capirà. Nel terzo quadrante dell'argomento di latitudine, passato il nodo N, la riduzione sarà sottrattiva, come nel primo quadrante, e additiva nel quarto, come nel secondo. La riduzione diventa nulla nei *limiti*, vale a dire a 90° dal nodo, come in M, perchè tanto AM, che AO sono di 90° , benchè la figura sembri mostrarli disuguali.

433. Le *longitudini espresse nelle tavole Astronomiche* sono contate sull'orbita di ciascun pianeta in questo modo: supponiamo che il punto C dell'ecclittica sia il punto equinoziale, dal quale si contano le longitudini, e che siasi preso un arco AB dell'orbita uguale all'arco AC dell'ecclittica; il punto B è quello che forma l'epoche delle longitudini, talmente che quando il pianeta si trova in P, la sua longitudine è l'arco BAP, cioè la somma degli archi CA ed AP, e la sua *longitudine ridotta all'ecclittica* l'arco CAL.

434. Quando la riduzione all'ecclittica è stata sommata colla longitudine del pianeta nella sua orbita, o sottratta secondo i casi, si ha la longitudine ridotta all'ecclittica, e così ordinariamente l'impiegano gli astronomi nei loro calcoli.

435. Quando si considera l'orbita d'un pianeta come una circonferenza descritta nella concavità del cielo, non s'intende già che il pianeta percorre realmente una circonferenza di cerchio; si vedrà anzi che questa è un'elisse (468); ma tutti i punti d'un'orbita planetaria veduti da un punto qualunque nell'interno di quest'orbita, e nello stesso piano, si rapportano nella sfera celeste e nella regione delle fisse a dei punti che essendo tutti nel piano d'un cerchio massimo vi formano la linea d'una circonferenza, a qualunque distanza sieno dall'osservatore: le distanze reali non si stimano coll'occhio, ma solamente gli angoli, sotto i quali compariscono i moti dei pianeti, che sembrano farsi in cerchio.

436. Dopo d'aver considerato l'orbita d'un pianeta, come un cerchio massimo veduto dal suo proprio centro, esaminiamola in un altro punto di vista, voglio dire, rapporto alla terra per poter tener conto delle mutazioni che la precedente teoria soffre a cagion del moto della terra. Sia S il sole (fig. 30), TRN l'ecclittica o l'orbita annua della terra, di cui il piano passa per il sole; AMDP un'orbita planetaria, il cui pia-

no

no passa anche esso per il sole, ma inclinato sull' ecclittica, che taglia nella sezione comune ADN: bisogna concepire, che la parte AOD è rilevata sopra il piano della nostra figura; e che la parte DMA è immersa sotto la carta. Il pianeta nel punto A della sua orbita è nel piano stesso dell' ecclittica nella linea ADN comune ai due piani. Quando il pianeta parte dal punto A, s'innalza sopra la figura supposta qui il piano dell' ecclittica, e alzandosi di più in più arriva al punto O della sua orbita; il più remoto dall' ecclittica.

437. Questo punto il più remoto se sia dalla parte boreale chiamasi il *limite boreale*, passato il quale il pianeta discende in D, e di nuovo traversa il piano dell' ecclittica, sotto la quale immergendosi descriverà la parte inferiore DMA, ed il punto M sarà il *limite australe*; il punto A il nodo ascendente, il punto D il nodo discendente; la distanza del pianeta P dal suo nodo ascendente, o l'arco AP della sua orbita, o più tosto l'angolo nel sole ASP, sarà l'*argomento di latitudine*.

438. La parte AOD dell' orbita, essendo concepita elevata sopra il piano della figura, s'immaginerà una perpendicolare PL tirata dal punto P, in cui sia il pianeta, sino al piano della figura o dell' ecclittica; l'angolo PSL, sotto il quale apparisce questa perpendicolare veduta dal sole è la *latitudine eliocentrica*; l'angolo PTL sotto il quale apparisce questa istessa linea veduta dalla terra T (si suppone qui un pianeta inferiore; venere o mercurio) è la *latitudine geocentrica*; la linea SP è la vera distanza del pianeta dal sole, o il suo raggio vettore (48a); la linea SL è quella che si chiama *distanza accorciata (distantia curvata)*, cioè la distanza ridotta all' ecclittica; così PT è la vera distanza del pianeta dalla terra; LT la distanza accorciata. La linea PL essendo perpendicolare a tutte le linee di questo piano, come TL, SL ec. perciò l'angolo PLT sarà retto; basta rappresentarsi la linea PL verticale o a piombo sulla figura, si capirà, che i triangoli PLS, PLT sono rettangoli nel punto L.

439. Come l'arco AP o l'angolo ASP argomento di latitudine, è la distanza del pianeta dal nodo contata sull' orbita, così l'angolo ASL è la distanza del pianeta dal nodo ridotta nel piano dell' ecclittica. Questa distanza presa dal nodo più vicino è minore della distanza misurata sull' orbita (431), o minore dell' angolo ASP, perchè la perpendicolare PL ha la sua estremità L più vicina alla linea dei nodi ASN, che la cima P; la differenza è la *riduzione all' ecclittica*.

440. S'è dimostrato, che i pianeti girano intorno il sole (411); nel libro seguente vedremo il metodo di trovare le dimensioni delle loro orbite per via d'osservazioni rapportate al sole. Ma come noi gli osserviamo dalla terra, bisogna qui esaminare ciò che risulta da questa trasposizione, e quel che noi dobbiamo fare per riferire al sole le osservazioni fatte sulla terra. Abbiamo già spiegato ciò che sia longitudine geocentrica, ed eliocentrica (427).

441. La *parallassi annua*, o la *parallassi del grand' orbe, prosthaphæresis orbis*, è la differenza di queste due longitudini, ed è il primo fenomeno, che
P pro-

produce la nostra lontananza dal sole, vero centro dei moti planetarj. Sia S il sole (fig. 50 e 51, la prima per li pianeti inferiori, la seconda per li pianeti superiori), L il luogo d'un pianeta nell'ecclittica, T la terra nella sua orbita TRN. L'angolo TLS formato dalla distanza accorciata SL del pianeta dal sole, e dalla linea TL tirata dalla terra al luogo L del pianeta ridotto all'ecclittica, si chiama la *parallassi annua*. Quest'angolo TLS è la differenza tra la longitudine eliocentrica e la longitudine geocentrica. Perchè se si tira la linea SF parallela a TL (fig. 51) essa marcherà nel cielo l'istessa longitudine che la linea TL (419) vale a dire, la longitudine geocentrica del pianeta L. Ora l'angolo LSF, che è uguale al suo alterno SLT, è la differenza tra la longitudine geocentrica marcata da SF, e la longitudine eliocentrica marcata da SL; dunque l'angolo SLT o la parallassi annua è questa differenza. Si può anche dire, che è l'angolo formato nel piano dell'ecclittica dalle due distanze accorciate d'un pianeta dal sole e dalla terra SL, TL.

442. Quando si conosce l'orbita d'un pianeta per mezzo d'osservazioni rapportate al sole, coi metodi del libro seguente, si è in istato di trovare per qualunque tempo qualunque longitudine eliocentrica d'un pianeta, e il suo raggio vettore, o sia la sua distanza dal centro del sole. Se nell'istesso tempo si conosce la longitudine eliocentrica della terra, che è sempre 6 segni da quella del sole, colla distanza del sole dalla terra, si avrà tutto ciò che è necessario per calcolare la longitudine del pianeta veduto dalla terra. Sia ST la distanza del sole dalla terra, SL la distanza accorciata d'un pianeta dal sole; l'angolo TSL uguale alla differenza di longitudine del pianeta P, e della terra T; vedute dal sole, si chiama *angolo di commutazione*; la risoluzione del triangolo TSL, di cui si conoscono due lati coll'angolo intercetto, farà conoscere l'angolo alla terra STL che si chiama *angolo d'elongazione*, (del pianeta dal sole). Questa elongazione essendo sottratta dalla longitudine del sole, se il pianeta è all'occidente, o alla destra del sole, darà la longitudine geocentrica del pianeta, e il punto d'ecclittica celeste, a cui risponde la linea TL tirata dalla terra al luogo N del pianeta ridotto all'ecclittica.

Si può trovare appresso poco con una figura ed un compasso il luogo d'un pianeta veduto dalla terra, formando il triangolo STL, purchè si conosca la longitudine di ciascun pianeta veduto dal sole per una data epoca, come nella seguente tavoletta per il principio del 1772; colla durata della rivoluzione che riconduce il pianeta all'istesso punto della sua orbita (85).

Si pone la terra T, e il pianeta P secondo le loro longitudini eliocentriche dividendo i cerchi AP, NT in segni e gradi, prendendo il punto A per il punto equinoziale; si tira la linea TP, e la linea SF parallela a TP, il grado sul quale cade la linea SF farà la longitudine geocentrica del pianeta P.

	S.	Gr.	M.	S.
Sole	9	10	40	24
Luna	7	13	48	48
Mercurio	0	19	32	5
Venere	10	21	20	37
Marte	9	3	25	29
Giove	10	12	7	1
Saturno	4	19	46	30

443. La latitudine geocentrica, o l'angolo LTP si trova colla seguente proporzione: Il seno di commutazione è al seno d'elongazione, come la tangente della latitudine eliocentrica alla tangente della latitudine geocentrica.

Dimostrazione. Nel triangolo PLS rettangolo in L (438), si ha questa proporzione. $SL:LP::R:tang. PSL (^)$; nel triangolo PLT rettangolo pure in L, si ha una proporzione simile $TL:LP::R:tang. LTP$. La prima proporzione dà questa equazione $LP.R=SL.tang. PSL$, e la seconda, $LP.R=TL.tang. LTP$; dunque $SL.tang. PSL=TL.tang. LTP$; d'onde si cava questa proporzione, $TL:SL::sen. LST:sen. LTS$; dunque $sen. LST:sen. LTS::tang. PSL:tang. LTP$, latitudine geocentrica del pianeta.

444. La distanza della terra, come PT, è sovente necessaria nei nostri calcoli: per trovarla si comincia da cercare la distanza accorciata SL; perciò basta moltiplicare il raggio vettore SP o la vera distanza del pianeta dal sole nella sua orbita, per il coseno della latitudine eliocentrica, o dell'angolo PSL: perchè la linea PL essendo perpendicolare sul piano dell'eclittica, il triangolo SLP è rettangolo in L; onde per la trigonometria ordinaria si ha $R.SP::sen. SPL (o coseno PSL) : SL$, e perchè il raggio si prende sempre per unità, si ha $SL=SP.cof. PSL$. Ora nel triangolo LST si conoscono tutti gli angoli col lato SL si farà questa proporzione, $sen. STL:SL::sen. LST:TL$; seno d'elongazione al seno di commutazione, come la distanza accorciata del pianeta dal sole alla distanza del pianeta della terra.

445. Finalmente questa distanza accorciata TL, essendo divisa col coseno della latitudine geocentrica LTP, darà la distanza vera TP del pianeta dalla terra; per la medesima ragione, che la distanza vera moltiplicata per il coseno della latitudine eliocentrica dava la distanza accorciata del pianeta dal sole.

446. La maggior latitudine geocentrica ne' pianeti determina la larghezza del zodiaco. Venere tra tutti i pianeti ha la maggior latitudine; per la sua vicinanza alla terra, quando si trova in congiunzione inferiore,

P 2

ne

(*) n. 32. Introduzione alle Tavole Trigonometriche stampate in Padova nella Stamperia del Seminario appresso il Manfrè.

nei limiti, e quando la terra è perielia. La latitudine di venere nel 1700 era di $8^{\circ}40'$, secondo l'effemeridi di quel tempo; e può arrivare fino a $9^{\circ}\frac{1}{4}$; perciò la larghezza del zodiaco è almeno di $17^{\circ}\frac{1}{2}$ in questo secolo, e diventerà più grande, quando i limiti di venere, il suo afelio, e il perielio della terra concorreranno a render la distanza di venere dalla terra minore, e la sua latitudine geocentrica maggiore.

447. Le irregolarità, che provengono dal moto della terra nella sua orbita nell'apparente moto de' pianeti, cioè, le parallassi annue, anno servito a trovar le distanze de' pianeti. Appena Copernico conobbe con qual semplicità la sua ipotesi spiegava le retrogradazioni de' pianeti, vide ancora che quanto più considerabile era la retrogradazione, tanto più supponeva di vicinanza nel pianeta, e che questa retrogradazione può far conoscer la quantità della distanza. Le retrogradazioni dipendono dalla parallassi annua del grand'orbe; conviene dunque osservare questa, quando è la più grande; ecco come Copernico si regolava.

448. Copernico osservò li 25 febbrajo 1514 a 5 ore della mattina la longitudine di saturno di 209° . Supponendo S il centro del sole (fig. 31), T la terra, P Saturno; trovava per il calcolo de' moti medj osservati nelle opposizioni, e dell'equazioni di saturno e della terra già determinate, che se la terra fosse stata in K, saturno avrebbe dovuto apparire a $203^{\circ}16'$, che era la sua longitudine eliocentrica o veduta dal sole; la differenza di $5^{\circ}44'$ era l'angolo KPT, o SPT, che Copernico chiamava commutazione, e Tolomeo avrebbe chiamata *Prosthaphæresis orbis*, e noi adesso chiamiamo parallassi annua (441); l'angolo TSK, o TSP, differenza tra il luogo di saturno P veduto dal sole, e il luogo della terra T calcolato per il medesimo tempo, era di $67^{\circ}35'$ (è questo che si chiama oggi *commutazione*); dunque l'angolo T, o sia PTS di elongazione, era di $106^{\circ}41'$. Conoscendo tutti gli angoli di questo triangolo, si ha il rapporto tra i lati SP, ST, vale a dire, tra le distanze della terra e di saturno dal sole; questo rapporto si trovava essere quello di 1 a $9\frac{6}{10}$ in circa, vale a dire, che saturno P era $9\frac{1}{2}$ volte più lontano dal sole S, che la terra T. (Coper. de Revolutionibus Lib. V. c. 9.).

449. Lo stesso è d'ogni altro pianeta: osservata più volte la sua opposizione al sole, o sia la sua longitudine nel tempo ch'è la stessa veduta dalla terra e dal sole, come quando il sole S, la terra K, e il pianeta P sono nella medesima linea, si può calcolare esattamente la longitudine veduta dal sole, quando la terra si trova a 90° di là, come verso T, o l'angolo di commutazione PST = 90° : se allora si osserva la longitudine del pianeta veduto dalla terra, si troverà differente di molti gradi, e questa quantità farà l'angolo SPT, parallassi annua del pianeta. Per maggior esattezza conviene far uso del punto L, o del luogo ridotto all'eclittica.

450. Quando si conosce l'angolo SLT e l'angolo LST, ch'è la dif-

differenza tra la longitudine della terra cognita per l'istesso istante e quella del pianeta calcolata precedentemente si suppone ST eguale all'unità, e risolvendo il triangolo STL, si trova SL, ch'è la distanza del pianeta dal sole, o il raggio del suo orbe, in parti di questa unità, ch'è la distanza del sole dalla terra: così si sono trovati i numeri 4, 7, 10, 15, 52, 95, che esprimono le distanze de' sei pianeti dal sole, o almeno i loro rapporti. Esse distanze si anno con maggior esattezza nell'annessa

tabella. I valori assoluti di questi numeri in miglia, o leghe, non possono conoscersi, se non coi metodi, de' quali si tratterà nel libro IV, all'occasione della parallasse del sole; ma si troveranno in una tavola alla fine di quest'opera.

Pianeti	distanze medie de' pianeti dal sole ¹²
Mercurio	38710
Venere	72333
Terra	100000
Marte	152369
Giove	520098
Saturno	953937

451. Il metodo spiegato e adoprato prima da Copernico, servì a Keplero per trovar le distanze de' pianeti col mezzo delle loro rivoluzioni e parallassi annue, e gli scoprì quella bella legge di cui si parlerà tosto, che i quadrati de' tempi sono come i cubi delle distanze (469). Ci basta qui d'aver mostrato, che il sistema di Copernico, una volta dimostrato, porge un mezzo di conoscere le distanze de' pianeti dal sole, o almeno le loro proporzioni colla distanza della terra.

452. Si prova istessamente che le stelle nuove del 1572 e del 1604, erano molto di là dal sistema solare (287); perchè nello spazio di tre mesi che la terra impiega per andare da K in T, la parallasse annua SPT, che per saturno arrivava a $50\frac{1}{4}$ (448), e che non fu d'un minuto in queste stelle, prova, ch'erano 345 volte almeno più lontane da noi che saturno.

Delle rivoluzioni planetarie.

453. Avendo dimostrato in che consiste la seconda inegualità de' pianeti, e la maniera di schivarne l'effetto, è tempo di parlare delle rivoluzioni medie de' pianeti, tanto riguardo a un punto fisso, che rapporto alla terra. La durata di queste rivoluzioni planetarie, che conviene conoscere per arrivare alle parallassi annue, non si può determinare esattamente se non col mezzo delle congiunzioni ed opposizioni de' pianeti col sole. Imperciocchè i pianeti girando intorno il centro del sole, le loro rivoluzioni devono contarli intorno ad esso. Ma le congiunzioni e le opposizioni sono i soli punti, ne' quali la longitudine d'un pianeta veduto dalla terra sia nella stessa linea, che veduto dal sole; dunque sono queste le circostanze che conviene impiegare per queste ricerche.

454. Le congiunzioni e le opposizioni de' pianeti, che devono servire a determinare la durata delle loro rivoluzioni, devono prendersi a grandissimi intervalli le une dall'altre, affine che l'effetto delle equazioni, o in-

o inegualità periodiche sparisca, e venga come assorbito per il gran numero di rivoluzioni nelle quali si troverà diviso, come si è fatto per il sole (315). I confronti delle osservazioni antiche riferite nell'Almagesto di Tolomeo, si trovano fatti colla maggior cura negli *Elementi d'Astronomia del Sig. Cassini* stampati a Parigi nel 1740: ha raccolto le osservazioni antiche, le ha ridotte, calcolate, discusse, e ne ha concluso le rivoluzioni tropiche, cioè i ritorni all'equinozio di ciascun pianeta. Si troveranno al fine dell'opera i risultati dei confronti da una fatti, coll'aggiunta delle rivoluzioni siderali (321), delle rivoluzioni sinodiche, ec.

Delle Equazioni secolari.

455. Le inegualità periodiche, di cui s'è parlato (308), e delle quali si vedrà tosto (497) il calcolo nell'orbite ellittiche, ritornano ad ogni rivoluzione: esse non tolgono già, che queste rivoluzioni siano eguali considerando il ritorno del pianeta al medesimo punto della sua orbita; e non ostante, comparando le osservazioni fatte in diversi secoli, s'è osservato un ritardo nel moto medio di saturno, e un'accelerazione in quello di giove, e della luna. Keplero scriveva nel 1625, ch' avendo esaminato le osservazioni di Regiomontano, e di Walthero, fatte verso il 1460 e 1500, aveva trovato costantemente i luoghi di giove e di saturno, più o meno avanti di quello dovevano essere secondo i moti medi determinati per le antiche osservazioni di Tolomeo e quelle di Ticone fatte verso il 1600. Io dopo d'aver discusso questa materia, e prendendo un mezzo tra molte osservazioni fatte in varj secoli, ho trovato che bisognava supporre l'equazione di saturno di $5^{\circ} 13' 20''$ per lo spazio di 2000 anni, o $47''$ per il primo secolo. Quella di giove di $3^{\circ} 23' 20''$, o di $30''$ per secolo: si suppone, ch' ella va crescendo come il quadrato de' tempi, come l'accelerazione de' gravi.

456. Il moto medio di saturno in diversi secoli soffre altre inegualità, che non si possono nè pure spiegare coll' equazioni secolari; la sua rivoluzione media si trova differente da se stessa, secondo le circostanze ove s'osserva; senza che l'attrazione di giove, che si credeva dover influire solz sopra i suoi moti, possa produrre una tale differenza: questa irregolarità singolare, ch' io ho scoperta nel 1766, si trova spiegata a lungo nelle memorie dell' Accademia di detto anno. Il mio risultato è, che, indipendentemente dall'attrazione di giove, vi è in saturno un' inegualità, di cui la cagione deve esser differente; che nelle istesse configurazioni con giove produce un effetto più grande di quello che risulta da maggiori diversità nella posizione di giove rapporto a saturno, e che diventa sensibile sopra tutto dopo il principio di questo secolo. Io ignoro qual ne sia la cagione; fors' ella è l'azione di qualche cometa che sarà passata vicina. Ma il fatto, di cui non si può dubitare, è, che l'ultime rivoluzioni di saturno differiscono tra esse di più d'una settimana, mettendo anche a parte tutte le inegualità cognite, senza che una sì grande differenza possa venir prodotta nè dall'azione di giove, nè da veruna delle

delle cause che conosciamo. Perciò le mie tavole di saturno, le quali dal 1740 fino al 1770 non s' allontanavano dall' osservazione se non uno o due minuti, già nel 1773 si scostano di sei minuti, ciò che annunzia un ritardo sensibile in 3 anni. Vi vorrà ben del tempo avanti che si arrivi a distinguere tutti questi disordini: saturno non facendo che una sola rivoluzione in 30 anni, non si può se non dopo molti secoli averne un numero sufficiente per riconoscerne le varietà e le irregolarità loro.

Ritorno de' Pianeti all'istesso sito.

457. La posizione apparente d' un pianeta veduto dalla terra dipende non solamente dal luogo dove esso si trova realmente, ma ancora dal luogo in cui è veduto da noi, che vuol dire, dal luogo della terra. Poichè in virtù della parallasse annua (441) un pianeta situato in un solo e stesso luogo può parere più orientale se la terra è più occidentale; può anche parere in un luogo totalmente opposto. Perciò affine che un pianeta ritorni per noi all' istessa longitudine dove fu una volta, bisogna che il pianeta e la terra s'iano nello stesso punto della propria orbita, cioè che abbiano l' istessa longitudine; allora il luogo del pianeta, la sua latitudine veduta dalla terra, non meno che il passaggio per il meridiano, il levare ed il tramontare, si trovano gli stessi di prima, e ricominciano collo stesso ordine. Se fosse facile trovare simili periodi per li pianeti, la fatica di quelli che calcolano l' effemeridi, sarebbe assai diminuita a questo riguardo; ma questi periodi sono o assai lunghi, o assai imperfetti: non ostante eccone un saggio che può esser utile a quelli che calcolano effemeridi.

458. Mercurio deve trovarsi quasi all' istesso sito rapporto alla terra, dopo 13 anni 3 giorni; faranno solamente 13 anni e 3 giorni, se nei 13 anni ve ne siano 4 bissestili; perchè in questo intervallo mercurio fa 54 rivoluzioni con $2^{\circ} 55'$ di più, e la terra 13 rivoluzioni con $2^{\circ} 59'$ di più.

459. Venere dopo uno spazio di 8 anni, si trova a $1^{\circ} 32'$ solamente dal luogo dove era, e la terra si trova $4'$ più lontana, in modo che la situazione apparente di venere viene quasi la stessa 3 giorni avanti.

460. Marte in 15 anni meno 18 giorni si trova aver una situazione apparente appresso poco simile; sarebbero 15 anni meno 19 giorni, se nei 15 anni vi fossero 4 bissestili. V' è un periodo ancora più esatto per marte, ma è di 79 anni 4 giorni, o un giorno meno se vi sono 20 bissestili.

461. Per giove sono 83 anni supponendo in questo intervallo solo 20 bissestili; se fossero 21, farebbero 83 anni meno un giorno. Il periodo di 21 anni e 5 giorni tiene ancora molto di esattezza.

462. Saturno in 59 anni e 3 giorni cambia di $1^{\circ} 45'$, e la terra di $1^{\circ} 41'$: per tal modo saturno e la terra si trovano per così dire all' istessa anomalia, all' istessa distanza dal sole, e all' istessa distanza tra loro: farebbero 59 anni e 3 giorni, se nell' intervallo vi fosse un anno seco-

secolare come il 1700, di cui è soppresso il bissestile nel Calendario Gregoriano.

Li 29 Settembre 1702 saturno era in opposizione a $8^h \frac{1}{4}$ della sera con $0^{\circ} 6'$ di longitudine; li 30 Settembre 1761 di mattina 5^h è trovato in opposizione avendo $1^{\circ} 55'$ di longitudine di più che nel 1702, e solamente $2'$ di più in latitudine. L'istesso è dai 15 Luglio 1696 ai 18 Luglio 1755. Si osserverà solamente in questo confronto, che l'intervallo è di 59 anni 3 giorni, perchè l'anno 1700 fu senza bissestile.

Stazioni e retrogradazioni de' pianeti.

463. I pianeti inferiori mercurio e venere girano intorno il sole in minor tempo della terra: perciò devono comparir *diretti* nelle loro congiunzioni superiori, e *retrogradi* nelle congiunzioni inferiori. Sia T B l'orbita della terra (fig. 50), AMDO l'orbita di venere o di mercurio. Quando la terra si trova in B, e venere in M nella congiunzione superiore di là dal sole, pare andare, come va realmente, da occidente in oriente, verso la sinistra da M verso D. Ma se essendo la terra in B, venere si trova in O di quà dal sole nella congiunzione inferiore, parerà andare a destra da O in P, più velocemente che la terra non vada da B in T: perciò venere in apparenza farà retrograda nella sua congiunzione inferiore; perchè se bene ella vada in fatto nell'istesso senso, come quando era in M, rispetto a noi va in un senso contrario; allora dunque sembra avanzare contro l'ordine de' segni, ed è retrograda; ma ciò proviene unicamente da ciò che noi compariamo e rapportiamo i pianeti veduti dalla terra nostra a' punti della sfera stellata molto di là e lontanissimi da noi.

464. Tra il moto diretto e il moto retrogrado v'è necessariamente un istante che forma il passaggio, vale a dire un tempo in cui il pianeta pare *stazionario*: cessa allora d'esser diretto, e inclina a diventare retrogrado, ma non è nè l'un nè l'altro; è nel punto di riunione, ove s'incontrano gli archi di direzione e di retrogradazione; ed è questo punto che conviene determinare, se si vuol conoscere l'estensione della retrogradazione. Se la terra fosse fissa in B, venere ci parrebbe stazionaria essendo sulla tangente BC menata dalla terra all'orbita del pianeta; perchè vi ha in questo punto C un picciol arco dell'orbita che si confonde colla tangente BC, e in tanto che il pianeta percorre questo piccolo arco, resta per noi sull'istessa linea, sullo stesso raggio visuale, e corrisponde all'istesso punto del cielo, supponendo la terra fermata in B.

465. Ma la terra avendo un moto da B in T, ciò fa che il pianeta paja averne uno in senso opposto verso la sinistra, benchè sia sulla tangente BC: solamente qualche tempo dopo arriverà che il moto GH del pianeta (fig. 52), e il moto IK della terra durante lo stesso tempo, faranno tali che i raggi visuali IG, KH, saranno paralleli tra loro; allora il pianeta per tutto questo tempo parerà corrispondere all'istesso punto

to

to dell'eclittica, parerà stazionario; perchè s'è veduto (419.) che tutte le linee rette parallele tirate dal nostro occhio in cielo a grandissime distanze sono per noi come una sola e istessa linea, diretta all'istesso luogo del cielo, alla medesima longitudine.

Mettendo la terra in luogo di venire, e considerando che i pianeti superiori sono più lenti della terra, facilmente si capirà, che diventano retrogradi nelle opposizioni, rimanendo addietro dalla terra.

466. Per determinare la quantità o l'arco della direzione e della retrogradazione de' pianeti, bisogna specialmente conoscere il punto e il momento, in cui sono stazionari. Questo è un problema difficile, quando si vogliono considerare le inegualità del pianeta e della terra. Ma per un calcolo meno severo, basta prender l'effemeridi, nelle quali le longitudini de' pianeti sono calcolate di giorno in giorno, e si vedono i punti in cui la longitudine s'è trovata l'istessa due giorni di seguito; l'intervallo di questi due punti, o il tempo che li separa, divide la rivoluzione in due parti, che sono, la durata della direzione, e quella della retrogradazione. Variano molto secondo la distanza di ciascun pianeta. La maggior durata di retrogradazione è appresso poco di 22 giorni per mercurio, di 43 per venere, di 80 per marte, di 122 per giove, e di 142 per saturno, nell'intervallo da una congiunzione all'altra, o d'una rivoluzione sinodica (454). Si possono vedere delle soluzioni di questo problema delle retrogradazioni nelle memorie dell'Accademia di Petersburgo, e nella Grande *Astronomia*.



LIBRO TERZO.

Teoria del moto de' pianeti intorno al sole.

467. Dacchè il Keplero ebbe ben compreso la certezza del sistema Copernicano, non pensò più che a servirsi per conoscere le distanze de' pianeti dal sole, e le leggi del loro moto intorno al sole: vi riuscì sopra la speranza, poichè di fatto scoprì tre cose, le più importanti della fisica celeste, che ancora si chiamano le *Leggi di Keplero*.

1^o. *Che le orbite de' pianeti sono delle ellissi, di cui il foco è nel centro del sole.*

2^o. *Che descrivono quest'ellissi con celerità tali, che le aree sono sempre proporzionali ai tempi.*

3^o. *Che i quadrati dei tempi delle loro rivoluzioni sono come i cubi delle loro distanze dal sole.*

468. Per trovare la figura dell'orbite planetarie, il Keplero prese in considerazione specialmente l'orbita di marte, perchè è la più vicina alla terra, ed ha un'eccentricità considerabile: cercò il mezzo di trovare le distanze di marte dal sole in diversi punti della sua orbita, prendendo sempre la distanza della terra dal sole per base come scala comune: si valse perciò della parallasse di marte, o dell'angolo SPT (fig. 51), dedotto dalle osservazioni, come si è spiegato qui sopra per saturno secondo Copernico (448); determinò parimenti la distanza di marte dal sole nel suo afelio, e nel suo perielio, l'una di 16678 parti, l'altra di 13850, supposta sempre la distanza media della terra dal sole di 10000, perciò la distanza media di marte era di 15264, e l'eccentricità di 1414. Prese di poi tre altre distanze tra l'afelio ed il perielio, come SM, SD (fig. 55); le determinò colle osservazioni di Ticone per lo stesso metodo. Queste distanze di marte dal sole si trovarono tutte più piccole di quello sarebbero state in un'orbita circolare della stessa eccentricità, e dello stesso raggio, come il cerchio circoscritto ANP; ne seguiva naturalmente, che l'orbita di marte era più stretta d'un cerchio; che si stringeva nei fianchi, ed era in forma d'ovale: questa è la conclusione ch'egli ne cavò alla pagina 213 della sua grande e bella Opera intitolata *Astronomia nova . . . tradita Commentariis de Stella Martis 1609.*

469. Le distanze de' pianeti così determinate condussero il Keplero a cercare qual proporzione vi fosse tra le distanze e le durate delle rivoluzioni. E perchè, diceva egli, giove ch'è cinque volte più lontano che la terra dal sole, e che non ha che cinque volte più di strada da fare, impiega 12 volte più di tempo a percorrerla, vale a dire 12 anni? le proporzioni dei tempi sono più grandi che quelle delle orbite: ma forse vi sono delle potenze o delle radici di questi numeri che vanno d'accordo.

Agli 8 Marzo 1618 gli venne in mente per la prima volta di compa-
rare

rare le potenze di differenti numeri, esprimenti le durate delle rivoluzioni de' pianeti, e le loro distanze; comparò a caso dei quadrati, dei cubi, ec. provò anche i quadrati de' tempi coi cubi delle distanze; ma per vivacità o per impazienza fece qualche fallo di calcolo; s'ingannò per la prima volta; credendo che tal proporzione non avesse luogo, rigettò questa bell'idea come falsa ed inutile. Solamente ai 17 Maggio seguente ritornò tentando gli stessi calcoli e confronti: computò meglio, e conobbe che realmente regnava una proporzione eguale e costante tra i quadrati de' tempi periodici di due qualunque pianeti e i cubi delle loro distanze medie dal sole. Fu così rapito da questa scoperta, che appena si fidava de' suoi calcoli; credeva di farsi illusione, e d'aver supposto quello che si doveva cercare; non osava persuadersi d'aver in fine trovato una verità ricercata per 17 anni (*Harmonices*, lib. V. p. 189): che avrebbe egli detto, se avesse potuto prevedere le conseguenze mirabili che dopo si sono ricavate da questa legge? poichè fu da questa legge che si scoprì quella dell'attrazione (1012).

470. La distanza della terra dal sole sta alla distanza di giove dal sole come 10 a 52: i cubi loro in conseguenza sono come 1. e 140; or le durate delle rivoluzioni loro sono di 365 $\frac{1}{4}$, e di 4332 $\frac{1}{2}$ di giorni; de' quali i quadrati, trascurando l'ultime cifre, sono parimenti come 1 e 140. Se si prendono più esattamente le rivoluzioni siderali (454), e le distanze (450), si avrà 140, 6874, numero esatto, che esprime quante volte il quadrato della rivoluzione di giove, e il cubo della sua distanza contengono quelli della terra. Questa legge si verifica egualmente quando si paragonano le distanze de' satelliti di giove e di saturno colle durate delle loro rivoluzioni; e si vedrà nel XII libro, che da questa legge data per la osservazione, ne segue necessariamente, che la forza centrale o sia la gravità de' pianeti verso del sole è in ragion inversa del quadrato della distanza, ch'è la più bella scoperta del Nevvtono, dovuta infallibilmente a questa del Keplero.

471. Io mi sono pure servito di questa legge per trovare le distanze medie dei pianeti poste nella tavola dell' articolo 450; e le credo più esatte di quelle che si potrebbero dedurre dalle osservazioni alla maniera del Keplero, benchè queste ci abbiano suggerito la regola, che adopriamo ora abbandonando le stesse osservazioni.

472. Un'altra legge generale del moto de' pianeti, egualmente importante nell'astronomia, è questa, che le aree sono proporzionali ai tempi: è questa pure una scoperta del Keplero; ei pertanto non dimostrava questa verità se non in modo incompleto: il Nevvtono ha fatto vedere il primo, che questa era una conseguenza necessaria delle leggi del moto. Il Keplero era persuaso, che il moto circolare de' pianeti venisse prodotto da una certa forza emanata dal sole, che gli sforzasse a girare intorno dell'asse del sole, come girava lui stesso. Considerava che poichè i pianeti più lontani giravano più lentamente dei più vicini, bisognava che la forza motrice fosse minore a una maggior distanza; e questo lo condusse a

stabilire non solo la forza d'*inerzia*, di cui ha parlato il primo, ma ancora la regola delle aree proporzionali ai tempi.

473. Il Keplero dimostra prima nella sua fisica celeste nuova, che il moto de' pianeti negli abissi è proporzionale alla loro distanza dal sole; anche nell'ipotesi di Tolomeo (309), vale a dire che prendendo un arco dell'eccentrico verso l'afelio ed un altro arco della stessa lunghezza verso il perielio, il pianeta sta più tempo nell'arco afelio, a proporzione che la distanza afelia è più grande; o sia, ciò ch'è lo stesso, che le aree descritte nello stesso o egual tempo sono eguali.

474. Sia E (fig. 53) un punto, intorno al quale il moto sembrerebbe uniforme (309), e che, secondo Tolomeo, era differente dal centro dell'eccentrico; S il centro del sole, nell'istessa distanza dal centro C, come il punto E: tirate due linee MEO, NEP, l'arco MN, e l'arco OP sono percorsi nello stesso tempo in questa ipotesi, mentre gli angoli in E sono eguali. Or se dal punto S si tirano le linee SO, SP, e le linee SN, SM, formeranno due settori uguali: poichè, supponendo gli MN, OP estremamente piccoli, a cagione de' triangoli simili come rettilinei, si avrà questa proporzione $MN : OP :: ER : EQ$; dunque $MN \cdot EQ = OP \cdot ER$. Ma $EQ = SR$, ed $ER = SQ$ per l'ipotesi; dunque $MN \cdot SR = OP \cdot SQ$; dunque il settore SNM è uguale al settore OSP; dunque nell'istessa ipotesi degli antichi, prendendo due archi MN, OP descritti da un pianeta in tempi eguali, si avranno nel punto S delle aree uguali.

475. Dall'impiegare un pianeta più tempo nel suo afelio a scorrere un medesimo arco, il Keplero in generale conchiuse, che quanto più un pianeta è lontano dal centro del sole, tanto più debolmente viene animato dalla forza motrice, che lo fa girare intorno al sole, come si è verificato dopo la scoperta della legge d'attrazione.

476. Passando il Keplero alla considerazione delle orbite ellittiche, trasporta all'ellisse le proprietà ch'egli avea dimostrato per il cerchio eccentrico, senza impiegare nuova dimostrazione: perciò la legge dell'aree proporzionali ai tempi non era provata, che imperfettamente; e non poteva passare se non che per un'approssimazione comoda, facile nella pratica, e giustificata dall'accordo del calcolo coll'osservazione. Ma considerando le orbite planetarie come risultanti dal concorso di due forze e di due direzioni differenti, di cui l'una sia per sua natura uniforme e costante, allora le aree diventano necessariamente e rigorosamente proporzionali ai tempi, come lo dimostreremo or ora (480).

477. In oggi si dimostra egregiamente coll'osservazione dei diametri del sole, che le aree sono proporzionali ai tempi verso gli abissi, o ciò ch'è lo stesso, che il moto del sole è tanto più lento, quanto è più lontano dalla terra. Il diametro del sole è di 31' 31" in estate, e di 32' 36" in inverno secondo le osservazioni da me fatte colla maggior cura; questo prova che la distanza del sole in inverno è a quella d'estate come 31' 31" sta a 32' 36"; poichè le grandezze apparenti d'un oggetto lontano sono in ragion inversa delle sue distanze: il moto orario del sole
in

in inverno è di $2' 33''$; ora $32' 36'' : 31' 31'' :: 2' 33'' : 2' 28''$; perciò il moto orario del sole dovrebbe essere di $2' 28''$ in estate, se questo moto orario fosse in se stesso costante ed uniforme, e le sue differenze non dipendessero che dalla sola lontananza dal sole; non ostante per l'osservazione questo moto orario non si trova che di $2' 23''$, più piccolo di quello dovrebbe essere in tal supposizione. Dunque oltre li $5''$ di differenza che vi deve essere tra i moti orarj del sole in estate e in inverno a cagione delle sue differenti distanze, vi è ancora una differenza reale di $5''$, che non proviene dalle distanze, ma ch'è un vero rallentamento nel moto apparente del sole; dunque il moto reale della terra effettivamente si rende più lento nell'afelio che nel perielio. Si vede anche che questo è in ragion inversa delle distanze; poichè si trovano $2' 23''$ in vece di $2' 28''$ come sarebbe supposto il moto uniforme; che vuol dire $5''$ per l'eccesso del moto orario in inverno sopra il moto orario in estate, indipendentemente da $5''$ che vi devono essere a cagione della distanza del sole minore in inverno; ora $2' 23''$ sta a $2' 28''$, come $31' 31''$ a $32' 36''$, cioè, come il diametro in estate al diametro in inverno, o sia come la distanza in inverno alla distanza in estate; dunque il moto del sole in estate è al moto, che parrebbe avere se camminasse uniformemente, in ragion inversa della sua distanza.

478. La legge dell' aree proporzionali ai tempi essendo stata dimostrata dal Keplero per il caso dell' afelio e del perielio, e verificata insieme per l'accordo generale che si trova tra le osservazioni ed il calcolo dedotto da questa legge, si potrebbe prendere come provata astronomicamente non essendosi per anche trattato delle cagioni che devono produrre questa legge. Non ostante si dimostrerà in poche parole, 1.^a che i pianeti girano intorno al sole in virtù d'una forza centrale o attrattiva, diretta al fuoco dell' ellisse; 2.^a che supposta una volta questa forza, ne segue che le aree sono proporzionali ai tempi: sarà questa una cognizione elementare, che preparerà il lettore alla fisica celeste, di cui si tratterà nel libro XII.

479. La prima legge del moto provata dall' esperienza, e ammessa da tutti i matematici, anche al tempo di Anassagora, è, che un corpo che percorre una linea retta uniformemente nello spazio d' un minuto, percorrerebbe un' altra linea retta colla stessa direzione nel minuto seguente se niente non vi si opponesse. Perciò il pianeta P (fig. 54) essendo andato una volta uniformemente da P in Q sopra la linea retta PQ, continuerebbe a muoversi da Q in F coll' istessa direzione PQF, percorrendo uno spazio QF uguale a PQ, uniformemente, e nello stesso spazio di tempo. Pure i pianeti descrivono delle ellissi e non delle rette; curvano incessantemente la loro via verso la parte del sole, e ritornano dopo una rivoluzione per la stessa via alla stessa distanza dal sole. Vi è dunque nel sole una forza capace di distogliere ad ogni istante un pianeta dalla linea retta descritta nell' istante precedente. Si esaminerà la misura e la quantità di questa forza nel libro XII in cui si tratterà dell' attrazione: basta qui far vedere che questa forza centrale esiste; poichè senza di essa
i pia-

i pianeti non potrebbero descrivere se non che linee rette; nè ritornerebbero mai ai medesimi luoghi come fanno, descrivendo incessantemente una curva che circonda il sole.

La seconda legge del moto ch' io suppongo pure cognita e dimostrata perchè si trova in tutti i libri di meccanica e di dinamica, è questa: un corpo spinto ad un tempo da due forze differenti, delle quali le direzioni fanno un angolo, e delle quali ciascuna potrebbe fargli scorrere in un minuto uno de' lati d' un parallelogrammo, nel minuto medesimo descriverà la diagonale. Il pianeta arrivato in Q è spinto verso il sole secondo la direzione QS, con una forza che sola sarebbe capace di fargli percorrere in un minuto una retta come QG, mentre nello stesso istante viene sollecitato a scorrere in un minuto una linea QF uguale a PQ, in virtù della prima legge del moto: or se sopra le linee QG, QF si forma un parallelogrammo GQFR, il pianeta percorrerà la diagonale QR nello stesso minuto. Questi soli principj bastano a dimostrare, che la legge delle aree proporzionali a' tempi deve aver luogo per tutti i pianeti. Vedete a presso poco la dimostrazione del Nevvtono (*philos. natur. principia mathematica* l. I. sec. II. prop. I.)

480. Io considero un pianeta in un punto qualunque Q della sua orbita, che l'istante avanti abbia percorso qualunque minima porzione PQ di quest'orbita, che si può prendere per una linea retta: il pianeta arrivato da P in Q, ed il raggio della sua orbita essendo passato da SP in SQ, ha descritto l'area SPQ in un minuto di tempo; e dico che nel minuto seguente descriverà un'area SQR uguale ad SPQ, o sia un triangolo uguale in superficie ad SPQ, di forte che l'area descritta dal raggio vettore sarà eguale in tempo eguale. Imperciocchè se il pianeta libero avesse continuato a muoversi da Q in F avrebbe descritto un'area QSF eguale all'area PSQ, questi due triangoli essendo eguali per aver le basi PQ, QF eguali, e la medesima altezza col vertice comune. Ma per la forza centrale che trae il pianeta verso del sole, il pianeta in luogo dell'area QSF, descriverà l'area QSR: or li triangoli QSR, QSF sono ancora eguali, perchè hanno la medesima base QS, e sono compresi tra le stesse parallele FR, QS: dunque l'area QSR è parimenti eguale all'area PSQ. Resta dunque dimostrato, che la piccola area descritta nel primo minuto è uguale alla piccola area descritta nel minuto seguente; e procedendo così di minuto in minuto per tutta la durata della rivoluzione, si dimostrerà colla stessa facilità, che l'istesso pianeta descriverà eternamente l'istessa area nell'istesso tempo, a qualunque distanza dal sole che sia; quando non arrivasse una forza straniera a turbare l'uguaglianza tra QF e PQ, cioè tra la linea che un pianeta ha percorso, o quella che tende a percorrere nel minuto seguente.

481. Ecco dunque la legge delle aree proporzionali ai tempi provata non solamente per l'osservazione, o sia per l'accordo generale dei calcoli fondati sopra questa legge colle osservazioni, ma ancora per la natura istessa delle due forze, che animano i pianeti. Passeremo dunque a calcolare il moto de' pianeti nell'orbite ellittiche, per poter assegnare in ogni

ogni tempo il punto della sua orbita in cui deve il pianeta trovarsi in virtù della precedente legge.

Del moto ellittico.

481. DEFINIZIONI. Il raggio vettore d'un pianeta è la linea tirata dal centro del sole al centro del pianeta, o sia la distanza del pianeta dal foco della sua ellisse. Sia $AMDP$ (fig. 55) l'orbita ellittica d'un pianeta intorno al foco S , sito del sole (468), M il luogo attuale d'un pianeta per un istante dato: la linea SM sarà il raggio vettore.

La linea degli afidi, o sia l'asse maggiore dell'ellisse, mostra l'afelio ed il perielio del pianeta (370): l'afelio, o l'*abside superiore*, è il punto dell'orbita, ove il pianeta si trova nella maggior distanza dal sole: tal è la sommità A dell'asse maggiore AP , il più remoto dal foco S . Il perielio o l'*abside inferiore*, è il punto dell'orbita, in cui il pianeta si trova più vicino al sole: tal è l'estremità inferiore P del grand'asse AP , luogo più vicino di tutti al foco S , sito del sole.

L'ANOMALIA in generale è la distanza d'un pianeta dal suo afelio; ma ci sono molte maniere di considerare questa distanza.

L'ANOMALIA VERA è l'angolo formato nel foco dell'ellisse dal raggio vettore e dalla linea degli afidi, come l'angolo ASM , formato dall'asse maggiore AS e dal raggio vettore SM .

L'ANOMALIA ECCENTRICA si dice l'angolo formato nel centro dell'ellisse dall'asse maggiore e dal raggio d'un cerchio circoscritto, tirato all'estremità dell'ordinata che passa per il luogo vero del pianeta: come descritto un cerchio ANP sull'asse maggiore AP dell'orbita, come diametro, tirisi l'ordinata RMN per il punto M , in cui è supposto un pianeta; all'estremità N di questa ordinata menato il raggio CN , questo determinerà l'anomalia eccentrica AN , o sia ACN ; essendo lo stesso prender l'angolo o l'arco.

L'ANOMALIA MEDIA è la distanza del pianeta dall'afelio, supposto il moto proporzionale al tempo: per esempio un pianeta che impiegasse sei mesi per andare da A in P , alla fine del primo mese avrebbe 30° d'anomalia media, 60° alla fine del secondo mese, e così di seguito, crescendo sempre in proporzione del tempo. Se prendasi una linea CX , che segua e marchi il moto medio, supponendo che giri uniformemente intorno al centro C , da principio la detta linea CX sarà più avanzata della linea CN , perchè l'arco AN cresce più lentamente verso l'afelio, ove il moto del pianeta è minore del moto medio, e il più lento; e questa precedenza durerà finchè la velocità del pianeta sarà minore della sua velocità media; dopo il punto N si andrà accostando al punto X , fin che si riuniscano insieme nel perielio: ivi le tre anomalie si confondono e fanno del pari 180 gradi. La differenza tra l'anomalia vera e l'anomalia media forma l'equazione dell'orbita, o l'equazione del centro.

483. Poichè l'anomalia media è proporzionale al tempo; ed è una por-

porzione del tempo della rivoluzione, può misurarsi con ogni quantità che abbia un progresso uniforme: onde non solo l'arco AX , l'angolo ACX , e il settore o l'area circolare ACX , possono chiamarsi *anomalìa media*, ma ancora il settore ellittico, o l'area ASM , formata dal raggio vettore SM , dall'asse maggiore SA , e dall'arco d'ellisse AM : poichè, le aree descritte dal raggio vettore SM essendo proporzionali ai tempi (472), il settore AMS sarà la sesta parte della mezza superficie ellittica $AMDP$ a capo del primo mese (nell'ipotesi dell'articolo precedente); sarà il terzo a capo di due mesi, e così sempre uniformemente: di modo che la superficie, o l'area ellittica sarà questa quantità proporzionale al tempo, una frazione eguale alla frazion del tempo, vale a dire l'anomalìa media: onde si potrà dire alla fine del primo mese, che l'anomalìa media coll'area corrispondente è di 30° , o in generale la duodecima parte della rivoluzione intiera, come l'area AMS è la duodecima parte dell'area intiera dell'ellisse: ordinariamente però l'anomalìa media si esprime per gradi.

484. Avendo il Keplero trovato che i pianeti descrivevano delle ellissi con aree proporzionali ai tempi, non restava altro che determinare il luogo vero d'un pianeta per un tempo dato. Quando si conosce la rivoluzione del pianeta, per esempio, di mercurio, che è di 86 giorni, e si chiede il luogo di mercurio a capo di due giorni, o sia della 43.^{ma} parte della sua rivoluzione, già si sa che l'area del settore ASM , compresa tra l'afelio ed il raggio vettore SM , è la 43.^{ma} parte della superficie dell'ellisse: tal porzione di tempo, e tal porzione d'ellisse è propriamente l'*anomalìa media* che si può esprimere in gradi, prendendo la parte 43.^a di 360° , o sia dell'intero cerchio: poichè s'è veduto che si può chiamare indifferente *anomalìa media*, una porzione di tempo, una porzione d'ellisse, una porzione di circonferenza di cerchio: sempre è una frazione data quando si cerca il luogo d'un pianeta; ma noi qui dopo la prenderemo in gradi, per seguire la forma usitata delle tavole astronomiche, nelle quali tutte le anomalie, e tutte le equazioni, s'esprimono in gradi, minuti, secondi.

485. Conoscendo l'anomalìa media, o la superficie del settore ASM , la questione è di trovare l'anomalìa vera, o sia l'angolo ASM di questo settore. Il Keplero sentì bene la difficoltà di questo problema: data l'*anomalìa media*, trovar l'*anomalìa vera*, anche in un cerchio, poichè la difficoltà è appresso poco l'istessa che nell'ellissi: si contentò d'effortare i geometri a cercarne la soluzione, senza speranza che si potesse trovare con maniera diretta, perchè suppone, come si vedrà or ora, il rapporto tra gli archi e i seni loro, che non è dato se non che per approssimazione.

486. Per facilitare la soluzione di questo problema, s'inverte la questione, e si suppone cognita l'anomalìa vera per dedurne l'anomalìa media: questa maniera riesce più breve, spesso più esatta, e nella pratica supplisce sempre al metodo diretto. Tal metodo indiretto è stato con successo impiegato dal Sig. De la Caille nelle sue ricerche sopra il sole: il metodo è fondato sopra i due teoremi seguenti, che si dimostrano in modo semplicissimo.

487. LEMMA I. In un'ellisse AMP , a cui sia circoscritto un cerchio ANP , CX essendo la linea dell'anomalia media (482), M il luogo vero del pianeta, RMN l'ordinata che passa per il luogo del pianeta; il settore circolare ANS sarà sempre uguale al settore circolare ACX dell'anomalia media.

DIMOSTRAZIONE. Sia T il tempo intero della rivoluzione del pianeta, e t il tempo che impiega per passare da A in M , per la regola delle aree proporzionali ai tempi, farà t a T , come il settore ASM alla superficie dell'ellisse. Parimenti, essendo ACX l'anomalia media, farà t a T come ACX alla superficie del cerchio. Dunque ASM è ad ACX come la superficie dell'ellisse è alla superficie del cerchio; ma per la proprietà dell'ellisse, dimostrata in tutti i libri delle sezioni coniche, AMS è ad ANS , come la superficie dell'ellisse alla superficie del cerchio: abbiamo dunque due proporzioni che anno tre termini comuni vale a dire ASM , la superficie dell'ellisse, e la superficie del cerchio; dunque il termine, che sembra differente è pure uguale o lo stesso; dunque ACX ed ANS sono uguali tra loro. Ciò ch'era da dimostrare.

488. LEMMA II. In ogni triangolo rettangolo MRS (fig. 55) se l'angolo RS è diviso in due parti uguali, la tangente della metà dell'angolo RSM sarà uguale ad $\frac{RM}{R+S+SM}$. Poichè presa $SB = SM$; farà l'angolo B uguale alla metà dell'angolo S , e la tangente dell'angolo $B = \frac{MR}{RB} = \frac{MR}{R+S+SB} = \frac{RM}{R+S+SM}$.

489. LEMMA III. Il raggio vettore SM è uguale a $\frac{PR \cdot SA}{CA} = SR$; e facendo $CA = a$, $CR = x$, $CS = e$, farà il raggio vettore $SM = \frac{a^2 + x^2}{a + x} = a + \frac{x^2}{a+x}$, e ciò ch'è lo stesso $= a + \frac{x^2}{a}$. Poichè per la proprietà la più cognita dell'ellisse, è

$SM + FM = 2a$: supponiamo $SM = a + x$, ed $FM = a - x$; farà RM^2 , o $Gy^2 = SM^2 - SR^2 = a^2 + 2ax + x^2 - ee - 2ex - xx = FM^2 - FR^2 = a^2 - 2ax + x^2 - ee + 2ex - xx$: ed uguagliando questi due valori, si ha $2ax - 2ex = -2ax + 2ex$; $x = \frac{ex}{a}$; dunque $SM = a + \frac{x^2}{a}$, o ciò ch'è lo stesso, $SM = \frac{PR \cdot SA}{CA} = SR$.

490. TEOREMA. La radice quadrata della distanza perielia sia alla radice quadrata della distanza afelia, come la tangente della metà dell'anomalia vera si ha alla tangente della metà dell'anomalia eccentrica.

Nei triangoli rettangoli MSR ed NCR , impiegando le espressioni ricavate dall'articolo 488, si ha questa proporzione: $\text{tang. } \frac{1}{2} MSR : \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \frac{RM}{SR+SM} : \frac{RN}{CR+CN}$; ponendosi in vece della ragione $RM : RN$, quella di $CD : CA$ ad effa eguale per la proprietà dell'ellisse; e in vece di $SR + SM$ il suo valore $PR \cdot \frac{SA}{CA}$ (489): finalmente PR in vece di $CR + CN$, la proporzione sarà cambiata in questa: $\text{tang. } \frac{1}{2} MSR : \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \frac{CD \cdot CA}{PR \cdot SA} + \frac{CA}{PR} :: CD : SA :: \sqrt{a^2 - ee} : a + e :: \sqrt{a - e} : \sqrt{a + e}$, dividendo li due ultimi termini per $\sqrt{a + e}$. Sarà dunque $\text{tang. } \frac{1}{2} MSR : \text{tang. } \frac{1}{2} NCR :: \sqrt{a - e} : \sqrt{a + e} :: \sqrt{PS} : \sqrt{SA}$; vale a dire, la tangente della metà dell'anomalia vera ASM si ha alla tangente della metà dell'anomalia eccentrica ACN , come la radice quadrata della distanza perielia PS si ha alla radice quadrata della distanza afelia AS .

401. TEOREMA II. La differenza fra l'anomalia-eccentrica , e l'anomalia media , è uguale al prodotto dell'eccentricità nel seno dell'anomalia eccentrica .

DIMOSTRAZIONE . Il settore circolare ANSA è uguale al settore dell'anomalia media ACX (487) : levando da ambe le parti la porzion comune ACN , si ha il settore NCX uguale al triangolo CNS . La superficie del settore circolare NCX è uguale al prodotto di CN nella metà dell'arco NX ; la superficie del triangolo CNS è uguale al prodotto di CN nella metà dell'altezza ST , ch'è una perpendicolare abbassata dal foco S sulla base NQ prolungata di 14 dal centro C . Perciò essendo le due superficie uguali , ed avendo uno de'producenti CN comune , sono pure uguali gli altri due producenti ; dunque l'arco NX è uguale alla retta ST ; ma nel triangolo STC rettangolo in T , si ha $ST = CS \cdot \text{sen. TCS} = CS \cdot \text{sen. ACN}$; dunque la differenza NX tra l'anomalia eccentrica AN , e l'anomalia media AX , è uguale al prodotto dell'eccentricità CS nel seno dell'anomalia eccentrica ACN .

402. Si vogliono esprimere in minuti e secondi , oltre i gradi tutte le anomalie de' pianeti . Perciò per trovare la differenza in secondi tra l'anomalia media e l'anomalia eccentrica , bisogna che l'istessa eccentricità sia espressa in secondi . Se l'eccentricità del pianeta è espressa in parti della stessa specie che la distanza media (eguale al raggio del cerchio , ch'è uguale ad un arco di 57 gradi incirca , o sia , a 206265 , 8 secondi) si avrà facilmente il numero di secondi esprimente l'eccentricità ; facendo come la distanza media espressa in qualunque numero alla frazione della medesima che esprime l'eccentricità , così 206265 , 8 , al quarto ; farà l'eccentricità espressa in secondi ; o pure basta moltiplicare quella frazione per 206265 , 8 , valor del raggio .

403. Per mezzo dei due teoremi (490 , 491) , si trova facilmente l'anomalia media quando si ha la vera : ma il problema essenziale consiste in trovare l'anomalia vera quando si ha la media , che sempre si ha . Vi sono molti metodi di pervenirvi direttamente , benchè solo per approssimazione ; ma nell'uso comune si preferisce di supporre un'anomalia vera qualunque , e di convertirla colle regole precedenti in media : se quella che si trova così non è la data , la supposizione non è esatta ; e si suppone un'altra anomalia vera , fino a che se ne trovi una che dia esattamente l'anomalia media . Le tavole già costruite per tutti i pianeti , e per ogni grado d'anomalia , rendono queste false posizioni facilissime da trovarsi quasi al primo colpo .

404. Trovata l'anomalia vera , facile è trovare la distanza dal sole o sia il raggio vettore SM per la seguente proporzione : Il seno dell'anomalia vera è al seno dell'anomalia eccentrica , come la metà dell'asse minore al raggio vettore . Imperciocchè tirata la linea NQ (fig. 55) parallela al raggio vettore MS , per li triangoli simili si ha questa proporzione , $SM : QN :: RM : RN :: CD : CK$, o CN ; dunque $SM : CD :: QN : CN :: \text{sen. QCN} : \text{sen. QCN} :: \text{sen. RCN} : \text{sen. RSM}$; dunque $\text{sen. CSM} : \text{sen. NCS} :: CD : SM$; ch'è il raggio vettore nell'ipotesi del Keplero ; e questa è la proporzione di cui io mi son valso per calcolare le mie Tavole delle distanze dei pianeti per ciascun grado d'anomalia .

405. L'ipotesi ellittica semplice , di cui si fa uso quando non si ha bisogno d'un certo rigore , semplifica sommamente il calcolo , facendo trovare l'anomalia vera con una semplice proporzione . Il Bullialdo nel 1645 fece vedere , che il moto d'un pianeta nella sua orbita ellittica pare sensibilmente uniforme supposto vederli dal foco superiore F dell'ellisse . Setto

War-



Del Dni: abc la semisoma de' lati ab & bc
 si ha alla loro semidifferenza, come la
 tang: della semisoma: Detti ang: adjacenti
 a , e alla tang: della loro semidiff:

si prende in direzione l' ab $bg = bc$. Centro b si descriva
 q'd, e si conduca ed . L'ang: gbc $\hat{=}$ $bac + bca$, e la me-
 tà di lui bdc sarà $= \frac{1}{2} bac + \frac{1}{2} bca$; ma d' già $= a$ dca
 + dca , dunque questi due ang: sono $=$ alla semisomma
 l' abc a b , e dca ; onde dca sarà $=$ alla loro semidiff: Onde
 $bcd = bdc$ sarà la semisoma: Detti ang: dell' a dca la loro
 semidiff: Centro c , raggiu' ed si faccia l'arco gde , e s'
 attino la tang: l'ata df , de . E' chiaro che ga dca $= \frac{1}{2} ga$
 dca come la semisoma alla semidiff: de' lati: $gc = fd$. De, tan-
 genti della semisoma: e, semidiff: Detti angoli: Detti: § 495

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document, written on aged, yellowed paper. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a different language or dialect. The paper is placed on a blue background.



Wardo, nel 1656 diede un metodo assai semplice per calcolare l'anomalia vera in questo caso. Si prolunghi FL (fig. 56) tanto che LE sia eguale ad LS , e si tiri SE ; si avrà un triangolo SFE , in cui, per la proprietà ordinaria, la mezza somma de' due lati, come FE , FS , si ha alla loro semidifferenza come la tangente della semisomma degli angoli adjacenti S , E , si ha alla tangente della loro semidifferenza. Sostituiscansi altre denominazioni in luogo di questi quattro termini: la mezza somma di FE e di FS è l'istessa cosa che la distanza afelia SA ; poichè FE , o sia FL con LS è uguale all'asse maggiore: dunque FE con FS è uguale all'asse maggiore con due volte l'eccentricità; e prendendo la metà del tutto, la mezza somma di FE e di FS si trova esser il semiasse coll'eccentricità, cioè SA : facilmente si vede, che la loro semidifferenza è uguale ad SP . La mezza somma degli angoli E ed S è la metà dell'angolo esterno AFE , o sia dell'anomalia media; e finalmente la loro semidifferenza è la metà dell'anomalia vera FSL , poichè la differenza tra l'angolo FSE e l'angolo LSE ($= LES$) non è altro che FSL . Dunque la precedente proporzione si riduce a questa: la distanza afelia si ha alla distanza perielia come la tangente della metà dell'anomalia media è alla tangente della metà dell'anomalia vera.

Il raggio vettore SL si trova colla stessa facilità, col mezzo del triangolo SLF , facendo: il seno dell'equazion dell'orbita FLS si ha alla doppia eccentricità FS , come il seno dell'angolo F , o dell'anomalia media, è alla distanza del pianeta dal sole, nell'ipotesi ellittica semplice.

Dell'Equazione dell'orbita.

496. Considerando la fig. 56, si possono rilevare tutte le proprietà del moto ineguale de' pianeti, e dell'equazione dell'orbita: 1.^a quest'equazione è nulla in A , o sia nell'abside superiore (l'afelio, o l'apogeo), poichè verso quel punto si confondono il luogo medio e il luogo vero, e coincidono le linee FL , SL . Quando si dipartono dall'abside superiore, si dilungano, e la loro distanza cresce rapidamente, perchè la velocità vera essendo minima in A , differisce ivi più che altrove dalla media; 2.^a questa differenza si accumula ciascun giorno finchè la velocità vera è minore della media; quando diventano uguali, vi è un punto B , verso tre segni e qualche grado d'anomalia media, ove la differenza dell'anomalia media dalla vera avendo sempre cresciuto diviene massima, e l'equazion del centro FLS cessa di crescere, restando quasi la stessa per qualche tempo, diminuendo poscia fino all'abside inferiore (il perielio, o il perigeo) in cui il luogo medio e il luogo vero per la seconda volta si trovano d'accordo: 3.^a l'equazione è sottrattiva, cioè si sottra dal luogo medio, o dall'anomalia media $AF L$, nei sei primi segni, per avere il luogo vero, perchè la velocità media partendo dall'abside superiore è maggiore della velocità vera, onde il luogo medio è più avanzato del vero; e però dalla longitudine media contiene sottrarre la quantità dell'

equazione per aver il luogo vero. Il contrario si fa dopo il passaggio in P, ove la velocità vera è la più grande.

497. L'equazione massima può ritrovarsi con un calcolo rigoroso, come anche il grado d'anomalia media ove succede questa massima equazione; basta ritrovare il punto M (fig. 57) in cui cade veramente la velocità media. Poichè quando il pianeta è arrivato al punto, in cui la sua velocità angolare DFR (o sia l'angolo ch'ella percorre veduta dal sole) è uguale alla velocità media (per esempio $59' 8''$ per giorno parlando della terra) la longitudine media cessa di più anticipare sulla vera; la differenza allora è massima, perchè fino a questo momento la velocità reale essendo minore, faceva ritardare ogni giorno il luogo vero sul medio; e questi ritardi sono qui accumulati: ma quando la velocità reale è diventata uguale alla media, già in atto di superarla avvicinandosi al perielio, comincia a riacquistare ciò che avea perduto fin allora, il luogo vero si accosta al medio, e l'equazione dell'orbita scema. Perciò tutta la difficoltà consiste in trovare il punto M, e l'anomalia vera AFM del pianeta nel momento che la sua velocità reale si fa uguale alla velocità angolare media. A quest'oggetto, prendendo una linea FM, media proporzionale tra i due semiasse dell'orbita, dal foco F come centro si descriverà col raggio FM un cerchio MN, questo cerchio avrà una superficie uguale a quella dell'ellisse, come si dimostra nelle sezioni coniche. Fingiamo un corpo che descriva il cerchio MN in un tempo eguale a quello della rivoluzione del pianeta nella sua ellisse; la sua velocità angolare sarà costantemente uguale alla velocità angolare media del pianeta, per esempio di $59' 8''$ per il sole (o la terra); l'area descritta nel cerchio sarà sempre uguale all'area descritta nello stesso tempo nell'ellisse, poichè le aree totali sono uguali e percorse in tempi uguali, le durate delle rivoluzioni sono le stesse, le aree parziali dell'ellisse proporzionali alle parti del tempo: per esempio se il sole in un giorno scorre un'area DFR della sua ellisse uguale alla 365^a parte della superficie ellittica, l'area EFO descritta nel cerchio sarà pure la 365^a parte dell'area del cerchio (eguale all'ellisse): la velocità vera del sole (o sia l'angolo DFR) sarà dunque uguale alla velocità media in M, cioè all'angolo DFO; poichè sono due settori uguali che anno la medesima lunghezza FM, la medesima superficie, e per conseguenza lo stesso angolo. Del resto i due triangoli uguali MED, MRO, che sono uno fuori, l'altro dentro del cerchio, fanno vedere, che il settore ellittico è uguale al settore circolare, che ha l'istesso angolo in F. Perciò affine di trovare la velocità media, bisogna trovare l'intersezione M dell'ellisse, e del cerchio suo uguale. A tal fine dal punto M all'altro foco B dell'ellisse tirando una linea MB, si avrà il triangolo BFM, in cui si conoscono tre lati, cioè BF, doppio dell'eccentricità, FM media proporzionale tra i due semiasse, e BM differenza tra FM e l'asse maggiore (perchè le due FM, MB, ne fanno il valore): perciò risolvendo il triangolo BFM, si cercherà l'angolo F, ch'è l'anomalia vera del pianeta al tempo della massima equazione. Per esempio se il semiasse GA = 38710, li se-

il femiasse conjugato $\equiv 37883$, com'è nell'orbita di mercurio; si avrà $CF = 7960$, $BF = 15920$; FM sarà $\equiv 38294$; e risolvendo il triangolo BFM , si avrà l'angolo BFM di $81^{\circ} 4' 32''$; è questa l'anomalia vera al tempo della maggiore equazione; da cui si può concludere l'anomalia media (493) di $104^{\circ} 43' 41''$; e perciò la loro differenza, ch'è l'equazione del centro, sarà $23^{\circ} 40' 49''$; e questa dev'essere l'equazione massima dell'orbe di mercurio.

498. Dopo d'aver indicato la maniera di calcolare l'equazione si parlerà della maniera d'osservarla. Se si anno due longitudini vere d'un pianeta osservato in G ed in M , differiranno tra loro di tutto l'angolo GFM , somma delle due anomalie vere; ma la somma di due anomalie medie ABM , ABG , sarà maggiore, del doppio dell'equazione, poichè ogni distanza vera è minor della media per la quantità dell'equazione massima. È facile in ogni tempo calcolare la somma di due anomalie medie, se anche non si conosce il luogo dell'afelio A , perchè la somma di due anomalie medie è uguale al moto medio del pianeta in tal intervallo di tempo, e facilmente si trova conoscendo la durata della rivoluzione. Perciò l'eccesso del moto medio calcolato, sopra il moto vero osservato, dà il doppio della maggior equazione, purchè queste due osservazioni siano fatte in M ed in G , o sia ne' due tempi della velocità media.

499. Se la prima osservazione si prende avanti il perielio, e la seconda dopo, allora sarà maggiore il moto vero, come nel seguente esempio (500). Per discernere poi i tempi, e le osservazioni convenienti, a questa ricerca, un osservatore isolato, che non conoscesse in alcun modo la situazione dell'orbita del pianeta, e de' punti G , M , basta che raccogliesse un gran numero di posizioni osservate, che le comparasse due a due, osservando di quanto il moto vero osservato differisce dal moto medio calcolato per ogni intervallo: la maggior di queste differenze darebbe il doppio della maggior equazione. In oggi, che appresso poco si conoscono i luoghi degli abissi e delle medie distanze di tutti i pianeti, si vedono tosto le osservazioni avanti e dopo l'afelio verso il tempo della massima equazione, come nel seguente esempio.

500. ESEMPIO. Li 7 Ottobre 1751 il luogo vero del sole osservato dal Sig. Ab. De la Caille, avanti del perigeo, facendovi entrare tre giorni d'osservazioni discusse e comparate tra loro, fu trovato di $6^{\circ} 13' 47'' 15''$ li 28 marzo 1752 la longitudine vera fu di

o 8 9 26

la differenza di longit., o il moto vero del sole fu dunque 5 24 22 21
il moto medio in tal intervallo per il calcolo doveva essere 5 20 31 43

La differenza, o il doppio dell'equazione massima o 3 50 28
La metà, o sia l'equazione dell'orbita o 1 55 14

Un gran numero d'osservazioni l'anno fatta stabilire di

10 55' 32"

501. Per

301. Perchè egli è sommamente raro d'aver due osservazioni fatte precisamente nei punti M, G, della velocità media, difficilmente per un primo calcolo si trova esattamente la quantità dell'equazione massima. Ma quando si ha trovato appresso poco l'equazione ed il luogo dell'abside (306), si calcola per li due tempi d'osservazione l'equazione dell'orbita e l'equazione massima; si fa allora quanto l'equazione data dall'osservazioni doveva differire dalla massima; in questo modo il Sig. De la Caille nell'esempio precedente trovò $18''$, 6; che si dovevano aggiugnere per aver la vera quantità dell'equazione massima, risultante da queste due osservazioni.

302. Puòsi anche trovare l'equazione massima senza conoscere il luogo dell'abside: basta prendere per epoca qualunque longitudine, e comparare con questa molte altre longitudini per avere il moto vero osservato colla durata cognita della rivoluzione si calcolerà per ciascuno di questi intervalli il moto medio, si avranno delle differenze additive, e delle differenze sottrattive: sommando le due maggiori differenze additive e sottrattiva, si avrà il doppio dell'equazione massima dell'orbita, quando le osservazioni siano in tanto numero, che vi cadano i due punti della massima equazione.

303. Trovata colle osservazioni l'equazione massima, per concludere l'eccentricità, il più comodo è valersi d'una regola di falsa posizione, o supporre cognita l'eccentricità per concluderne la massima equazione: (497). Se si trova maggior della veta, si diminuisca la supposta eccentricità e si ripeta il calcolo: questo metodo di determinare l'eccentricità per mezzo dell'equazione massima riesce spesso più comodo di quello adoprato dal Keplero per trovare l'eccentricità di marte (468).

304. Il metodo da me adoprato per trovare l'eccentricità di mercurio, consiste in supporre che il luogo dell'afelio sia cognito (308): allora due osservazioni lontane tra loro intirca mezza la rivoluzione, e lontane quanto è possibile dai due abissi, bastano per trovare l'eccentricità. In fatti conoscendo bene il luogo dell'afelio si anno due anomalie vere ben cognite; si convertono in anomalie medie: queste non possono esser esatte se l'eccentricità non sia giusta. Se dunque la differenza delle due anomalie medie ritrovate non è uguale a quella che si conosce per l'intervallo delle due osservazioni, si vede che l'eccentricità impiegata è difettosa, e si fa un'altra supposizione. Con simili tentativi si perviene a trovare l'eccentricità che soddisfa alle due osservazioni scelte.

305. Per trovare l'eccentricità di mercurio e di venere, s'impiegano anche le digressioni massime. Sia la terra in B (fig. 50), mercurio in C nella maggior digressione e nell'afelio; l'angolo SBC ben osservato

fa concludere la distanza: afelia S C di mercurio dal sole . Si fa una si-

	Eccentricità	Equazioni.
Q	7960	23° 40' 49"
Q	510	0 48 30.
Q	1680	15 55 38
Q	14808	10 48 47
Q	25277	5 34 15
Q	53210	6 23 19.
Q	0,0549	6 18 32.

mile operazione in una digressione in cui mercurio si trovi nel perielio , concludendo la sua distanza perielia : la differenza delle due distanze è il doppio dell' eccentricità . Io ho adoprato questo metodo nella mia teoria di mercurio (*Mém. Acad.* 1767 p. 344). La tavola qui aggiunta è il risultato di tutti i miei calcoli sopra i pianeti : suppone la distanza media della terra dal sole 100000 , eccetto la luna , che suppone per la distanza media l' unità .

Determinazione degli Afelij.

306. L' Afelio d' un pianeta si può determinare con diversi metodi. Questo è il più diretto ; ha servito principalmente per il sole , ma può servire anche per li pianeti superiori . Avendo molte osservazioni d' un pianeta , fatte in differenti punti della sua orbita , e ridotte al sole , conviene cercare quelle che danno due longitudini eliocentriche diametralmente opposte ; se i tempi di queste osservazioni differiscono esattamente di mezza rivoluzione , è certo , che queste due osservazioni sono una nell' afelio l' altra nel perielio : onde comparando due a due un gran numero d' osservazioni , non si potrà a meno d' incontrare quelle che mostreranno il luogo degli abfidi . Sia l' afelio A (*fig. 38*) , il perielio P ; la parte ABP dell' ellisse è uguale alla parte AFP ; l' una e l' altra viene percorsa nel tempo della mezza rivoluzione , per esempio in 2828 15^h 7' 40["] trattando del sole . S' intende qui la rivoluzione anomalistica (515) o sia rapporto all' apogeo ; ma per una prima approssimazione basterebbe la rivoluzione tropica (454) supponendo per una mezza rivoluzione l' afelio immobile . Se si prende un altro punto qualunque D coll' opposto punto E , la parte DPE dell' ellisse porterà meno di tempo che la parte EFD , perchè quella inchiude il perielio , cioè il luogo del più rapido moto , e questa contengono l' afelio sito del moto più lento . Perciò i punti A , P , de' due abfidi sono i soli , che diametralmente opposti , facciano due intervalli eguali di tempo . Si cerchino dunque come si è detto . Così ha operato il Keplero nel suo libro de *Stella Martis* .

307. Si può anche trovare l' afelio per due osservazioni , delle quali una sia verso gli abfidi , l' altra verso le distanze medie , purchè sia ben cognita l' equazione del centro ; poichè fatta una supposizione per il luogo dell' afelio , e convertendo le due anomalie vere che ne risultano in anomalie medie , la differenza non potrebbe esser eguale all' equazione cognita senza che l' afelio fosse ben determinato .

308. Il terzo metodo è particolare per mercurio e venere ; l' ho dato nelle memorie dell' Accademia 1766 . Suppongo che si sia osservata la mag-

maggior digressione di mercurio in tempo che si trovi verso le medie distanze dal sole, ed il raggio vettore o la distanza si cambi rapidamente; conoscendo già la media distanza e l'eccentricità, facilmente si calcola il luogo dell'afelio purchè il raggio in cui si trova il pianeta sia precisamente della lunghezza conveniente alla distanza osservata. Sia F (fig. 58) il luogo di mercurio nella sua media distanza, veduto dalla terra T sul raggio TF che tocca l'orbita. La massima digressione è allora l'angolo STF , e la distanza afelia ASF . Se nelle tavole, di cui facciam uso, il luogo dell'afelio fosse mal indicato, come se fosse in D ; facendo avanzare il punto D in A , la linea SF arriverebbe in SG , e l'elongazione di mercurio sarebbe uguale all'angolo STG , in conseguenza più grande di STF . Se dunque per il calcolo delle tavole si è trovato un'elongazione troppo piccola, basta avvicinare l'afelio al luogo dell'osservazione lasciando sempre mercurio nell'istessa longitudine, o sull'istessa linea SF , o se vuolsi conservando l'istessa longitudine media. Ai 24 Maggio 1764 a $8^h 7' 50''$ tempo medio, osservai la longitudine di mercurio di $2^s 26' 50'' 35''$, ed era allora nella sua massima digressione a $22^s 51' 22''$ dal sole, e il raggio visuale toccava l'orbita alla distanza media verso $9^s 8''$ d'anomalia; calcolai questa longitudine sulle tavole del Sig. Halley, e la trovai troppo grande di $1' 14''$; ma aumentando in queste tavole la longitudine dell'afelio di $14' \frac{1}{2}$, senza cambiare la longitudine di mercurio, l'anomalia diventava minore, e così il raggio vettore; l'elongazione istessa di mercurio minorava, e la longitudine di mercurio s'accordava coll'osservazione (Mem. Acad. 1766). Risulta che la longitudine dell'afelio nelle tavole dell'Halley era troppo piccola; perciò io l'ho supposta di $8^s 13' 49' 30''$ per il 1764. Avendo calcolato nell'istessa maniera le 16 osservazioni antiche di mercurio, ho scoperto, che si dovevano levare molti gradi al luogo dell'afelio indicato dalle tavole per quei tempi.

Metodo per correggere in una volta i tre elementi d'un' orbita.

309. Si sono veduti separatamente i metodi che si possono tenere per trovare l'equazione e gli abissi d'un pianeta (498, 506); raccogliendo ora lo spirito di questi metodi si può estrarre la maniera di trovare con tre osservazioni i tre elementi d'un'orbita, vale a dire l'eccentricità, il luogo dell'afelio, e l'epoca del luogo medio che ne risulta necessariamente: suppongo le tre osservazioni ridotte al sole, e contate sull'orbita istessa del pianeta; suppongo anche i tre elementi cognitivi all'incirca.

Per ben sentire lo spirito di questo metodo, richiamerò qui tre cose che devono esser familiari a tutti quelli che esercitano il calcolo astronomico; 1°. l'equazione dell'orbita è la più grande che sia possibile, verso i tre segni e alcuni gradi d'anomalia media, ivi è al suo *maximum*; a pena cresce passando da un grado all'altro, di modo che l'anomalia media può esser allora più o meno grande senza che l'equazione ne sia al-

tera-

terata, e però in questi casi si potrebbe fallare il luogo dell'afelio, senza che ne risultasse errore sull'equazione e sulla longitudine calcolata. 2^o. l'equazion dell'orbita, o sia la differenza tra la longitudine media e la vera, è additiva dal perielio fino all'afelio, o sia nei sei ultimi segni d'anomalia; è sottrattiva dall'afelio al perielio, cioè si deve sottrarre dalla longitudine media per ottenere la vera. 3^o. il moto medio d'un pianeta nello spazio d'una o due rivoluzioni è assai cognito per poterle sempre supporre esatto; poichè i moti medj si determinano per il confronto delle osservazioni più antiche; però non vi può essere errore sensibile nello spazio di pochi anni; dal che risulta che se l'error dell'epoca o della longitudine media d'un pianeta è conosciuto per un punto della sua orbita, lo è egualmente, ed è il medesimo per tutti gli altri punti; non fa che combinarsi cogli errori che provengono dagli altri elementi, senza che questo error dell'epoca preso in se stesso sia differente.

510. Se vi fossero due osservazioni fatte precisamente nelle distanze medie, o sia, a tre e nove segni d'anomalia media, sarebbe facile correggere, 1^o, l'epoca dei moti medj, e 2^o, l'equazion del centro: Imperciocchè se l'equazion del centro è buona (quella data dalle tavole) non vi sarà tra il calcolo e l'osservazione altra differenza che quella dell'epoca dei moti medj, mentre il luogo dell'afelio punto non influisce nel calcolo delle longitudini prese verso le medie distanze. Se non v'è altro errore che quello dell'epoca sarà lo stesso in ambe le osservazioni, poichè supponesi il moto medio ben cognito. Perciò trovandosi eguale l'error delle tavole a 3 e 9 segni d'anomalia, sarà una prova che l'equazion del centro sia esatta; ma che l'error de' due calcoli proviene unicamente dall'epoca della longitudine male stabilita.

511. Se anche l'equazion del centro fosse difettosa, l'error sarebbe diverso perchè a 3^o d'anomalia si sottra, a 9^o si aggiugne; onde nell'un caso crescerà l'error dell'epoca, nell'altro lo scemerà; perciò l'error totale sarà più grande in una osservazione che nell'altra, e ciò pel doppio dell'errore che vi sarà stato nell'equazione del centro.

512. Se, per esempio, l'error dell'epoca è — 5', cioè, se nell'epoca delle tavole vi sono 5' di più, e se l'error della massima equazione è — 2', questi due errori si sommeranno a 9^o d'anomalia media, perchè ivi l'equazione è additiva, aggiugnendosi 2' di troppo per l'equazione, e 5' per l'epoca troppo avanzata; perciò la longitudine calcolata avrà 7' più del dovere. All'opposto verso 3^o d'anomalia non vi faranno che 3' di più, perchè l'equazione eccedente di 2' è sottrattiva, e si avrà sottratto 2 di troppo; onde l'error 5' dell'epoca resterà 3'. Dunque la differenza tra questi due errori delle tavole 7' e 3', ch'è 4', sarà il doppio dell'error 2' dell'equazione. Ecco trovato l'error dell'equazione e dell'epoca: facile è poi trovar quello dell'afelio, correggendo in seguito un'osservazione vicina all'afelio stesso in modo che non ci resti più altra differenza che quella proveniente dall'error commesso nella posizione dell'afelio.

513. Se anche le tre osservazioni non fossero esattamente nei punti
S indi-

indicati, farebbe facile con piccoli cangiamenti fatti a ciascun dei tre elementi, di trovare le quantità necessarie per soddisfare alle tre osservazioni: *Astronomie art.* 1293.

514. La teoria dell'attrazione prova che gli abissi de' pianeti non sono sempre nel medesimo punto del cielo, e lo provano senza contraffo le osservazioni di marte. Avendo discusso diligentemente tutte le osservazioni antiche e moderne, ho trovato il progresso annuo degli abissi come nella tavola qui posta. Non vi sarebbe per ciascun pianeta che $10^{\circ} 23' 14''$, se gli abissi fossero veramente fissi, cioè, se non soffrissero altro cambiamento di longitudine che quello proveniente dalla precessione degli equinozj ch'è puramente apparente.

	Longitudine dell' afelio 1750.	moto secolare dell'afelio.
<i>Mercurio</i>	$1^{\circ} 13^{\circ} 33' 3''$	$10^{\circ} 57' 40''$
<i>Venere</i>	$10^{\circ} 8' 13'' 0$	$4^{\circ} 10' 0$
<i>Terra</i>	$9^{\circ} 6' 38'' 4$	$1^{\circ} 49' 10$
<i>Marte</i>	$5^{\circ} 1' 28'' 24$	$1^{\circ} 51' 40$
<i>Giove</i>	$6^{\circ} 10' 22'' 31$	$1^{\circ} 43' 20$
<i>Saturno</i>	$8^{\circ} 29' 53'' 30$	$2^{\circ} 23' 20$

515. La rivoluzione d'un pianeta rapporto al suo abisse, il tempo che impiega a ritornarvi, cioè l'intervallo d'un passaggio all' altro per il suo afelio si chiama *rivoluzione anomalistica*, perchè l'anomalia ricomincia ad ogni passaggio per l' abisse. Questa rivoluzione anomalistica è un poco più lunga della rivoluzione tropica, rapporto agli equinozj, per l'avanzamento degli abissi in conseguenza dei segni.

Se il luogo dell' abisse della terra fosse fisso nel cielo, la rivoluzione anomalistica sarebbe eguale alla rivoluzione siderale, di cui s'è veduto la determinazione (321). Ma perchè l'apogeo del sole ha un piccolo moto secondo l'ordine dei segni, come le osservazioni sembrano provarlo in consenso della teoria, bisogna paragonare due passaggi del pianeta per il suo afelio, e non due ritorni all' istessa stella, o due passaggi per l'equinozio (454); così si troverà la rivoluzione anomalistica del sole di giorni 365 6^h 15' 20" $\frac{1}{2}$ maggiore di 6' 9" della rivoluzione siderale.

Dei nodi, e delle inclinazioni dei pianeti.

516. Quando un pianeta non ha veruna latitudine veduta dalla terra, non ne può aver veduta dal sole; allora è nel suo nodo, essendo nel piano dell'eclittica. Basta dunque allora osservare la longitudine geocentrica del pianeta, per concludere la longitudine veduta dal sole (442), e questo farà il luogo del nodo.

Si possono anche impiegare a tal fine due osservazioni fatte a distanze uguali dai nodi: se le due latitudini eliocentriche si trovano eguali, il medio delle due longitudini eliocentriche farà il luogo del nodo supponendolo fisso nell'intervallo delle due osservazioni.

517. Il nodo di mercurio e di venere si determina coi loro passaggi sul sole, che necessariamente succedono presso i nodi (337).

518. Do-

518. Dopo che si osservano attentamente i nodi dei pianeti, si riconosce, che tutti anno un moto retrogrado insensibile nello spazio d'alcuni

	Inogo del nodo nel 1750.	moto annuo.
<i>Mercurio</i>	1 15° 21' 15"	45"
<i>Venere</i>	3 14 26 18	31
<i>Marte</i>	1 17 36 30	40
<i>Giove</i>	3 8 16 0	60
<i>Saturno</i>	3 21 31 17	30

anni, ma che nello spazio d'un secolo non ha potuto sfuggire agli astronomi: questo moto è una conseguenza necessaria dell'attrazione degli altri pianeti, come l'ho io dimostrato in dettaglio nelle *Memorie* 1758, 1761; se ne vedrà la ragione quando si parlerà degli effetti dell'attrazione (1063). Ecco la quantità di questo moto prefo dalle mie nuove tavole, colla posizione del nodo per il 1750.

519. Il moto del nodo d'un pianeta è il risultato dell'attrazione di tutti gli altri pianeti, mentre non ve n'è alcuno che non influisca più o meno sul nodo di tutti gli altri. Ma come questo moto, ch'è uniforme sull'orbita del pianeta che lo produce deve rapportarsi nelle nostre tavole al piano dell'eclittica, è necessario di ridurvi tutti questi moti, che si fanno sopra orbite diverse per comporne un sol moto sull'eclittica; per questa riduzione il nodo di giove è reso diretto; perchè è naturalmente retrogrado sull'orbita di saturno che n'è la cagione principale; ma rapportato all'eclittica diventa diretto: spiegherò qui i principj di queste variazioni, perchè mi anno fatto scoprire nelle orbite de' satelliti di giove la cagione di fenomeni che parevano fino allora inespicabili.

520. Sia CB (fig. 59) l'eclittica, CA l'orbita di giove, BA l'orbita di saturno: il nodo di giove in C, e quello di saturno in B; la differenza CB è di 13° 15'; l'inclinazione C dell'orbita di giove è di 1° 19', e l'inclinazione B dell'orbita di saturno è di 2° 30'. Risolvendo il triangolo ABC, si trova AC di 26° 41', e l'angolo A, o sia l'inclinazione dell'orbita di giove sopra quella di saturno di 1° 15". Per l'effetto naturale dell'attrazione di saturno sopra giove, il punto d'intersezione A dell'orbita di giove con quella di saturno, deve retrogradare nel senso contrario al moto di giove, come si vedrà nella teoria dell'attrazione; ma l'angolo delle due orbite non si cambia. Perciò il nodo andrà da A in a, e l'orbita di giove AC passerà nella situazione ac, senza che l'angolo A soffra mutazione, i cerchi AC ed ac resteranno come paralleli nelle loro parti vicine di A a, e la loro intersezione D farà lontana dal punto A di 90°. Così il triangolo ABC si cangerà nel triangolo a B c, gli angoli A e B rimanendo costanti; il nodo C dell'orbita di giove sull'eclittica passerà in c, avrà dunque un moto diretto C c, benchè il moto A a sia stato retrogrado.

521. Perciò benchè l'azion de' pianeti gli uni sopra gli altri produca nei nodi un moto retrogrado sull'orbita del pianeta turbante, o del pianeta che per la sua attrazione produce questo moto, non ostante il moto de' nodi sull'eclittica diventa qualche volta diretto, o sia secondo l'ordine de' segni, come nel caso del nodo di giove. Ciò nasce particolar-

mente quando il pianeta che agisce, ha il suo angolo d'inclinazione B maggiore dell'angolo C del pianeta turbato. In altro caso il punto A cade a dritta del punto C, vale a dire dall'altra parte di C rapporto al punto B nella figura; e allora il moto del nodo A essendo verso l'occidente, il moto C e sopra l'eclittica CB diventa egualmente retrogrado.

Delle Inclinazioni.

522. L'*Inclinazione* d'un pianeta è l'angolo che il piano della sua orbita fa col piano dell'eclittica (427); la *latitudine eliocentrica* (438) del medesimo pianeta, quando si trova 90° da' suoi nodi, è uguale a questa inclinazione, perchè l'arco del cerchio di latitudine intercetto è la misura di quell'angolo. Per trovar dunque l'inclinazione d'un'orbita basta osservare la latitudine del pianeta, quando sia a 90° de' suoi nodi, e di ridurre questa latitudine osservata, ch'è la geocentrica, alla latitudine eliocentrica qual si vedrebbe dal sole.

523. Ma perchè quest'ultima riduzione suppone cognita la parallasse del grand'orbe, si risparmia questa condizione col seguente metodo. Si cerca un tempo, in cui il sole sia nel nodo del pianeta, cioè all'istessa longitudine, perchè allora la terra passa in T sulla linea de' nodi NST (fig. 60), ciò che rende il calcolo dell'inclinazione assai semplice. Supponiamo prima che il pianeta si trovi allora nel punto A della sua orbita distante 90° dal nodo e dal sole; si cali la perpendicolare AB sopra il piano dell'eclittica, o sia dell'orbita della terra prolungati fino al pianeta; e la linea TB sia perpendicolare alla TSN; allora le due linee AT, BT sono ambe perpendicolari alla comune sezione TSN de' due piani dell'orbita e dell'eclittica: fanno dunque tra loro l'istesso angolo dei piani, cioè un angolo eguale all'inclinazione ricercata (425): or l'angolo ATB non è altro che la latitudine istessa del pianeta veduto dalla terra (427): dunque la latitudine osservata sarà la vera inclinazione dell'orbita: ma è raro d'incontrare unite queste due circostanze, il sole nel nodo, il pianeta a 90° ; e quest'ultima condizione non vale che per li pianeti superiori. Però per ben determinare l'inclinazione de' pianeti si ha bisogno d'una regola più generale.

524. Suppongo osservata, qualunque sia, una latitudine geocentrica che il sole sia nel nodo, o presso: sia P il pianeta in qualunque punto della sua orbita, la terra trovandosi sempre in T nella linea de' nodi, opposta al sole: si cali la perpendicolare PL sul piano dell'eclittica: dai punti P, L si tirino le PR, LR, perpendicolari alla comune sezione de' due piani; l'angolo PRL sarà uguale all'angolo de' due piani, cioè all'inclinazione dell'orbita (425), l'angolo LTP sarà uguale alla latitudine geocentrica del pianeta, e l'angolo RTL uguale all'elongazione del pianeta (442); allora per la proprietà ordinaria de' triangoli rettilinei come RTL, PTL, rettangoli in R ed L, si avranno queste due proporzioni:

TL

$TL:RL::R:sen. RTL$
 $TL:PL::R:tang. LTP$ } dunque $RL:PL::sen. RTL:tang. LTP$.
 Ma nel triangolo PRL , rettangolo in L , si ha quest'altra proporzione:
 $RL:PL::R:tang. PRL$. Dunque si avrà $sen. RTL:tang. LTP::R:tang. PRL$; vale a dire, *Il seno d' elongazione si ha al raggio, come la tangente della latitudine geocentrica osservata è alla tangente dell' inclinazione; e questa è la regola.*

Esempio. Li 12 Gennaio 1747 a $6^h 6' 33''$ della mattina il Sig. De la Caille osservò la longitudine di saturno di $6^{\circ} 26' 12'' 52''$, e la sua latitudine boreale $2^{\circ} 29' 18''$; il sole era allora in $9^{\circ} 21' 47''$, luogo del nodo di saturno a $12'$ presso secondo le tavole del Sig. Cassini, il che non può produrre error sensibile nel risultato. Applicando a quest' osservazione l' analogia precedente risulta l' inclinazione dell' orbita di saturno $2^{\circ} 29' 45''$ (*Mém. Acad. 1747. p. 135*).

525. Quando si determina il luogo del nodo d' un pianeta col mezzo di due latitudini eguali (516) sieno queste prese avanti e dopo il passaggio del pianeta per li suoi limiti, o per il nodo, le stesse osservazioni possono determinare ad un tempo non solo il nodo, ma anche l' inclinazione dell' orbita; poichè nel triangolo sferico PAL (*fig. 49*) si conoscono i lati AL , PL , o sia la distanza dal nodo, e la latitudine veduta dal sole: si cercherà l' angolo A , e si avrà l' inclinazione vera dell' orbita.

Inclinazioni	
<i>Mercurio</i>	$7^{\circ} 0' 0''$
<i>Venere</i>	$3 \ 23 \ 20$
<i>Marte</i>	$1 \ 51 \ 0$
<i>Giove</i>	$1 \ 19 \ 10$
<i>Saturno</i>	$2 \ 30 \ 20$
<i>Luna</i>	$5 \ 8 \ 52$

526. Questo metodo che determina in una volta l' inclinazione ed il nodo d' un pianeta per via di due latitudini eguali, è meno esatto di quello, in cui si determinano queste due cose separatamente, adoprando un' osservazione fatta nel nodo per determinare il nodo, ed un' osservazione fatta in uno de' limiti per aver l' inclinazione. Poichè se queste due osservazioni corrispondenti sono presso il nodo, esse determinano male l' inclinazione dell' orbita, mentre allora l' inclinazione è piccola, nè si deve determinare una quantità maggiore per una minore; all' opposto se queste due osservazioni sono troppo lontane dal nodo, sono men proprie a determinare la posizione, perchè la latitudine ivi cambiandosi di poco giorno per giorno, il minimo errore nel prender la latitudine ne produce un più grande nel nodo.

527. Ho detto, che l' attrazione di ciascun pianeta fa retrogradare sulla sua orbita i nodi di tutti gli altri pianeti (519) e che l' effetto di questo moto è di deviare tutte le orbite, e allora non può mancare, che l' inclinazione loro sull' ecclittica non si cangi. Sia CB l' ecclittica (*fig. 59*), AB l' orbita di saturno, AC quella di giove, A il moto del nodo di giove sull' orbita di saturno; questo moto del nodo succede senza verun cambiamento dell' angolo A , o sia dell' inclinazione mutua delle orbite, il triangolo ABC si cangia in $a B c$, gli angoli A , B rimanendo costanti. Ma non così l' angolo C ; l' angolo c riesce maggior, o minore

nore di C: per esempio il moto del nodo di marte per l'azione di giove essendo annualmente di $14''$, 2, sull'orbita di giove (*Mem.* 1738, p. 261, 1761, p. 404), l'angolo B inclinazione di giove, $1^\circ 19'$, e la distanza BC de' loro nodi $50^\circ 22'$, restando le stesse, si troveranno per il cambiamento dell'angolo C, $24''$, 8 per secolo. Questo effetto che continua di secolo in secolo porterà seco un gran cambiamento nelle inclinazioni dell'orbite de' pianeti; e già vi sono 8 minuti dal tempo di Tolomeo, cosa che non si deve trascurare nel confronto di diverse osservazioni, e che i soli calcoli delle attrazioni potevano manifestare, almeno quanto al presente. Questi cambiamenti sono principalmente sensibili nei satelliti di giove, ne quali producono delle varietà singolari, delle quali niuno avanti di me avea sospettato la cagione, e ch'era importante di conoscere.

328. Per sapere, se l'inclinazione d'un pianeta deve crescere o scemare, bisogna considerare la situazione de' nodi. Sia AB (*fig.* 39) l'orbita del pianeta turbante, AC quella del pianeta turbato, di cui il nodo passa di A in a; poichè l'inclinazione mutua delle due orbite non è cambiata, gli angoli A, a sono uguali, e verso questi punti li cerchi AC, ac sono paralleli: di là segue che vanno ad incontrarsi in un punto D lontano di 90° dal punto A; poichè a tal distanza diventano paralleli almeno per poco spazio e a un di presso. Or nel triangolo DC è si vede chiaro che l'angolo D e C è più piccolo che l'angolo DCE, cioè, che in tal caso l'inclinazione scema; dal che è facile concludere che quando il nodo del pianeta turbante è più avanzato di quello del pianeta turbato, l'inclinazione di questo va scemando sino che l'eccesso sia in circa di 180° . Questa regola è facile da scoprirsi figurandosi le posizioni di differenti orbite le une rapporto all'altre.

Dei diametri dei pianeti, e dei micrometri che servono a misurarli.

329. Il diametro apparente d'un pianeta è l'angolo sotto il quale apparisce; per esempio il sole al principio di Luglio apparisce sotto un angolo di $31^\circ \frac{1}{2}$, e venire quando è più vicina a noi, sotto l'angolo d'un solo minuto. Questi diametri crescono quando la distanza diminuisce; così il sole essendo più vicino a noi nel verno che nell'estate, d'intorno una trentesima parte, il suo diametro è più grande nel verno di un minuto e 5 secondi.

Per misurare il diametro del sole il mezzo più naturale e più semplice è quello di osservare, quando passa per il meridiano, il tempo che scorre dal passaggio del primo lembo a quello del secondo; se vi sono due minuti di tempo, il sole avrebbe $30'$ di diametro, supposto che sia nell'equatore: quando non è nell'equatore, conviene diminuire la quantità trovata con un'operazione ch'è tale.

330. LEMMA. Un arco tirato dentro d'un piccolissimo angolo sferico per-

perpendicolarmente ai lati , è uguale a questo piccolo angolo moltiplicato per il seno della distanza dell' arco alla cima dell' angolo .

DIM. Supponiamo due cerchi maggiori EAD , EBC (fig. 25) che facciano tra loro un piccolissimo angolo in E , ED sia di 90° , di modo che CD sia la misura del piccolo angolo E ; ad una distanza qualunque dal vertice E si tiri un arco di cerchio massimo AF , perpendicolare sopra EAD , il qual arco sia tanto piccolo che si possa considerare come linea retta , e nello stesso tempo sia EF sensibilmente uguale ad EA . Nel triangolo EFA rettangolo in A ed F , si avrà questa proporzione cavata dalla regola la più comune della trigonometria sferica : il raggio è al seno dell'ipotenusa EF , come il seno del piccolo angolo E si ha al seno del piccolo arco FA , o come l'angolo E si ha al piccolo arco FA (perchè i piccoli archi sono eguali ai loro seni) , o come l'arco DC è all'arco FA . Perciò prendendo per raggio , o seno tutto l'unità , si avrà $1 : \text{sen. AE} :: \text{DC} : \text{FA}$; dunque $\text{FA} = \text{DC sen. AE}$.

331. Di qua segue , 1^o. che le distanze FA , DC , tra i due cerchi , sono come i seni delle distanze dal vertice EA : ED ; 2^o. che un piccolo arco d'equatore come DC , una piccola differenza d'ascensione retta , moltiplicata per il coseno della declinazione AD dell'astro che si osserva , darà l'effetto che ne risulta , nella regione dell' arco , o sia il piccolo arco FA compreso ivi tra i due cerchi di declinazione . Lo stesso sarebbe delle differenze di longitudine . Questa proposizione è d'un uso continuo in Astronomia .

332. I diametri apparenti dei pianeti crescono quando s' avvicinano a noi : un oggetto che apparisce sotto l' angolo d' un minuto , apparirà di due minuti se si accosta della metà ; ciò non ha bisogno di prova . I diametri dei pianeti nella tavola alla fine dell' opera , sono tutti ridotti alla distanza che v'è dal sole alla terra ; perciò il diametro di giovè è marcato di $3' 13''$, benchè non ci apparisca in fatto che d' incirca $37''$ nelle sue medie distanze , essendo sempre da noi molto più lontano del sole .

333. I pianeti che anno un piccolissimo diametro non possono misurarsi come il sole per mezzo del tempo del loro passaggio , ch'è troppo breve : perciò si adopra il micrometro di cui ecco l'origine e l'idea .

Il MICROMETRO (detto da *misurar il piccolo*) è un istrumento composto di molti fili posti nel fuoco del cannocchiale , per misurare per mezzo dei loro intervalli la grandezza dell' immagine , che vi è dentro . La prima idea del micrometro fu data dall' Ugenio nel 1659 (*système saturnium* p. 82) . Dopo d'aver parlato dei diametri dei pianeti che aveva osservati , dice , che il Ricciolo aveva trovato il diametro di venere tre volte più grande di lui ; e per giustificare la sua determinazione , rende conto della maniera , con cui prese il diametro dei pianeti : ecco appresso poco quel che dice :

„ Nei cannocchiali formati di due vetri convessi vi è un sito in cui si
„ può collocare un oggetto così piccolo e fino che si vuole , e vi appar-
„ rà distintissimo e terminatissimo Se in questo foco si pone pri-
„ ma un anello , di cui l'apertura sia un poco più piccola di quella dell'
„ ocu-

oculare, si vedrà in quest'anello tutto il campo del cannocchiale, vale a dire, tutto lo spazio circolare che si scopre in cielo guardando per questo cannocchiale, e questo spazio sarà terminato da una circonferenza esatta, di cui sarà facile misurare il diametro. L'orologio oscillatorio, che noi abbiamo immaginato non è molto, è ottimo per tal effetto: si fa che in 4 minuti di tempo passa un grado della sfera, ed $1'$ in $4''$ di tempo; se dunque una stella impiega $69''$ a scorrere il campo del cannocchiale, è sicuro, che questo tubo ha $17' \frac{1}{2}$ di spazio; tale è quello di cui mi sono servito. Si prenda allora una o due lamine, o lame, di cui la larghezza vada diminuendo; si traforerà in taglio il tubo al sito indicato, per inserirvi queste lamine a traverso. Quando si vorrà misurare il diametro d'un pianeta, si esaminerà quale larghezza questa lama debba avere per coprire esattamente il pianeta, e questa larghezza essendo comparata col diametro intero dell'apertura dell'anello con un compasso finissimo, farà conoscere il diametro del pianeta in minuti, e secondi.

Il micrometro dunque dell'Ugenio non consisteva, che in una piccola lastra che faceva scorrere sul diaframma, o anello dell'apertura; questa lastra colla sua larghezza (piramidale) nascondeva l'immagine, che si volea misurare, e così ne manifestava il diametro.

Il Sig. Auzout nel 1666 immaginò il primo di prender l'immagine tra due fili, che si avvicinavano l'un l'altro: le prime osservazioni fatte con questo nuovo istrumento furono pubblicate in Francia e in Inghilterra.

534. Dopo si perfezionò di molto il meccanismo dei micrometri; ma si riducono sempre ad un filo che si fa muover col mezzo di una vite nel foco del tubo; si determina il valore di questo moto, o sia i passi della vite, osservando con questi stessi fili un oggetto lontano, di cui si conosce la grandezza: per esempio, un oggetto d'una pertica, veduto a 113 pertiche di distanza, comparisce necessariamente sotto un angolo di $31' \frac{2}{3}$, come si può trovar per la Trigonometria: allontanando i fili del micrometro fino a comprendere questo spazio nel tubo, se poi si veda, che lo stesso spazio comprende il diametro del sole, il sole avrà $31' \frac{2}{3}$ di diametro apparente. Il Sig. Bouguer nel 1748 ha immaginato un micrometro obbiettivo, che chiamò *Heliometro*: consiste in due vetri da cannocchiale, posti l'uno accanto l'altro, nell'istesso tubo, che possono allontanarsi l'uno dall'altro, per la quantità del diametro del sole, o di qualunque altra grandezza che si voglia misurare.

535. I reticoli fanno spesso le veci di micrometro; ve ne sono di due sorta principali, vale a dire, il *reticolo di 45°* , è il *reticolo romboidale*; il campo d'un tubo semplice, come ACBE (fig. 61) ordinariamente è guernito d'un telaio, in cui sono quattro capelli, o quattro fili tesi: il filo AB è destinato a rappresentare il parallelo dell'equatore, o sia la direzione

zione del moto diurno degli astri ; il filo orario CE perpendicolare al primo rappresenta un meridiano , o cerchio di declinazione ; e i fili obliqui NO , LM , fanno degli angoli di 45 gradi con li due primi . Quando si vuol misurare la differenza d'ascensione retta tra due astri , per conoscere la posizione d'un pianeta , d'una cometa ec. per mezzo d'una stella , s' inclina il filo AB in modo che il primo dei due astri , che passa per il tubo segna quel filo , e lo percorra esattamente ; si osserva l' ora , il minuto e il secondo , in cui l' astro passa per il centro P : quando il secondo astro viene a traversare il tubo , descrive un' altra linea VFDGR parallela alla APB ; si conta l'istante , in cui arriva in D , cioè , all' istesso cerchio di declinazione CDPE , nel quale si ha osservato il primo astro in P ; e la differenza dei tempi porge quella dell' ascensioni rette .

Per trovare la differenza di declinazione di due astri , o sia la perpendicolare PD , compresa tra AB ed VR , si contano anche i momenti nei quali il secondo astro passa per F e per G ; l' intervallo di tempo convertito in gradi , e moltiplicato per il coseno della declinazione dell' astro (531) dà l' arco FDG , di cui la metà FD è eguale a DP , a cagione dell' angolo FPD supposto di 45 gradi . Così si trova la differenza di declinazione di due astri , per esempio di venere , quando è sul sole , facendo che il lembo del sole scorra uno dei due fili , il pianeta l' altro , come si vede nella fig. 61 .

536. Il Sig. Bradley al reticolo di 45° ha sostituito il reticolo romboidale , ed è questo in oggi il più usitato dagli astronomi . E' formato d' un rombo BEDF (fig. 62) in modo , che una delle diagonali BD sia doppia dell' altra . Per formarlo supporremo un quadrato AGHC , di cui i lati AC , GH sieno divisi ciascuno in due parti uguali in D ed in B . dal punto D agli angoli H e G si tireranno le rette DG , DH : e dal punto B le BA , BC ; queste quattro linee colle loro intersezioni formeranno il rombo BEDF ; EF è la metà di AC , e per conseguenza di BD ; se si tira una linea ef parallela alla base EF , la perpendicolare Bd farà sempre uguale alla base ef , come BD è uguale alla AC , che vuol dire , che la larghezza di qualunque parte di questo rombo è uguale all' altezza .

537. Quando con questo reticolo si vuol comparare un pianeta ad una stella , si fa in modo che il primo dei due astri col suo moto diurno percorra lo spazio EF , eguale a BM , allora si conosce il valore di questa diagonale . Il secondo astro dunque venendo a traversare il tubo , si conta esattamente il tempo che impiega a passare come da e in f , si converte il tempo in gradi , minuti e secondi ; si diminuiscono questi gradi moltiplicandoli per il coseno della declinazione di quest' astro (531) , si ha la grandezza di ef , o Bd , si leva da BM , ciò che dà Md , ch' è la differenza di declinazione dei due astri .

538. Questo reticolo serve a comparare i pianeti e le comete colle stelle fisse , che anno appresso poco la stessa declinazione , o pure comparate le piccole stelle delle quali si vuol formare un catalogo , con una

T

stella

stella principale che sia appresso poco sul loro parallelo. Il Sig. De la Caille, che se n' è servito al Capo di Buona Speranza nel 1751, per formare il catalogo d' intorno 10 mille stelle nella parte australe del cielo, l' aveva fissato nel tubo del quadrante: egualmente si può porre in un *cannocchiale meridiano*, o sia *istrumento dei passaggi*, che gira nel piano del meridiano intorno un asse orizzontale; o in un *cannocchiale parallattico*, cioè che gira sopra un asse diretto verso il polo del mondo; e inclinato per esempio 49° per l'orizzonte di Parigi.

539. Quando si conosce la distanza reale d'un pianeta in leghe, è anche facile di trovare il suo diametro reale, che viene ad esser la corda dell'angolo del suo diametro apparente; e per conseguenza la superficie, e la solidità del pianeta in misure cognite. Ho collocato alla fine di questo Volume una Tavola, che contiene i diametri, le solidità, le distanze dei pianeti, calcolato tutto sulle ultime osservazioni, che ci anno fatto conoscere le distanze assolute di tutti i pianeti dal sole e dalla terra.



LIBRO QUARTO.

Dei moti della luna, e del calcolo delle parallassi.

340. LA LUNA dopo del sole è l'astro più osservabile di tutti. Nel primo libro non si è parlato se non che delle apparenze più generali del suo moto (55) : ora si darà un dettaglio spiegato delle sue circostanze.

La luna dopo di essere sparita per qualche giorno, comincia a mostrarsi la sera verso l'occidente, poco dopo il tramontar del sole sotto la forma d'un filetto di luce, o d'una falce di lume debole per essere smorzato dallo splendore del crepuscolo. L' Hevelio non ha mai osservato la luna più presto di 40 ore dopo la sua congiunzione, o 27 ore avanti (*sele-nographia* p. 276, e 408) : generalmente non si scorge la luna che il terzo giorno dopo la sua congiunzione, benchè il Keplero abbia detto che si poteva veder la luna anche in congiunzione, quando la sua latitudine è di 5 gradi. Questa falce adunque comparisce al più tardi nel terzo giorno dalla parte di ponente la sera all'entrar della notte; le sue punte sono sempre voltate all'opposto del sole; diventa un po' più grossa il giorno dopo, e nello spazio di 5 a 6 giorni prende la forma di mezzo cerchio: la parte illuminata è terminata allora da una linea retta, e noi diciamo allora la luna *dichotoma* (tagliata per mezzo), o in quadratura, ed è il *primo quarto*.

Dopo ch'è apparsa in forma di semicerchio, continua ad allonnanarsi dal sole, e crescere di lume per 8 giorni, ed allora apparisce tutta circolare; il suo disco intero e luminoso risplende tutta la notte, ed è il giorno del *plenilunio* o dell'opposizione: si vede passare per il meridiano a mezza notte, e tramontare quando il sole leva; tutto mostra ch'ella è opposta al sole rispetto a noi, e che risplende in tutta la sua ampiezza, perchè il sole la illumina in faccia, e non da lato. Dopo il plenilunio succede il calare, che porta le istesse fasi, e le istesse figure indicate per il crescer della luna; prima diventa ovale, poi di nuovo *dichotoma*, ed è l'*ultimo quarto*.

Ben tolto il mezzo cerchio di luce diminuisce e prende la forma di falce, che ogni giorno si restringe, e di cui li corni sono sempre verso la parte opposta al sole. Trovasi la luna allora aver fatto il giro del cielo, e s'avvicina al sole: si vede levar la mattina poco avanti il sole in quella forma ch'ella aveva il primo giorno che fu osservata: si accosta sempre più al sole, e si perde in fine ne' suoi raggi, chiamasi *luna nuova*, la congiunzione, altre volte *neomenia* (*nuova luna*).

341. La misura più naturale del tempo fu quella suggerita dalle fasi della luna. Quest'astro cangiando tutti i giorni in modo sensibile il luogo del suo levare e del suo tramontare, variando continuamente di figura, e ricominciando in seguito un nuovo ordine di cambiamenti tutti simili,

T 2

efibi-

esibiva una regola palese, e numeri facili, senza scrittura, nè calcoli, nè date, nè almanachi; i popoli vedevano in cielo un avviso perpetuo di ciò che avevano da fare; le famiglie di recente formate e disperse nelle pianure di Sennaar, si radunavano senza errore nel termine convenuto di qualche fase della luna.

542. La NEOMENIA servì a regolare le assemblee, i sacrificj, gli esercizj pubblici; questo culto e queste feste non avevano già la luna per oggetto, ma per indicio. Si contava la luna dal giorno, che cominciava a vedersi. Per scoprirla facilmente si portavano la sera sopra delle altèzze; scoperta la falce si celebrava la neomenia, o il sacrificio del mese nuovo ch'era seguito da feste e da banchetti. Le nuove lune che cadevano nel principio delle 4 stagioni, erano le più solenni; sembra vedersi l'origine delle nostre quattro tempora, come nelle cerimonie antiche si vede quella di quasi tutte le nostre feste. Si ritrova nella S. Scrittura, e nell'istorie di tutti i popoli del mondo questo costume di radunarsi sui luoghi alti o nei deserti, di osservar la nuova luna, di celebrar la neomenia con sacrificj e preghiere.

543. Da un novilunio all' altro passano intorno 29 giorni e mezzo; l'osservazione è facile, e i primi pastori non mancarono di farla: chiamasi *mese lunare, lunazione, rivoluzione sinodica* della luna: se ne vedrà tosto una determinazione più rigorosa (557); la lunazione fu la misura più antica del tempo.

544. Osservando con esattezza le fasi della luna naturalmente anno rimarcato che l'eclissi del sole che succedono di quattro in cinque mesi cadono tra la luna vecchia e la nuova, cioè tra il tempo che la luna s'accosta al sole e quello che se n'allontana dalla parte opposta: scorgesi allora un corpo tondo e nero passare avanti il disco del sole, nascondere il lume, almeno in parte, talora in tutto, talor forse mezzo il disco e apparir circondato d'una corona di luce, talora coprirlo in tutto e immergerli nelle tenebre come nel 1724 (art. 635).

I primi osservatori compresero in fine che questo corpo oscuro non poteva essere se non quello della luna veduto ne' giorni avanti avanzarsi verso il sole e passar poi dall'altra parte verso levante.

545. La luna dopo aver arrestato il lume del sole in pien giorno appariva assolutamente nera ed opaca; da ciò s'intese che ella non aveva lume proprio ma dal sole, e che perciò la parte voltata verso di noi era oscura. Perciò conclusero che la luna era un corpo solido opaco e privo di luce per se, e che non appariva luminosa se non nella parte illustrata dal sole; il che si confermava dal vedersi la luna piena e risplendente quando opposta al sole presentava a noi l'intera parte illuminata dal medesimo.

546. Quattordici o 15 giorni dopo un eclissi del sole, o avanti, ne succede spesso una di luna. Pria che questa cominci vedesi la luna piena rotonda luminosa opposta al sole; leva la sera al tramontar del sole, passa tutta la notte sull'orizzonte; è il tempo dell'*opposizione*, o del *perilunio* (540); in breve perde parte o tutto il suo lume; non può esser altro

altro che la terra la quale posta in mezzo impedisce che il sole non la rischiarì.

547. Poichè il sole fuor di quest' occasione illumina sempre la metà della luna, noi non possiamo vederla piena, se non quando la parte illuminata è in faccia a noi, come si è detto, nell' opposizione; quando si trova da canto, in modo che non possiamo vedere che la metà illuminata, non vediamo che un mezzo cerchio di luce, e va a proporzione: questa è la cagion delle fasi della luna: ecco come.

Sia S il sole (*fig. 63*), T la terra intorno cui la luna gira nella sua orbita, E O il globo della luna posto tra la terra ed il sole, in congiunzione, o sia nel novilunio. Allora la parte E illuminata dal sole non si può da noi vedere per esser dalla parte opposta; non si vede che la parte oscura, cioè non si vede la luna, ciò che succede in ogni novilunio.

All' opposto, quando la luna è opposta al sole in L, l' emisferio illuminato L è tutto rivolto a noi, e perciò si vede la luna piena.

548. Quando la luna è scostata dal sole 90 gradi incirca, ed è in mezzo tra la congiunzione e l' opposizione, l' emisferio visibile è AQZ l' emisferio illuminato dal sole QZM; perciò non si vede che mezzo questo come si scorge rappresentato separatamente in N; ciò succede nell' una e nell' altra quadratura.

549. Quando la luna è discosta dal sole 45 gradi, noi diciamo ch' ella è nel primo ottante; allora la parte illuminata, che guarda il sole, è CDF, la parte visibile BCD; noi dunque d' illuminato non vediamo che la parte CD, che pare in forma di falce, come in G, l' ottava parte del disco (o piuttosto la settima, come si spiegherà art. 551). Nel secondo ottante l' emisfero visibile è HIK, l' illuminato PKI: vedesi allora quasi tutto quest' emisfero illuminato fuorchè la parte PK, nè manca che HI: apparisce la luna in forma quasi ovale come in R; manca al disco quel che si vedeva nel primo ottante. Il terzo ottante V a gradi 45 di là dall' opposizione e l' ultimo ottante in X rappresenta la luna Y, come nel primo.

550. Per calcolare esattamente la porzione luminosa del disco lunare, sia S il sole (*fig. 64*), T il centro della terra, C il centro della luna, AE il diametro della luna perpendicolare al raggio del sole, e che divide la porzion illuminata ANE dalla porzione oscura ADE: il diametro lunare ND perpendicolare al raggio TC della terra, separa la parte visibile DAN dalla parte invisibile DEN; dall' estremo A del semicerchio luminoso ENA si cala una perpendicolare AB sul diametro ND; la linea NB farà la larghezza apparente della parte visibile dell' emisfero luminoso. Imperciocchè di questo emisfero non v' è che la parte AN compresa nell' emisfero visibile DAN; nè l' arco AM può apparire più largo di BN, per la stessa ragione che il semicerchio intero NAD non apparisce se non come un semplice diametro NBD, e l' intero emisfero che come un cerchio o piano rotondo, che è il piano di proiezione (673). La parte NB dell' emisfero visibile è il seno verso dell' arco NA; l' arco NA o l' angolo NCA è uguale all' angolo CTE supponendo TF para-

parallela a CS; perchè l'angolo NCA è il complemento dell'angolo FCT per esser NCT retto; ma l'angolo FCT è pure il complemento dell'angolo FTC a cagion del triangolo rettangolo CFT; dunque l'angolo NCA è uguale all'angolo FCT. L'angolo FTC è uguale all'elongazione della luna dal sole, per la prodigiosa distanza supposto nella TF parallela a CS, dunque l'arco NA è uguale all'elongazione della luna; dunque nelle diverse fasi della luna la larghezza del segmento luminoso della luna è uguale al seno verso dell'angolo d'elongazione, prendendo per raggio il raggio istesso del disco lunare, o della mezza distanza dei corni. Per esempio quando la luna è in 5 giorni dopo la congiunzione si trova 60 gradi discosta dal sole, la parte luminosa NB apparisce larga la metà del raggio NC, o sia il quarto del diametro intiero ND, perchè il seno verso di 60° in un cerchio qualunque è la metà del raggio.

551. I riflessi precedenti fanno vedere, che non è in rigore il seno verso dell'elongazione, ma piuttosto il seno verso dell'angolo esterno del triangolo formato nel centro della luna dai raggi che vanno al sole e alla terra. Nella dimostrazione precedente si è supposto, che le linee CS, TF dirette al sole dalla terra e dalla luna, sieno sensibilmente parallele; e ciò non è che appresso poco a cagione della gran distanza del sole, che è 400 volte più lontano da noi che la luna. Ma se li raggi ST, SV (fig. 65), che dal sole S vanno alla terra in T e al pianeta in V, non sono paralleli, si avrà l'angolo esterno TVO del triangolo SVT eguale all'angolo NVA, l'uno e l'altro complemento di AVT. Or la parte illuminata e visibile NB è uguale al seno verso dell'angolo NVA; dunque il diametro intiero si ha alla larghezza della parte illustrata e visibile d'un pianeta, come il diametro del cerchio si ha al seno verso dell'angolo al centro del pianeta, esterno al triangolo formato dal sole, dalla terra, e dal pianeta.

552. La curvatura GBH (fig. 66) che forma l'interno della falce, è un'ellisse, di cui l'asse maggiore GH è uguale al diametro del disco lunare. Che sia GBH un'ellisse, si osservi, che GBH rappresenta la circonferenza del cerchio *terminatore* della luce e dell'ombra; questo è veduto obliquamente sotto un' inclinazione ch'è il complemento dell'angolo d'elongazione, era l'angolo ACT (fig. 64): or un cerchio veduto obliquamente comparisce sempre sotto forma d'ellisse (674): dunque GBH essendo una circonferenza veduta obliquamente, deve apparire il contorno d'un'ellisse.

Dico in secondo luogo che l'asse maggiore è il diametro istesso GH del disco lunare, perchè tutti i cerchi grandi d'un globo si tagliano in parti uguali; e però il cerchio visibile GNH, e il cerchio terminatore GBH sul globo della luna si tagliano per mezzo, e per il diametro GCH comune sezione d'ambidue. Perciò le due corna G, H della falce lunare sono sempre lontane tra esse per mezzo cerchio, e in ogni tempo misurando la distanza de' corni si misura il diametro della luna.

553. Si vede distintamente dopo il novilunio, che la falce luminosa è ac-

è accompagnata da una debole luce sparfa per il resto del disco, e che fa vedere tutta la rotondità della luna, e si chiama *luce secondaria*. La terra riflette la luce del sole verso la luna, come la luna verso la terra: quando la luna è per noi in congiunzione col sole, la terra è in opposizione per essa; per un osservatore che fosse situato nella luna, sarebbe propriamente *piena terra* come dice l'Hevelio; la chiarezza della terra sulla luna è molto più grande di quella della luna sulla terra, perchè la terra è molto più grande; e perciò questo lume secondario si rende sensibile a noi e ci fa veder tutta la luna. Si vedrebbe tutta in congiunzione, ma allora il sole col suo gran lume assorbire questo lume più debbole, nè si scorge, se non dopo finito incirca il crepuscolo.

L'istesso lume secondario ci addita un altro fenomeno; questo è la dilatazione apparente della falce luminosa, che pare aver un diametro più grande che il disco oscuro. Proviene ciò dalla forza d'un lume forte posto appresso d'un lume debbole; la falce luminosa sembra gonfiata per una espansione di luce che si spande sulla retina, e dilata il cerchio lunare; l'aere ambiente rischiarato dalla luna accresce insieme questa illusione.

554. Il lume della luna non contiene verun calore: Il Sig. Tschirnhausen coi suoi vetri ardenti non potè renderlo sensibile (*Hist. Acad.* 1699). Il Sig. De la Hire il figlio espone lo specchio concavo dell'osservatorio che ha 35 pollici di diametro ai raggi della luna piena, ristirne i raggi in uno spazio 306 volte più piccolo che nello stato naturale: non ostante questo lume concentrato non produsse il minimo effetto sul termometro del Sig. Amontons, che era sensibilissimo; (*Mem. Acad.* 1705). Il Sig. Bouguer ha trovato coll'esperienza che il lume della luna è 300 mille volte minore di quello del sole, e ciò comparando l'uno e l'altro col lume d'una candela posta nell'oscurità: (*Traité d'optique* 1760).

Delle inegualità della Luna.

555. I più antichi filosofi compresero che la luna girava ogni mese intorno la terra, che n'era compagna, e, come diciamo noi, *satellite*; Aristotele, secondo Averroe, diceva che la luna gli pareva una terra eterea; si può vedere in Macrobio e in Plutarco tutto ciò che i filosofi avevano detto in questo proposito. I primi osservatori dovettero facilmente riconoscere che nello spazio di 59 giorni succedeva due volte il novilunio, in modo che la durata d'una lunazione era di 29 giorni e mezzo; ma questa regola, vera a un dipresso, era soggetta a molte eccezioni, e a molte disuguaglianze, che non si spiegarono se non molto tempo dopo.

556. La prima cognizione esatta del moto della luna in Grecia l'ebbe Metone, che viveva 430 anni avanti G. C. Aveva trovato o imparato dagli orientali, che in 19 anni solari passavano 235 mesi lunari completi, regola, che non patisce difetto se non d'un giorno in 312 anni. Parve questa scoperta così bella ai Greci, che i numeri si scolpirono in lettere d'oro; ancora si pratica nel calendario, e si chiama *ciclo lunare* il cir-

circolo di 19 anni che riconduce i novilunij agli stessi giorni dell'anno. Il numero d'oro è quello che indica l'anno del ciclo lunare: è 1, ogni volta che il novilunio cade al primo di Gennajo.

557. Questo periodo fa vedere che da un novilunio all'altro vi sono 29 giorni, 12 ore, 44 minuti, 3 secondi (misura media) ciò che si chiama lunazione, mese sinodico, *rivoluzione sinodica*. Si noti dunque, che affine che la luna, dopo un'intera rivoluzione della sua orbita, arrivi il sole, bisogna che scorra intorno 29 gradi che intanto il sole deve aver fatto nell'eclittica di moto annuo. Però quando la luna giugne il sole, è più di 2 giorni che la sua vera rivoluzione è finita; chiamasi questa *rivoluzione periodica*, ed è di 27 giorni, 7 ore, 43 minuti, 4 $\frac{1}{2}$ secondi; ai quali conviene aggiugnere 7" per aver la rivoluzione siderale (321); ma di questa non si fa ufo, perchè i moti celesti si rapportano agli equinozj.

558. Le difuguaglianze della luna alterano molto la uniformità di questa rivoluzione media ora determinata. Osservando ogni giorno il luogo della luna per lo spazio d'un mese, non era difficile d'accorgersi che a capo di sette giorni v'erano incirca sei gradi d'ineguaglianza, che dopo 14 l'ineguaglianza spariva, che a capo di 21 ritornava in senso contrario per ivanire di nuovo alla fine di 27 giorni della rivoluzione.

559. Ma continuando questa serie d'osservazioni per mesi ed anni, si vide che i punti del cielo ove spariva l'ineguaglianza (1196), vale a dire l'apogeo e il perigeo, erano diversi, e che ad ogni rivoluzione avanzavano incirca tre gradi. Di fatto l'apogeo della luna fa il corso del cielo in 3231 giorni, 8 ore, 34 minuti, 57 $\frac{1}{2}$ secondi, rapporto agli equinozj, e in 3232 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ 14' 31" rapporto alle stelle; sono incirca 9 anni. Or la luna trovandosi più lontana da noi al tempo del suo apogeo, il suo diametro apparente è allora più piccolo, ed è di 29 $\frac{1}{2}$ minuti solamen-

te; 14 giorni dopo, essendo la luna perigea, apparisce di 33 $\frac{1}{2}$. Questo solo basta a farci discernere il tempo in cui la luna si trova negli abissi: l'osservazione del diametro insieme c'indica il luogo del suo apogeo in cielo, e basta per farne conoscere i moti e la rivoluzione.

560. La prima ineguaglianza, o l'equazione dell'orbita lunare è talora di 5' gradi, talora di 7 $\frac{2}{3}$ secondo i siti del sole rapporto alla luna e al suo apogeo, come se l'orbita lunare si allungasse e diventasse più eccentrica ogni volta che il sole corrisponde all'apogeo; o al perigeo della luna. Per esprimere questa alterazione, questa seconda differenza, o *seconda ineguaglianza*, suppongono prima gli astronomi l'equazione media dell'orbita di 60' 18' $\frac{1}{2}$, e impiegano un'altra equazione di 10' 20' $\frac{1}{2}$ sotto il nome di *correzione*: ella dipende dalla doppia distanza della luna dal sole meno l'ano-

anomalia media della luna. Fu scoperta questa seconda inegualità da Tolomeo verso l'anno 120 di G. C. Parleremo della cagione che la produce all'art. 1052.

561. La terza inegualità della luna dipende ancora dal sito del sole, di cui l'attrazione turba continuamente il moto della luna. Fu questa scoperta da Ticon Brahè verso l'anno 1600, e si chiama *variazione*; è ella di 37' e cambiafi ad ogni tre o quattro giorni: è nulla nei novilunij, nei plenilunij, nelle quadrature; ella è al sommo negli ottanti, vale a dire a 45° dalle sizigie e dalle quadrature.

562. La quarta inegualità si chiama *equazione annua* della luna, scoperta anch'essa da Ticone. Ella non è che di 11' $\frac{1}{4}$; non si rinnova che tutti gli anni; il suo lento effetto diventa sensibile sopra un numero di molte osservazioni, osservando i luoghi della luna per un anno.

563. Quando il Nevvton trovò che l'attrazione era il principio delle tre ultime inegualità, comprese che doveano esservene molte altre per il gran numero di circostanze che modificano e turbano le attrazioni. I calcoli dei geometri o più ancora il penoso esame ed il confronto delle osservazioni più esatte anno fatto riconoscere dieci altre inegualità, di uno, di due, di tre minuti, che tutte insieme formano in fine le tavole della luna, che non si scostano dal cielo mai più d'un minuto. Quelle del Sig. Mayer, l'esattezza delle quali è la più conosciuta, sono state molte volte stampate dopo il 1770; ed anno meritato un premio considerabile dal Parlamento d'Inghilterra alla vedova di quel celebre astronomo: sono quelle di questa nostra edizione.

564. L'accelerazione del moto medio della luna, o dei suoi periodi, è tale, che il mese lunare si trova attualmente più breve di 22 terzi che non era già 2000 anni, ciò che produce un grado di errore sul luogo della luna, quando si calcola per l'anno 300 avanti G. C. impiegando il moto medio della luna osservato nel secolo presente. Io ho dato i calcoli di questa equazione secolare della luna nelle *Memorie* 1757, colle ragioni che possono farla ammettere.

Dei nodi, e dell'inclinazione dell'orbita lunare.

565. L'orbita della luna è inclinata all'eclittica, come quelle di tutti gli altri pianeti (422); perciò la luna in ogni rivoluzione traversa due volte l'eclittica, e 7 giorni dopo d'aver traversato l'eclittica in uno dei suoi nodi, se ne trova lontana 5 gradi. Senza questa inclinazione si avrebbe ad ogni mese un'eclisse di sole il giorno della congiunzione, e un'eclisse di luna il giorno dell'opposizione; e pure vi sono anni interi senza un'eclisse di luna (come il 1763); perchè al momento di queste opposizioni la luna è troppo lontana dal nodo trovandosi sopra o sotto l'eclittica in cui sono sempre i centri del sole e dell'ombra della terra.

566. Questa inclinazione non è che di 5° nei novilunij e plenilunij che

cado-

cadono a 90° dai nodi, ma è di $5^\circ 17' \frac{1}{2}$ nelle quadrature. Questa importante osservazione fu fatta prima da Ticon Brahe; se ne vedrà la cagione art. 1063; l'inclinazione media è di $5^\circ 8' 46''$.

567. Il nodo *ascendente* della luna, cioè quello per cui traversando l'eclittica si avvanza verso tramontana, chiamato altra volta il *capo del dragone* si disegna con questo carattere Ω ; il *nodo discendente*, coda del *dragone*, con questo rovescio Υ .

568. Quel che v'è di più osservabile nei nodi della luna è la prontezza del loro moto retrogrado. Se la luna traversa l'eclittica nel primo punto d'ariete o nell'equinozio (come nel mese di Giugno 1764), 18 mesi dopo taglia l'eclittica nel principio dei pesci; ciò che mostra il nodo aver retrogradato 30 gradi, o un segno intiero; così i nodi fanno il giro del cielo nello spazio di 18 anni. Questo moto dei nodi fu facile da riconoscersi, vedendo la luna eclissare per esempio la bella stella del cuor del leone, o *regolo*, che giace nell'eclittica istessa: quando la luna eclissa *regolo* (come succedeva nel 1757 nel mese di Giugno), ella è nel suo nodo: dunque il nodo si trova allora a $4^\circ 26'$ di longitudine, come *regolo*. Ma quattro o cinque anni dopo nell'istesso grado di longitudine si trova cinque gradi sopra o sotto questa stella: ciò prova che il nodo è 90° lungi dalla stella. A capo di 18 anni ripassa la luna verso le medesime stelle, e ritorna il medesimo ordine. Osservato più volte questo ritorno, si è trovato che i nodi della luna facevano una rivoluzione intiera contro l'ordine dei segni in 18 anni comuni, e 218 giorni, o sia in $67988\ 4^h\ 52^m\ 52^s$, 3 rapporto agli equinozi, o di $68038\ 2^h\ 55^m\ 18^s$, 4, rapporto alle stelle.

569. Ticone scoprì nel moto dei nodi una inegualità che va fino a $1^\circ 46'$ in più o in meno, e vide, che questa inegualità con quella dell'inclinazione si riduceva ad una equazione della latitudine della luna ch'è di $8' 49''$ moltiplicati per il seno di due volte la distanza tra la luna ed il sole meno l'argomento di latitudine della luna. Il luogo del nodo della luna al principio del 1772 era di $7^\circ 4^\circ 46'$; ciò basterebbe per trovarne il luogo in ogni tempo.

Del diametro della Luna.

570. Il diametro apparente della luna varia come la parallasse, in ragione delle sue diverse distanze dalla terra: il maggior diametro perigeo è di $33' 34''$ nelle opposizioni, e il minore in apogeo e in congiunzione di $29' 25''$. La maniera più semplice di misurarlo è di osservare il tempo che il disco della luna impiega a traversare il filo d'un cannocchiale, quando la luna è piena, e che si veggono i due lembi (329); ma conviene aver riguardo al ritardo diurno della luna per cui impiega più tempo del sole a traversare il meridiano, anche quando il suo diametro non è il più grande. Nei tempi poi, che il suo disco non è illuminato che in parte, non si può adoprare altro che il micrometro.

571. Quan-

571. Quando la luna è più vicina al zenit, è anche più vicina a noi e così a proporzione il suo diametro apparisce più grande. Sia T il centro della terra (fig. 67), O un osservatore sulla superficie della terra; Z la luna al zenit dell'osservatore: se la distanza OZ della luna in tal sito è minore d'una sessantesima della distanza ZT della luna dal centro della terra, ch'è uguale alla TN (quasi eguale ad ON) posta la luna nell'orizzonte, farà il diametro nel zenit maggiore del diametro apparente nell'orizzonte di altrettanto; nei siti di mezzo a proporzione. Chiamasi *diametro orizzontale* il diametro veduto dal centro della terra, perchè eguale a quello veduto nell'orizzonte, ed è il minimo sebbene un'illusione lo faccia apparire di maggior grandezza (573).

572. Quando si conosce il diametro orizzontale della luna (nell' Tavole) è facile di trovare il *diametro cresciuto* in ragion dell'altezza sopra dell'orizzonte, poichè sono tra essi come le linee LO, LT. Nell' triangolo LOT, l'angolo OLT è quel che si chiama *parallasse d'altezza* (580) l'angolo LOZ, o il suo supplemento LOT, che ha l'istesso seno, è la distanza apparente dal zenit: l'angolo LTO è la vera distanza dal zenit, o il complemento dell'altezza vera. In ogni triangolo rettilineo i lati sono come i seni degli angoli opposti: perciò il lato LO è al lato TL, come il seno dell'angolo OTL è al seno dell'angolo LOT; dunque il diametro orizzontale è al diametro apparente, come il seno della distanza vera della luna dal zenit, (veduta dal centro della terra) è al seno della distanza apparente, veduta dal punto O.

573. E' vero che la luna quando apparisce nell'orizzonte attraverso pianure con colli, fabbriche, alberi ec. apparisce molto grande; ma questa è un'illusione ottica, che ha luogo anche per gli altri astri. Basta rimirar la luna per un tubo qualunque, anche a traverso d'un buco in una carta, per convincersi che ciò non è reale, e che il diametro della luna apparisce anzi minore, che a maggiori altezze. E' difficile formarli un'idea chiara della cagion di questa illusione, se non ammettendo con tutti gli ottici un giudizio tacito, comune, sforzato, involontario, per cui siamo soliti giudicare più grandi gli oggetti, che crediamo più lontani, e li crediamo lontani quando vediamo molti corpi interposti; come accade mirando la luna nell'orizzonte.

Della parallasse della Luna.

574. Per la *parallasse* (trasmutazione, diversità di aspetto per il diverso sito) s'intende la differenza tra il luogo in cui un astro apparisce veduto dalla superficie della terra, e il luogo in cui apparirebbe veduto dal centro della terra, ch'è il suo vero luogo: chiamasi talora *parallasse diurna* per distinguerla dalla parallasse annua (441).

Tutti i moti celesti devono riferirsi al centro della terra per comparire regolari, perchè i differenti punti della superficie della terra essendo situati molto differentemente gli uni dagli altri, un astro deve loro comparire in aspetti molto diversi; dunque bisogna trasportarli

al centro, per veder tutto nel suo vero sito, e ritrovare la vera legge dei moti celesti; per questo siamo sforzati di calcolare continuamente la parallasse per ridurre il luogo d'un pianeta osservato a quello che avremmo veduto dal centro della terra.

575. Sia T il centro della terra (fig. 67), O il punto della superficie della terra ov'è l'osservatore; TOZ la linea verticale che passa per il zenit; per il punto O dell'osservatore, per il centro T della terra, e per il nadir. Un pianeta P situato nella linea del zenit si riferisce sempre allo stesso punto del cielo, si riguardi dal centro T, o dal luogo O, questo è il suo vero sito, onde *un astro nel zenit non soffre parallasse*: questo è un principio fondamentale.

576. Se il pianeta, in vece d'esser nella linea verticale, apparisce nella linea orizzontale OH perpendicolare alla prima avendo la distanza TH dal centro: l'istessa che la prima TP, il luogo del pianeta veduto dal centro della terra è sulla linea TH, veduto dal punto O sulla linea OH: queste due linee non rispondono all'istesso punto del cielo, poichè s'incrociano in H, ma in siti differenti, e questa differenza è la parallasse.

577. Paragoniamo questi due diversi siti con il zenit: l'angolo ZOH formato dalle linee verticale e orizzontale è la distanza apparente dell'astro dal zenit: ma dal centro T, la vera distanza dell'astro dal zenit farebbe l'angolo ZTH.

578. La distanza apparente ZOH è maggiore della distanza vera ZTH; perchè nel triangolo rettilineo TOH, di cui il lato TO è prolungato in Z, l'angolo esterno ZOH è uguale ai due interni T, H; dunque è maggior dell'angolo T per la quantità dell'angolo H: questa differenza delle due distanze dal zenit, ch'è l'angolo OHT, è ciò che si chiama *parallasse orizzontale*, se la linea OH è orizzontale come si è supposta, vale a dire se il luogo apparente dell'astro giace nell'*orizzonte apparente* OH, o sia nella tangente tirata per il punto O dell'osservatore sulla superficie della terra. Nel triangolo TOH rettangolo in O si ha questa proporzione, prendendo l'unità per raggio, o seno tutto; 1 : sen. OHT :: TH : OT. Dunque il seno della parallasse orizzontale è $\frac{OT}{TH}$, cioè il raggio della terra diviso per la distanza dell'astro dà una

frazione, che nelle tavole de' seni mostra la parallasse orizzontale.

579. Dunque la parallasse d'un astro è l'angolo formato nel centro dell'astro da due raggi, de' quali uno tende al centro della terra, l'altro al punto della superficie dell'osservatore; queste due linee formano l'angolo visuale sotto il quale sarebbe veduto il raggio della terra alla distanza del centro dell'astro. Il triangolo TOH chiamasi *triangolo parallattico*; è sempre situato verticalmente, seguendo la direzione della verticale OT: ciò vuol dire, che tutto l'effetto della parallasse si fa d'alto in basso nel piano d'un verticale. Dunque la commutazione è tutta in altezza, e la parallasse abbassa sempre l'astro d'alto in basso senza farlo comparire nè a dritta nè a sinistra. La parallasse dunque non cambia l'
azi-

azimuto d'un pianeta , nè l'ascension retta quando l'astro è nel meridiano , ed il verticale allora coincide col cerchio orario .

580. Sin qui supposto l'astro nell'orizzonte . Se il pianeta si trovasse in L più vicino al zenit , onde l'angolo ZOL distanza dal zenit fosse acuto , la parallasse OLT sarebbe minore : chiamasi questa *parallasse di altezza* .

TEOREMA. *Il seno tutto si ha al seno della parallasse orizzontale , come il seno della distanza dal zenit qualunque è al seno della corrispondente parallasse di altezza .*

Dimostr. Nel triangolo rettangolo HOT si ha questa proporzione : $HT : TO :: \text{sen. } O : \text{sen. } THO$; nel triangolo TOL questa : $TL : TO :: \text{sen. } LOT : \text{sen. } TLO$; quivi , in vece di TL , si può porre la sua uguale TH . Dunque si anno queste due proporzioni , nominando R il seno dell'angolo retto .

$HT : TO :: R : \text{sen. } H$.
 $HT : TO :: \text{sen. } LOT : \text{sen. } L$ } dunque $R : \text{sen. } LOT :: \text{sen. } H : \text{sen. } L$.

Ma il seno dell'angolo ottuso LOT è l'istesso che quello del suo supplemento LOZ , o sia della distanza apparente del pianeta dal zenit ; dunque il raggio sta al seno della distanza dal zenit , come il seno della parallasse orizzontale H è al seno della parallasse di altezza L .

581. Il seno della distanza apparente dal zenit è l'istesso che il coseno dell'altezza apparente , il raggio è sempre supposto l'unità . Perciò , $1 : \text{cos. alt.} :: \text{sen. paral. oriz.} : \text{sen. paral. altezza}$; dunque *il seno della parallasse d'altezza è uguale al seno della parallasse orizzontale moltiplicato per il coseno dell'altezza apparente* .

582. La parallasse orizzontale della luna , ch'è la maggiore di tutte le parallasse de' pianeti , non arriva che a un grado incirca ; ora tra il seno d'un grado , e l'arco d'un grado la differenza è appena d'un quarto di secondo : così si può prendere l'uno per l'altro e dire in generale , che *la parallasse di altezza è uguale alla parallasse orizzontale moltiplicata per il coseno dell'altezza apparente* . In questo modo io in avvenire enuncierò sempre il teorema generale della parallasse di altezza , di cui farò uso frequente : chiamando p la parallasse orizzontale , h l'altezza apparente , supporrò sempre la parallasse d'altezza $= p . \text{cos. } h$.

583. La parallasse orizzontale d'un astro è tanto più piccola , quanto la sua distanza è più grande ; poichè quanto più il punto H s'accosterà al punto O , tanto più crescerà l'angolo THO . Nel triangolo THO si ha questa proporzione , $TH : TO :: R : \text{sen. } THO$. Se l'astro è in N , si avrà nel triangolo TNO questa proporzione , $TN : TO :: R : \text{sen. } TNO$: la prima proporzione dà quest'equazione . $TH . \text{sen. } THO = R . TO$; la seconda questa : $TN . \text{sen. } TNO = R . TO$; dunque $TH . \text{sen. } THO = TN . \text{sen. } TNO$; dunque $TH : TN :: \text{sen. } TNO : \text{sen. } THO$; dunque la distanza TH nel primo caso è alla distanza TN nel secondo , come il seno della parallasse nel secondo caso al seno della parallasse nel primo . Dunque ec. La dimostrazione medesima avrebbe luogo qualunque fosse l'angolo TOH , purchè i punti

ti N, H fossero nella medesima linea OHN. Perciò quando l'altezza apparente è la stessa, i seni delle parallasse d'altezza sono in ragione delle distanze.

584. La parallasse d'un astro cresce coll'istessa proporzione del diametro apparente: se la distanza cresce, scema nello stesso rapporto il diametro (583) e la parallasse: perciò la parallasse d'un astro è sempre come il diametro: così a qualunque altezza il diametro della luna è sempre $\frac{6}{11}$ della sua parallasse, ed il cubo di questa frazione marca la gros-

sezza o il volume della luna rapporto alla terra $\frac{1}{49}$.

585. Conoscendo la parallasse orizzontale d'un astro, è facile conoscere la sua distanza: poichè nel triangolo rettangolo THO si conosce il semidiametro della terra TO, ch'è di 1432 $\frac{1}{2}$ leghe (ciascuna di 2283 pertiche) (sono miglia geografiche 3434 da 953 pertiche l'uno), e l'angolo HOT di 90°, supposto il pianeta nell'orizzonte; se dunque inoltre si conosce l'angolo THO ch'è la parallasse orizzontale, risolvendo il triangolo TOH si conosce TH. In tal modo sonosi trovate ed espresse in misure note le distanze di tutti i pianeti nella tavola in fine, ed in tal modo arrivano gli astronomi a conoscere l'estensione degl'immenzi spazj percorsi dai pianeti.

Metodi per trovare la parallasse orizzontale d'un pianeta.

586. Gli astronomi anno travagliato in tutti i tempi a conoscere le distanze de' pianeti per via delle loro parallasse, sopra tutto la parallasse della luna ch'è la più sensibile. L'ecclissi della luna somministrano un metodo che poteva altre volte esser assai buono; se ne vedrà la dimostrazione parlando dell'ecclissi (619).

587. S'è adoprato sopra tutto il metodo delle maggiori latitudini, che consiste nell'osservare la latitudine meridionale della luna quando passa per il meridiano assai presso dell'orizzonte, quanto sorpassi la latitudine maggior boreale quando la luna passa assai alta: queste due latitudini, che farebbero uguali vedute dal centro della terra, non possono differire che a ragion della parallasse, che cresce l'una e diminuisce l'altra: quando però si ha la differenza di queste due latitudini osservate, si può concludere la parallasse, che ha prodotto questa difuguaglianza. Questo era il metodo di Tolomeo; e Ticone e Flamstedio l'anno adoprato con successo.

588. S'è impiegato pure in genere il metodo delle ascensioni rette, di cui il Regiomontano diede la prima idea sono 300 anni. Questo metodo consiste in osservare l'ascension retta d'un pianeta vicino all'orizzonte a levante, ed alcune ore dopo verso ponente; l'ascension retta viene cresciuta dalla parallasse nel primo caso, diminuita nel secondo; e quindi si deduce la parallasse istessa. Questo metodo principalmente fu adoprato dal

dal Sig. Cassini e dal Flamstedio per trovare la parallasse di marte, e indi quella del sole.

389. Il terzo metodo per determinar la parallasse è quello che suppone due osservatori lontanissimi uno dall'altro, osservando ad un tempo l'altezza d'uno stesso astro nel meridiano; questo è il metodo il più naturale ed il più esatto adoprato da me e dal Sig. De la Caille nel 1751, quando egli osservava al Capo di Buona Speranza, ed io in Berlino la luna per determinare la sua parallasse, il che non era stato fatto prima con metodo esatto (*Mém. Acad.* 1751). Il caso più semplice di questo metodo è quello, che un osservatore si trovasse in O (*fig. 67*), e un altro in D, lontano in circa un quadrante della terra. Il primo essendo in O osserverebbe l'astro H nell'orizzonte; il secondo in D nel zenit; in tal caso l'angolo OHT, che è la parallasse orizzontale sarebbe uguale all'angolo HTE, che è il complemento dell'arco OD, distanza degli osservatori o sia differenza delle latitudini, supposto che sieno nello stesso meridiano. E' impossibile per le circostanze locali d'incontrar in pratica un caso così semplice. Perciò vediamo cosa accade quando li due osservatori sono a qualunque distanza, e l'astro apparisce a qualunque altezza.

390. Supponiamo, come nel 1751, un osservatore B (*fig. 68*) posto in Berlino, e un altro in C al Capo di Buona Speranza; L la luna, da ambedue noi osservata nel tempo stesso al meridiano; (non importa la piccola differenza di meridiani purchè si sappia quanto ha dovuto variar l'altezza meridiana nell'intervallo dei due passaggi); CLT è la parallasse d'altezza per il Capo, BLT per Berlino; la somma di queste due parallasse è l'angolo CLB, differenza totale fra le posizioni della luna vedute dai due osservatori, o argomento totale della parallasse orizzontale; farebbe la loro differenza, se gli osservatori vedessero ambedue l'astro al mezzodì, o ambedue a tramontana. Or quando si anno le parallasse di altezza per due luoghi qualunque, è facile d'aver la parallasse orizzontale, bastando divider ciascuna per il coseno dell'altezza osservata; si divida cioè l'effetto totale CLB in due parti proporzionali ai coseni dell'altezze, e ciascuna parte si divida per il coseno dell'altezza corrispondente. Con questo metodo ho io trovato che la parallasse della luna nelle distanze medie è di $38' 3''$. Ma ella varia tanto a cagione della figura ellittica dell'orbita lunare, quanto a cagion dell'attrazione del sole e della terra. La maggior parallasse della luna (in perigeo e in opposizione) è di $61' 25''$, la minima parallasse in apogeo e in congiunzione è di $33' 33''$, sotto la latitudine di Parigi; l'appianamento della terra fa che sia $9''$ di più sotto l'equatore, e $7''$ di meno sotto i poli, di modo che la parallasse equatoriale sorpassa di $16''$ la parallasse polare della luna (821).

Questi metodi anno fatto trovar parimenti che la parallasse del sole non era che di $10''$ in circa; ma il passaggio di venere sul sole, osservato nel 1769, dimostrò che questa parallasse non era se non che di $8'' \frac{1}{2}$

dal

dal che segue che il sole è 400 volte più lontano da noi che la luna, perchè la sua parallasse è 400 volte minore.

501. Quando si avrà veduto qui dopo che la terra è schiacciata ai poli (816), si capirà che la parallasse differisce un poco da un paese all'altro, secondo che la loro distanza dal centro è più o men grande. Gli astronomi anno ricercato per molti anni un metodo facile per far entrar questa considerazione nel calcolo delle parallassi; questo è quello che io ho dato nelle nostre Memorie del 1764.

L'ellisse POE (fig. 69), rappresenta un meridiano della terra; P il polo elevato, O il luogo dell'osservatore; ON la verticale o sia la perpendicolare all'orizzonte e alla superficie della terra in O; CNH la meridiana orizzontale, cioè la comune sezione del meridiano coll'orizzonte; CON l'angolo della verticale col raggio CO (che per Parigi è circa 15°, se ne darà una Tavola art. 821) che chiamerò α . La perpendicolare ON è sensibilmente uguale al raggio CO per la piccolezza dell'angolo CON; il valore del raggio CO per differenti latitudini si troverà nel Libro ottavo colla quantità dell'aumento della parallasse per ogni latitudine terrestre sulla parallasse polare che ha per base CP (821). La parallasse che avesse per base NO, sarebbe minore d'una cento millesima della parallasse orizzontale, che ha per base CO, differenza che non arriva a un trentesimo di secondo, e che si può trascurare: se l'osservatore O fosse in N, vedrebbe ancora la luna nella stessa verticale di O, e nello stesso punto di azimuto. Ma questo azimuto in cui apparisce la luna veduta dal punto O, o dal punto N quando la luna è nel meridiano, è differente da quello in cui apparirebbe se si osservasse nel centro C della terra; i raggi tirati dal punto C e dal punto N fino alla luna fuori del meridiano fanno allora un angolo, che io chiamo *parallasse di azimuto*. Se il raggio diretto verso la luna è perpendicolare a CN, questa linea CN sarà la sottesa, o la misura della parallasse di azimuto, perchè negli archi piccolissimi i seni e le tangenti non differiscono sensibilmente dagli archi; chiamata p la parallasse orizzontale, che corrisponde al raggio CO, o ON, si avrà 1, o CO : sen. α , o CN :: p : parallasse d'azimuto; perciò questa parallasse che risponde a CN, farà $\equiv p$ sen. α , la luna trovandosi nell'orizzonte, ed avendo 90° d'azimuto, vale a dire essendo nel primo verticale.

502. Se la luna si accosta a tramontana, e il suo azimuto contato dal mezzodì è maggior di 90°, l'angolo della luna di cui CN è la base, diventa minore. Sia CN (fig. 70), l'istessa linea che nella figura 69; tirata separatamente, e che si estende orizzontalmente da mezzodì a tramontana dal centro della terra fino a trovar la verticale; il raggio CMR sia diretto verso il punto dell'orizzonte corrispondente alla luna, e ne segui l'azimuto, uguale all'angolo NCM, che chiamerò ϵ ; la perpendicolare MN calata dal punto N sopra CR farà la misura della parallasse d'azimuto in vece di CN; perchè è lo stesso, quanto a questa parallasse, che la luna sia veduta dal punto C, o dal punto M, l'un e l'altro essendo nel medesimo verticale, ma è meglio quanto alla misura di essa parallasse, considerar la luna come veduta dal punto M. ora MN $\equiv$ CN sen. NCM, o CN sen. ϵ ; la parallasse che corrisponde a CN è p sen. α ; dunque quella che corrisponde a MN, è p sen. α sen. ϵ ; questa è la formola generale, o il valore della parallasse d'azimuto, supposta la luna nell'orizzonte con un azimuto uguale a ϵ .

503. La parallasse d'azimuto impiegata nel calcolo delle eclissi (710) deve esser misurata sopra un arco di cerchio massimo tirato per il centro della luna perpendicolarmente al verticale o parallelamente all'orizzonte: arco che non si cambia qualunque sia l'altezza della luna, per esser formato in tutti i casi dall'incontro delle due linee tirate dai punti M ed N alla luna, o nel piano dell'orizzonte, o in un piano di cui la parte NM è orizzontale, e vanno ad unirsi nella luna. Onde la parallasse d'azimuto per qualunque altezza sarà ancora p sen. α sen. ϵ ; se ne vedrà l'uso nel calcolo dell'eclissi (710).

504. Questa parallasse d'azimuto rita seco una piccola mutazione nella parallasse di altezza. Poichè se l'osservatore fosse situato in N (fig. 69), la parallasse di altezza sarebbe misurata sulla base ON, e sarebbe p col. δ , secondo la regola ordinaria (822);

(581) ; ma l'altezza vera veduta dal centro C della terra è un po più picciola , se la luna si trova a mezzodi del primo verticale ; e un po più grande se la luna è al nord o dalla parte del polo elevato , poichè il raggio tirato dal punto C , e quello ch'è tirato dal punto N , non anno una istessa inclinazione . Occorre dunque di fare una correzione alla parallasse di altezza trovata colla regola ordinaria .

595. Sia L (*fig. 70*) la luna fuori del meridiano ; CML il piano del verticale della luna , in modo che l'angolo LCM sia l'altezza della luna veduta dal centro della terra , la linea CM si trova insieme nel piano dell'orizzonte e in quello del verticale ; sia pure il piccolo arco MN perpendicolare sopra CM . L'altezza della luna veduta dal centro C della terra è minore dell'altezza veduta dal punto N , o M , per la quantità dell'angolo CLM . Imperciocchè essendo l'archetto MN è perpendicolare sopra CM , lo è anche sopra LM , perchè necessariamente è normale al piano del verticale LMC , e a tutte le linee tirate per il punto M di quello piano . Perciò la linea MN essendo come infinitamente piccola rapporto alla gran distanza LM , le linee LM, LN sono sensibilmente uguali ; il punto M dunque si trova situato del pari e all'istessa distanza dalla luna , che il punto N ; dunque l'altezza della luna veduta dal punto N , o dal punto M , si trova sensibilmente la stessa . Ma l'altezza della luna veduta dal punto M , ch'è l'angolo LMR , è maggiore dell'altezza veduta dal punto C (= all'angolo LCM) per la quantità dell'angolo CLM , dunque l'altezza della luna veduta dal punto C è minore dell'altezza veduta dal punto N per la quantità dell'angolo CLM .

596. Quando la luna è fuori del meridiano , quest'angolo CLM è minore che quando è nel meridiano , e ciò in proporzione del coseno d'azimuto al raggio . Imperciocchè quando la luna si trova nel meridiano (supposto l'altezza e le distanza la stessa) il punto M cade nel punto N , e l'angolo LCN è l'altezza della luna (concepiscasi il triangolo rilevato perpendicolarmente sul piano della figura) . Or esaminando nei due casi il valore dell'angolo CLM , si vede , che quando la luna è fuori del meridiano ha per base la linea CM , ma nel meridiano la CN ; come per altro tutto è uguale , la distanza CL , l'inclinazione del raggio CL sopra CM , e CN , e le linee CM, CN sono estremamente piccole , i piccoli angoli saranno tra loro , come le loro basi CN, CM . Ma nel triangolo CMN rettangolo in N, CN è a CM , come il raggio è al coseno dell'angolo NCM , ch'è l'azimuto della luna ; dunque la differenza CLM tra l'altezza della luna vedute dal punto N e dal punto C , quando la luna è fuori del meridiano , è a questa differenza , essendo la luna nel meridiano a uguale altezza , come il coseno dell'azimuto al raggio .

597. L'angolo LMC , nel caso che fosse il più grande ed avesse per base l'intera linea CN , sarebbe uguale a $p \text{ sen. } a$ (591) , perchè sarebbe allora la parallasse d'azimuto : se dunque avesse per base e per misura il piccolo arco CM , chiamando e l'azimuto NCM , si avrà questa proporzione ; $s : \text{cof. } x :: p \text{ sen. } a : \text{CLM}$; dunque l'angolo CLM farebbe $= p \text{ sen. } a \text{ cof. } x$, nel caso che CL fosse perpendicolare a CM ; ma per l'obliquità della linea CL e dell'angolo LCR sulla base CM , che diminuisce l'angolo CLM , non ha per misura che MS , che si ha a CM , come il seno dell'altezza MCS è al raggio , o come $\text{sen. } h : r$; dunque l'angolo CLM è uguale a $p \text{ sen. } a \text{ cof. } x \text{ sen. } h$, equazione della parallasse d'altezza nella sferoide appianata .

598. Questa correzione è additiva alla parallasse calcolata per il punto N , quando la luna è tra il primo verticale ed il polo elevato ; in tutti gli altri casi si sottra dalla parallasse calcolata col metodo ordinario , e si ha la vera parallasse d'altezza nella sferoide schiacciata . Nel libro seguente (718) darò un metodo per calcolare le eclissi per le sole parallasse d'altezza e di azimuto ; e per questo ho voluto qui spiegare tutto ciò che concerne le parallasse .

599. Quando si calcola la parallasse d'altezza colla formula $p \text{ cof. } b$ (581) , si suppone il centro della terra in N (*fig. 69*) nel verticale ON , e si trova la differenza tra il luogo veduto dal punto O , e il luogo veduto dal punto N , coll'istessa parallasse orizzontale che ha per base ON eguale ad OC , tanto sulla terra sferica , che sulla terra appianata . Ma perchè si deve ridurre il luogo della luna al centro C ; dalla parallasse $p \text{ cof. } b$ conviene sottrarre la correzione $p \text{ sen. } a \text{ sen. } h \text{ cof. } x$,

che diventa additiva quando l'azimuto contato dall'opposto del polo elevato, è maggiore di 90° . In questo modo si arriva sulla terra schiacciata, non meno che sulla sferica, a ridurre al centro C della terra il luogo veduto dal punto O, per un piccolo cambiamento di altezza e d'azimuto, quando si conoscono i raggi della terra, e gli angoli delle verticali coi raggi della terra, di cui si troverà la Tavola nel Lib. VIII. (821).



LIBRO QUINTO.

Delle Ecclissi.

600. Le ecclissi (*deliqui*) del sole succedono, quando la luna nel novilunio ci nasconde il sole; e le ecclissi della luna, quando nel plenilunio la terra impedisce ai raggi del sole di arrivare alla luna, o quando, il che è lo stesso, la luna entra nell'ombra della terra (544).

Se l'orbita della luna fosse nel piano dell'ecclittica, come quella del sole, in tutti i novilunj e plenilunj succederebbero ecclissi; ma essendo l'orbita della luna inclinata all'ecclittica 5° (565), e non tagliandola perciò che in due soli punti, che diconsi *nodi*, quindi è che l'ecclissi non possono prodursi, se non quando la luna è vicina ai nodi, e vicina all'ecclittica; perchè in tal caso potrà nasconderci il sole, che sta sempre sull'ecclittica, o immergersi nell'ombra terrestre, che sta essa pure sempre nel piano dell'ecclittica.

601. Dai moti del sole, della luna, e de' suoi nodi nascono nel ritorno dell'ecclissi delle continue disuguaglianze; lo sviluppo delle quali deve aver costato molta fatica agli antichi; e le quali si cominciano veder trattate con qualche regolarità dai medesimi, sei o settecento anni soltanto prima di Gesù Cristo.

602. Vedendo gli stessi antichi, che l'ecclissi dentro un dato tempo uniforme non accadevano, si posero a cercare quanti mesi o giorni bisognavano al moto della luna, onde fosse questo della medesima quantità dentro lo stesso giro di tempo; lo trovarono di giorni 6585, ore 8, che formano 223 mesi lunari, cioè 18 anni e 10 giorni; e a capo di questo tempo, compiutesi dal sole 18 rivoluzioni $10^{\circ} 40'$ succedeva sempre una stessa ecclissi. Nel quale intervallo tutte le disuguaglianze della luna, in longitudine, e in latitudine, compiuto il loro corso, ricominciavano di nuovo (*Almag. IV. 2. p. 77.*). Il Sig. Halley chiama questo intervallo, *Saros*, periodo *Caldaico*, o periodo di *Plinio*; ed è probabile, che colla scorta soltanto di questo periodo abbiano gli antichi predette alcune ecclissi, come Talete, 603 anni prima di G. C. E lo stesso Halley preannunziò l'ecclissi del sole del dì 2 Luglio 1684 v. l. per mezzo di quella che si era vista li 22 Giugno 1666. E questo metodo è sufficiente a predire i mesi circa e i giorni, nei quali succederanno ecclissi, e per correggere le tavole, e predire una ecclissi per mezzo d'una, che si fosse 18 anni prima osservata.

603. Per sapere appresso a poco se nel novilunio o plenilunio di tal mese possa nascere ecclisse, conoscendo il sito dei nodi della luna, si cerchi in quel mese dell'anno, in cui il sole si trova vicino agli stessi nodi, i giorni del novilunio e plenilunio, indi la latitudine della luna; la quale se sarà di un grado circa, potrássi forse aspettare una ecclissi.

604. Per essere poi certo d'una qualche ecclissi in un novilunio o plenilunio-

nilunio e per poterne calcolare tutte le circostanze , bisogna conoscere l' ore e il minuto della congiunzione o della opposizione , cioè quel punto , in cui il sito della luna calcolato colle tavole , si trova lo stesso con quello del sole nella ecclittica : in oltre bisogna calcolare la latitudine che avrà la luna al punto della congiunzione ; il di lei moto orario in longitudine e in latitudine , la parallasse e i diametri del sole e della luna ; il che costituisce il principale fondamento del calcolo delle eclissi solari e lunari .

605. Noti i moti orarj della luna in longitudine e in latitudine , deve cercar l'inclinazione della orbita vera della luna colla ecclittica , indi quella dell'orbita relativa : il che è necessario per l'eclissi della luna , e del sole ancora , quando cerchinsi le fasi per diversi luoghi terrestri ; e quindi è ch' io pongo questo articolo fra i fondamenti universali del calcolo dell'eclissi .

Quando si calcola una congiunzione di due pianeti , o d' un pianeta e d' una stella , una eclissi , o un appulso , non fa d' uopo conoscere se non quanto in un dato tempo uno de' due astri s' avvicini all' altro , che diceasi moto relativo . Per esempio trattandosi d' una eclisse del sole , si cerca con quale velocità e con quale direzione la luna s' accosti al sole ; per il che basta cercare quanto in un' ora la longitudine d' un pianeta e la latitudine sia maggiore di quella dell' altro ; nascendo una congiunzione o una eclissi , in forza dell' eccesso d' uno di tali moti sopra l' altro , e non già in forza del moto reale totale e assoluto di ciascun dei due pianeti .

606. Si può dunque trascurare il moto d' uno de' due pianeti , facendo muovere l' altro colla differenza dei due moti , facendogli cioè cangiare longitudine e latitudine rapporto all' altro di tal quantità , quale ricerca la combinazione dei due moti presi insieme . E con questo mezzo si avrà la congiunzione apparente di due astri , come se si fossero considerati insieme i moti d' ambedue .

607. Così per calcolare la congiunzione di due pianeti , non si bada che al moto relativo , e uno dei due pianeti si suppone immobile ; con che senza cangiare punto la sostanza della cosa si rende molto più semplice il calcolo : se un pianeta percorre verso l' oriente in un' ora 36 minuti e un altro soli 2 , la distanza dell' uno dall' altro sarà di 34 minuti , la quale distanza resta la stessa dentro d' un' ora , come se , restandone uno immobile , l' altro cammini ogni ora 34 minuti . Questa distanza apparente si rappresenta con una linea retta , base d' un triangolo rettangolo , i di cui due lati sono le differenze di longitudine e latitudine ; così questa distanza sarà sempre la stessa poste le medesime differenze di longitudine e latitudine , sia che si considerino ambedue i moti o un solo .

608. Descritto dunque un triangolo MNO (*fig. 71*), i di cui lati MN , NO sieno eguali alla differenza dei moti orarj in longitudine e in latitudine , l'angolo OMN sarà l' inclinazione dell' orbita relativa , e la base OM sarà il moto orario per la stella : e supposto il sole fissa in M , la luna avrà percorso MO : e così si vede che la differenza fra la longitudine e latitudine di due pianeti sarà la stessa , come se ambedue si

mo-

moveffero; e l'ipotesi dell' orbita relativa MO rende il calcolo molto più semplice.

609. Così l' orbita relativa MO è quella che si può supporre in luogo della reale. Il triangolo MNO ci fornisce queste analogie; MN : NO come il raggio alla tangente OMN; e il coseno dell'angolo OMN è al raggio, come MN : MO; dunque l'inclinazione dell' orbita relativa, e il moto orario relativo si troveranno con queste due analogie. *La differenza dei moti orarj in longitudine sta a quella in latitudine come il raggio alla tangente della inclinazione relativa. Seconda: coseno dell'inclinazione relativa sta al raggio, come la differenza dei moti orarj in longitudine al moto orario MO per l'orbita relativa.* E di queste ci serviremo (620), e daremo un esempio all' art. 621. (*Avvertasi che l'orbita relativa non è lo stesso con l'orbita apparente (718)*).

610. In queste due analogie si suppone il moto dei pianeti sì in longitudine, come in latitudine verso la stessa parte; ma se uno fosse diretto, l'altro retrogrado, cioè se la longitudine dell'uno andasse crescendo, dell'altro diminuendo, in tal caso in vece della differenza si dovrebbe prendere la somma dei moti orarj in longitudine. Parimenti se la latitudine dell'uno si accrescesse, e dell'altro scemasse dalla stessa parte dell'ecclittica, cioè se uno si movesse in latitudine verso il nord, l'altro verso il sud, bisognerebbe prendere la somma in vece della differenza dei loro moti orarj in latitudine: e questo può succedere nelle ecclissi dei pianeti cagionate dalla luna (725).

611. Nelle ecclissi della luna, l'altro pianeta, che si considera, non è già il sole, ma il punto ad esso opposto, che è il centro dell'ombra della terra, il di cui moto orario in longitudine è lo stesso con quello del sole, e si considera perciò come se fosse il sole medesimo. Nelle due porzioni poi (609) s'adopera il moto in latitudine soltanto della luna, giacchè il sole non ne ha.

612. Nel calcolo delle ecclissi della luna, per avere il moto relativo in longitudine, basta aggiungere 8 secondi alla differenza dei moti orarj in longitudine, e tralasciare con ciò l'altra analogia; perchè in un triangolo, un angolo del quale è $50^{\circ} \frac{1}{2}$, e l'ipotenusa 30 minuti, il lato maggiore di soli 8" circa supera l'ipotenusa.

613. Nelle ecclissi del sole, o delle stelle, se non vogliam calcolare che graficamente (695) basta conoscere dentro 3 minuti l'inclinazione dell'orbita lunare, che si potrà perciò supporre sempre di $50^{\circ} 40'$ per l'ecclissi del sole; e di $50^{\circ} 9'$ per l'ecclissi delle stelle. Ma se si volesse calcolarle con esattezza, o se si trattasse d'una ecclissi di stella cagionata dalla luna, bisognerebbe cercare il moto orario della luna in longitudine e in latitudine, e sviluppare le analogie dell'art. 609.

Delle eclissi della Luna.

614. L'eclisse della luna è l'oscurità cagionata sul disco della medesima dall'ombra della terra. Dicefi totale, se tutto, e parziale se parte del disco sarà oscurato. *Centrale*, quando l'opposizione nasce nel punto istesso del nodo; nel qual caso la luna passa per il centro del cono ombroso.

615. Passano alle volte degli anni senza alcuna eclisse della luna; tale fu il 1767; ma per lo più ve n'hanno molte in ciaschedun anno.

616. Se la luna nel punto del plenilunio vero si trovasse talmente discosta da' suoi nodi, che la di lei latitudine fosse maggiore di 64 min., in tal caso non vi sarebbe eclisse, perchè l'ombra della terra (618) non occupa maggiore spazio di 47 min. nell'orbita della luna, e il semidiametro 17'; onde il lembo della luna non può toccare l'ombra se la distanza dei centri della luna e dell'ombra o sia la latitudine della luna sarà maggiore di 64'. Se questa distanza sarà maggiore di 30', l'eclisse non farà mai totale.

617. Siccome si misurano i moti della luna per via degli archi celesti da essa descritti, così bisognerà nello stesso modo misurare l'ombra, per cui passa nell'eclisse, cioè la larghezza di quel cono ombroso prodotto dalla terra, che trattiene i raggi solari, come tutti i corpi opachi.

Sia S il centro del sole (fig. 72), T della terra, L della luna nel plenilunio, SA il semidiametro del sole, TB della terra, LC dell'ombra terrestre in quel sito per cui deve passare la luna; questa linea LC è il raggio del cerchio ombroso prodotto nella regione della luna da una sezione perpendicolare all'asse.

L'angolo CTL nel centro della terra, che ha per base il lato CL, si dirà semidiametro dell'ombra, e questo è quell'angolo, sotto di cui ci si mostra il moto della luna, o l'arco della sua orbita descritto nella metà del tempo, in cui compie l'eclisse del centro, cioè nel tempo in cui percorre l'ombra da C in L.

618. Nel triangolo rettilineo CAT, prolungato il lato AT in D, si ha l'angolo esterno CTD eguale agl'interni BAT, BCT; il primo de' quali è la parallasse del sole, l'altro della luna (579); e perciò sarà l'angolo CTD eguale alla somma delle parallasse. E se dall'angolo CTD si levi l'angolo LTD, resterà l'angolo CTL, cioè il semidiametro dell'ombra; ma l'angolo LTD è uguale all'opposto ATS, cioè al semidiametro apparente del sole; dunque *levandosi il semidiametro apparente del sole dalla somma delle parallasse, resterà il semidiametro dell'ombra in quella distanza TL dalla terra, in cui si trova la luna. Questo cerchio ombroso nato dalla sezione del cono ombroso si vede nella fig. 73.*

Esempio. Il dì 17 Marzo 1764 la parallasse orizzontale della luna nel punto della opposizione era 60' 56"; quella del sole è costante di $8\frac{1}{2}$ sec. (590); la loro somma dunque è 61' 5", toltone il semidiametro del

del sole $16' 5''$ resteranno $43' 6''$ semidiametro dell'ombra; al quale però bisognerà aggiungere ancora $45''$, cioè tanti secondi quanti sono i minuti per causa dell'atmosfera terrestre, per cui l'ombra s'accresce circa $\frac{1}{60}$.

Questo semidiametro così trovato sta dentro i limiti $37' 46''$ e $46' 19''$; si trova massimo quando la luna è perigea e il sole apogeo.

619. Essendo il semidiametro dell'ombra eguale alla somma delle parallasse toltono il semidiametro del sole, ed essendo piccolissima la parallasse del sole, si vede che il semidiametro dell'ombra potrà averfi col levare soltanto il semidiametro del sole dalla parallasse della luna. Dunque la parallasse della luna potrà ottenersi aggiungendo il semidiametro del sole al semidiametro dell'ombra altronde noto dalla durata d'una eclisse. Il quale metodo potè essere impiegato in quel tempo, in cui poco si conosceva questa parallasse (386).

Trovare le fasi d'una eclisse di luna.

620. Nota l'ora del plenilunio o della opposizione vera, la latitudine che avrà allora la luna, e l'inclinazione dell'orbita che dipende dal moto orario della luna in longitudine e in latitudine, si deve cercare l'ora del mezzo dell'eclisse.

Sia O (fig. 73) il punto dell'eclittica opposto al sole, cioè il centro dell'ombra della terra in quella distanza in cui si trovava la luna: OG il semidiametro dell'ombra, ELS l'orbita relativa della luna (609): L il luogo della luna al punto della opposizione, OL la latitudine della luna, o sia la distanza dall'eclittica KG; OM la perpendicolare calata sull'orbita relativa EMS. Quando comincia l'eclisse, trovandosi la luna in E, il di lei lembo tocca in P il confine dell'ombra; dunque sul principiar dell'eclisse la luna si trova in E; e nello stesso modo sul finire della medesima la luna si trova in S. I triangoli MOE, MOS rettangoli in M, sono eguali per essere il lato MO comune, ed eguali i lati OS, OE; dunque sarà EM eguale ad MS; e perciò il punto M indicherà il mezzo dell'eclisse. L'opposizione per altro nasce, quando la luna si trova nel punto L, che viene determinato dal cerchio di latitudine OL condotto dal punto O direttamente opposto al sole, e perpendicolare all'eclittica KG.

621. Nel triangolo LOM, formato dal cerchio di latitudine OL e dalla perpendicolare OM, essendo noti l'angolo LOM eguale all'inclinazione dell'orbita relativa della luna (609); (facendo sempre la perpendicolare all'orbita e la perpendicolare all'eclittica il medesimo angolo, che forma l'orbita coll'eclittica) e il lato LO, latitudine della luna nella opposizione, si troverà il lato LM con quest'analogia: *il raggio è al seno della inclinazione, come la latitudine OL allo spazio LM*; il quale spazio LM si ridurrà in tempo relativamente al moto orario della luna, con quest'analogia: *il moto orario relativo (609) è a un'ora, cioè 3600°, come lo spazio ML al tempo che passa tra la opposizione, e il mez-*

zo dell'eclisse. Questo tempo levatolo dal tempo dell'opposizione, se la latitudine della luna s'accresce, o pure aggiuntolo allo stesso, se va scemando, cioè, se la luna va accostandosi all'eclittica e al nodo, si avrà il mezzo dell'eclisse.

622. Esempio. Per l'eclisse della luna del dì 17 Marzo 1764, si trovò colle Tavole che l'opposizione vera dovea succedere a $12^h 6' 12''$ per il meridiano di Parigi: il moto orario della luna in longitudine era di $37' 23''$; in latitudine di $3' 26''$; del sole poi di $2' 29''$. La differenza de' moti orarj, $34' 54''$, sta al moto in latitudine $3' 26''$ come il raggio alla tangente di $50' 37'$ inclinazione relativa. Il coseno di questa inclinazione $50' 37'$ sta al raggio, come la differenza de' moti orarj in longitudine, $34' 54''$, al moto orario della luna per l'orbita relativa $35' 4''$ (609).

La latitudine della luna al punto della opposizione era $38' 42''$; dunque si dica il raggio sta al seno della inclinazione $50' 37'$, come la latitudine $38' 42''$, all'intervallo ML $3' 47''$; e per ridurlo in tempo, il moto orario relativo $35' 4''$ a $60' 0''$, come $3' 47''$ a $6' 28''$ di tempo; che per essere decrescente la latitudine della luna non giunta ancora al suo nodo, si aggiungerà all'ora della opposizione $12^h 6' 12''$, e si avrà l'ora $12^h 12' 40''$ del mezzo dell'eclisse, cioè a $0^h 12' 40''$ mat. dell'18 Marzo.

623. Le stesse quantità colle quali si trova la differenza LM fra la opposizione e il mezzo dell'eclisse, ci serviranno per trovare la minima distanza OM dell'orbita lunare dal centro ombroso; poichè nello stesso triangolo rettangolo LOM essendo noto il lato LO latitudine nella opposizione, e l'angolo LOM inclinazione dell'orbita relativa, si troverà OM di $38' 31''$.

624. Per avere il principio e il fine dell'eclisse, sia E il centro della luna sul punto del suo entrare o toccare l'ombra, cioè sul principiare dell'eclisse. La distanza OE del centro della luna dal centro dell'ombra è uguale alle due rette OP semidiametro dell'ombra (618), e PE semidiametro della luna. Lo stesso si dica di OS , eguale alle due stesse OR , RS ; e questa distanza sarà nel proposto esempio di $10' 3' 19''$.

625. Nel triangolo rettilineo OEM rettangolo in M , dalla nota perpendicolare OM , colla somma de' semidiametri della luna e dell'ombra OE , si avrà il terzo lato EM che si trova di $50' 13''$, che si ridurrà in tempo come sopra, facendosi: Il moto orario della luna $35' 4''$ a un'ora, o $3600''$, come il lato ME $50' 13''$ alla metà del tempo di tutta l'eclisse $1^h 25' 59''$.

626. Questa metà di tempo è quella, che impiega la luna andando da E in M ; ma si trova la luna in M a ore $12 12' 40''$ (622); dunque levandone un'ora $25' 59''$, si avrà il principio dell'eclisse a ore $10 46' 41''$, e aggiungendo lo stesso tempo, si averà il fine a ore $13 38' 39''$.

627. Nelle eclissi totali della luna devono cercarsi altre due fasi, cioè l'im-

l'immersione, e l'emersione in N e in R (fig. 74). Il centro della luna si trova in D in quel punto in cui tutta intieramente entrò nell'ombra; per trovare il qual punto di tempo bisognerà sciorre il triangolo OMD, la di cui base OD è uguale alla differenza fra i semidiametri dell'ombra ON e della luna DN, e si sciorrà come al § 625: levando cioè la metà del tempo di tutta l'eclisse totale dal tempo in cui si ha il mezzo in M per avere l'immersione in D, e aggiungendola per avere l'emersione in V.

628. Conoscendofi la minima distanza dei centri OM (fig. 73), e li semidiametri dell'ombra OA e della luna MB, facilmente si trova la parte AC della luna che rimane eclissata. Poichè AM è uguale ad OA — OM; cui se si aggiunga MC, si ha AC. Dunque la parte AC è uguale ad OA + MC — OM; cioè la parte eclissata è uguale alla somma dei semidiametri ombroso e lunare, meno la minima distanza. Il che avrebbe luogo anche nella parte AC (fig. 74), la quale pure dicefi grandezza dell'eclisse, comprendendovi cioè la parte dell'ombra, che eccede il lembo della luna.

Esempio. Nell'eclisse dei 17 Marzo 1764 la somma dei semidiametri era di $63' 19''$, e la minima distanza $38' 31''$; dunque la parte eclissata AO $24' 48''$ loro differenza. Questa parte AC foggiono gli astronomi esprimerla in *digiti*, cioè in parti duodecime del diametro lunare; per trovare i quali si dirà: il diametro apparente della luna $33' 18''$ sta a 12 digiti e minuti zero, come $24' 48''$ al quarto, che sarà digiti $8' 56'' \frac{1}{2}$ grandezza cercata dell'eclisse in digiti.

629. Tutte le fasi d'una eclissi lunare si possono anche determinare colla sola riga e compasso senza calcolo alcuno, trovato però prima colle Tavole il tempo della congiunzione, la latitudine, la parallasse e il moto orario. Il qual metodo è bastantissimo se non si voglia che predire l'eclisse; perchè se la figura che si delinea avrà un piede di diametro, l'errore che si potrà commettere non arriverà a un minuto; e d'altro canto nella predizione delle eclissi della luna non si può aspettare maggiore esattezza, potendosi appena assicurarfi di non isbagliare di un minuto circa nella stessa osservazione. Per il che io credo che in tutte l'eclissi della luna possi bastare l'operazione grafica.

630. Esempio. Trovato il semidiametro OG (fig. 73) dell'ombra di $46'$ (618), lo divido in 46 parti; prendo OL eguale alla latitudine della luna $38' \frac{2}{3}$, i quali $38' \frac{2}{3}$ li prendo dalla divisione OG, che serve di scala. Per il punto L descrivo l'orbita della luna ELS che formi l'angolo $50' 37''$, o pure $50' 40''$ (613) sopra una parallela all'eclittica. Indi piantando il compasso in L prendo LX eguale a 35 parti della scala, giacchè il moto orario relativo della luna è di $35'$: in L scrivo l'ora della opposizione $12^h 6'$, e in X perciò $11^h 6'$; poscia divido la porzione di orbita XL percorsa dalla luna in un'ora in 60 minuti di tempo, e seguo la stessa divisione per tutta l'orbita ELS. Prendo
Y col

col compasso sulla scala una linea eguale alla somma de' semidiametri dell'ombra e della luna $1^{\circ} 3'$, e piantato un lato del compasso in O, segno coll'altro lato i punti E, S; e osservo che il punto S corrisponde a ore 13 minuti 39, come sopra col calcolo (626). Lo stesso è dei punti E, M, ec.

631. La penombra è una oscurità più debole di quella del cono d'ombra; e nasce da una luce fiacca di porzione del disco solare, che illumina la luna anche quando dal centro non ne proviene alcuna. Il punto E (*fig. 72*) sul lato OEP del cono ombroso è sepolto in una perfetta oscurità, perchè non può ricevere raggio alcuno dal sole; al contrario il punto F sulla linea AGF condotta dal lembo superiore A del sole per il lembo inferiore G della terra, gode di piena luce perchè vede intieramente il disco AO del sole: ma tutti li punti compresi tra E ed F non veggono che parte del disco solare; e non ricevono perciò se non parte di luce e formano la penombra. Questa penombra è causa della grande difficoltà che s'incontra nel fissare il principio dell'eclisse lunare, e si falla alle volte di molti minuti.

632. Nei colori che mostra la luna eclissata si osservano delle considerabili diversità. Quando la luna è apogea, passa per la parte del cono che è più vicina al vertice, e allora comparisce più rossiccia, più luminosa d'allora quando è perigea: perchè nel perigeo i raggi rifratti dall'atmosfera e dispersi per il cono, di cui ne scemano l'oscurità, non arrivano fino al centro, o all'asse dell'ombra, che in tal caso è assai larga; e perciò la luna più vicina allora alla terra, trova l'ombra più densa.

633. Ed ecco perchè in alcune eclissi la luna si è persa affatto di vista; come accadde li 15 Giugno 1620, o li 9 Dicembre 1601; nelle quali eclissi giusta il Keplero non si distingueva il lembo eclissato. Evellio parlando dell'eclisse 25 Aprile 1642, accerta, che non si distingueva il sito della luna nè anche coi telescopi, quantunque l'aria fosse sì bella, che si potevano osservare le stelle perfino di quinta grandezza; ma questo svanimento però totale della luna accade molto di rado.

Delle Eclissi del sole.

634. Le eclissi del sole nascono quando la luna nel novilunio, passando direttamente tra noi ed il sole, ci nasconde il sole intieramente, o in parte. Le eclissi sono totali, quando il sole ci comparisce tutto intieramente coperto dalla luna, nel qual caso il diametro apparente della luna è maggiore di quello del sole. Le annulari quando essendo il diametro della luna minore di quello del sole, ella ci comparisce sopra del sole in modo, che ci lascia vedere tutto all'intorno come un anello, o corona luminosa. Di tal sorta fu vista l'eclisse il primo dì d'Aprile 1764 a Cadice, a Remes, a Calais, e a Pello in Lapponia. Le eclissi centrali succedono quando la luna nel punto della sua congiunzione apparente non ha alcuna latitudine, perchè allora il di lei centro com-
pari-

parisce sul centro stesso del sole, e l'eclisse può essere totale e annulare anche essendo centrale.

635. Gli autori più vecchj ci parlano delle grandi eclissi del sole, come di tanti fatti notabilissimi. Così ne parla Isaia cap. 13, Oneto, Pindaro, e Plinio Lib. II. cap. 12, e Dionisio Alicarnasseo lib. II. il quale riferisce, che nella nascita e morte di Romolo accaddero delle eclissi totali del sole tanto oscure, quanto la mezza notte. Erodoto scrive, che nel sesto anno della guerra fra i Lidi e i Medi in tempo d'una battaglia il giorno si cangiò in densa notte; il che era stato prenunziato da Talete Mileseo dover accadere in quell'anno; della quale predizione di Talete ne parla anche Plinio (lib. II. cap. 2), e il Sig. Costard prova che questa fu la eclisse del 17 Maggio 603 anni prima di G. C. (*Philos. trans.* 1753. pag. 23). Altre simili eclissi si trovano accadute negli anni 431, 190, e 50 prima di G. C. e dopo G. C. negli anni 59, 100, 237, 360, 787, 840, 878, 957, 1133, 1187, 1191, 1241, 1415, 1485, 1544, 1560, (*Kepl. astron. part. opt. pag. 290 ec.*). Di tutte le eclissi accadute dal principio dell'era volgare se ne trova un esatto Catalogo nell'*art de verifier les dates* in foglio 1770.

636. E in fatti un'eclisse totale del sole riesce uno spettacolo molto singolare. Clavio che fu testimonio di quella delli 21 Agosto 1560 in Coimbrà attesta essere state le tenebre maggiori o almen più sensibili e spaventose di quelle della notte: non si potevano muovere i piedi, e gli uccelli per lo spavento cadevano a terra.

637. Dopo grandissimo tempo non vi fu a Parigi altra eclisse totale che quella delli 22 Maggio 1724, la di cui oscurità totale durò $2\frac{3}{4}$. Si videro a occhio nudo il sole mercurio e venere in una stessa linea; ma stelle poche a cagione delle nubi. La prima piccola parte di sole, che si scoprì, lanciò un lume improvviso e vivissimo, che tolse quella densa oscurità (*Hist. dell' Acad.* 1724); l'eclisse del 1706 fu di dieci digiti e 58 minuti; e ci rimaneva lucida $\frac{1}{12}$ parte incirca del sole; la di cui luce però pareva tinta d'un pallore spaventevole e lugubre; tutti gli oggetti per altro si distinguevano chiaramente come nel più bel dì (*Hist. dell' Acad.* 1706). Questa eclisse fu totale a Montpellier, e si osservò intorno alla luna una corona di pallida luce, larga $\frac{1}{12}$ parte del diametro lunare, nella più sensibile sua parte; ma che per altro si distingueva ancora intorno alla luna in distanza di 4 gradi, ma sempre più debole.

638. Nell'eclisse del sole del 23 Settembre 1699 non vi restò lucida, che $\frac{1}{180}$ parte del diametro solare a Gripsvvald in Pomerania, e le tenebre vi furono sì grandi, che non si poteva nè leggere, nè scrivere; e vi fu chi vide quattro stelle, che dovettero essere mercurio, venere, regina e la spica della vergine (*Hist. Acad.* 1700).

639. L'eclissi del sole in un determinato luogo della terra sono assai più

più rare delle lunari; perchè essendo la luna molto più piccola della terra, non può coprire del nostro globo che una piccolissima parte; e spesso avviene che non ci arriva in terra nè anche il vertice del cono ombroso lunare, come nell'eclissi annulari. In ogni anno però succedono molte eclissi, che alle volte, intendendo le solari e lunari insieme, giungono a sei; ma tutte non si veggono in uno stesso luogo. Perchè dal 1755 fino a tutto il 1764 non si trovano che quattro eclissi solari viste a Parigi, e al contrario undici lunari.

Avendo il Re desiderato di sapere se fra pochi anni fosse per accadere a Parigi qualche eclissi totale, io impegnai il Sig. Vaucel a tal ricerca, e trovò che da questo anno fino al 1900 vi faranno 59 eclissi visibili a Parigi, niuna delle quali farà totale, e una sola annulare li 9 Ottobre 1847 (*Mém. présentés &c. Tom. V. pag. 575*).

640. Il calcolo delle eclissi solari è molto più difficile e più lungo di quello delle lunari per causa delle parallassi, che indispensabilmente v' hanno luogo; le quali per ciaschedun punto terrestre sono diverse; onde è, che una medesima eclisse solare si vede diversamente in diverso paese; al rovescio delle lunari, che sono affatto le stesse per ognuno che le osserva, perchè allora la luna, per di fatto la luce, resta oscura a tutto il mondo.

641. Spiegherò sul principio un metodo quasi meccanico, onde la vista possi aiutare la fantasia, per scemarne la difficoltà. Spiegherò dunque una operazione grafica, colla quale si potrà calcolare una eclissi del sole rispetto alla terra in generale, colla stessa facilità, con cui se ne calcola una della luna (629); e anche spiegherò come si possa per mezzo d'un globo trovare in circa le fasi dell'eclisse per ciaschedun luogo terrestre, compiti però prima i calcoli preliminari (604).

642. Per far vedere la ragione e il principio di tale grafica operazione, mostrerò il modo con cui nel caso più semplice avvengono queste eclissi sulla superficie terrestre. Suppongo un principio, che deve sempre starci avanti gli occhi, ed è: essere tanto grande la distanza del sole dalla terra, che i raggi partendo dal di lui centro e diretti a diversi punti terrestri, si possono supporre sensibilmente tra loro paralleli. Così vedendosi dal punto T (fig. 75) che suppongo centro della terra, il centro del sole per via del raggio TS, e dal punto E sulla superficie terrestre, vedendosi lo stesso centro del sole per via del raggio EO, che forma col primo un angolo di $8^{\circ} \frac{1}{2}$ (590), e a cui s'unisce a una distanza immensa, così, dico, questo raggio è sensibilmente parallelo al primo; si può dunque supporre che dal punto E della terra si veggia il centro del sole per una linea EAO parallela alla TLS.

643. Se la luna nella sua congiunzione sarà in L, l'osservatore terrestre situato in K vedrà un'eclisse centrale del sole, poichè vedrà i centri del sole e della luna sulla stessa linea TKLS. Sia AL una porzione dell'orbita descritta dalla luna prima della congiunzione, da A verso L, cioè dall'occidente verso l'oriente. E' chiaro che l'osservatore situa-

situato in E vedrà l'eclisse centrale, giunta che sarà la luna al punto A, poichè vede i centri del sole e della luna sulla stessa linea EAO.

Se la luna spende un'ora di tempo a percorrere la porzione di sua orbita AL, chiaramente si vede, che nel luogo E si vedrà l'eclisse un'ora prima che in K, o dal centro T della terra, cioè un'ora prima della congiunzione, che io suppongo avvenire in L.

644. Io so benissimo, che si dura fatica nell'immaginarsi che il sole a un tempo stesso corrisponda a punti diversi dell'orbita lunare in diversi luoghi della terra; ma s'intenderà ciò facilmente riflettendo a quel che avviene a chi passeggia per i viali d'un giardino, ed ha il sole a destra: tutte le ombre degli alberi sono parallele fra loro; quando si passa per l'ombra del primo albero, del secondo, terzo ec. si vede il sole che corrisponde al primo, secondo, terzo albero ec. e quattro persone posta fra loro a quella distanza in cui sono li quattro alberi, vedranno il sole in faccia ad essi quattro alberi diversi. Nella stessa guisa l'osservatore in D, vede il sole che corrisponde al punto C della orbita lunare, o della proiezione, e quello che è in K, lo vede nel punto L, quello ch'è in F nel punto H. Non è bisogno d'avvisare, che i punti E, F, K girano colla terra; ma in questi preliminari generali ci basta considerare essi punti in generale, senza badare a que' paesi della terra, che occupano i diversi punti del globo).

645. Il punto E della terra, è il primo di tutti a vedere la luna che va coprendo il sole, e vedrà l'eclisse centrale, giunta che sia la luna in A (643); ma il principio dell'eclisse per il punto E si fa quando il centro della luna si sarà trovato in M, perchè vedendosi il centro del sole in A, il di lui lembo si sarà visto nel punto B, lontano dal punto A 16' circa, ch'è l'angolo sotto di cui veggiamo il semidiametro solare, nel qual caso la distanza fra i centri A, M del sole e della luna sarà stata eguale alla somma dei semidiametri AB, BM del sole e della luna. Essendo la distanza della luna dal punto della congiunzione L, o sia dalla linea dei centri, eguale alla somma dei semidiametri solare e lunare più alla linea AL eguale alla TE, è chiaro che l'osservatore, il quale dal punto E al levare del sole avrà visto toccarsi insieme i lembi della luna e del sole, vedrà l'eclisse centrale da un altro punto dello spazio assoluto diverso da E; e l'eclisse centrale si vedrà da quell'osservatore, che col suo moto sarà giunto al punto E del cerchio d'illuminazione, quando la luna sarà giunta al punto A.

646. La porzione AL dell'orbita lunare eguale al raggio ET della terra, si vede sotto l'angolo AEL eguale all'angolo ELT, che è la parallasse orizzontale della luna (578); dunque la porzione ML comparisce eguale alla somma dei semidiametri del sole e della luna e alla parallasse orizzontale della luna. E perciò il punto E della terra vedrà il principio dell'eclisse, quando la distanza ML della luna dal punto L, ove nasce la congiunzione, sarà eguale alla somma dei semidiametri solare e lunare e della parallasse orizzontale della luna. E parimenti il punto G, l'ultimo e il più orientale della terra, vedrà il fine della eclisse, quan-

quando la luna, passata già la congiunzione, sarà altrettanto lontana dal medesimo punto L.

Se AC farà eguale alla somma dei semidiametri solare e lunare, trovandosi la luna in C, il punto E della terra vedrà il fine dell' eclisse, perchè vedrà allora il centro della luna lontano dal centro del sole A della quantità AC eguale alla somma dei loro semidiametri.

Ma mentre trovandosi la luna in C, il punto E vede il fine dell' eclisse, un altro punto D, che vede il centro del sole sulla linea DC parallela alla TS, vedrà un' eclisse centrale; e lo stesso vadasi considerando di tutti gli altri punti terrestri, che corrispondono a perpendicolo a diversi punti della linea ACL.

647. Mentre il punto terrestre E vede il fine dell' eclisse giunto il centro della luna in C, e mentre il punto D la vede allora centrale, i punti terrestri che sono fra E e D vedono l' eclisse di varia grandezza. Così il punto F da cui il centro del sole scorgefi nella linea FH, vede la distanza apparente della luna C dal sole H eguale alla CH, la quale CH quanto farà minore della somma dei semidiametri lunare e solare, la luna di altrettanta quantità coprirà il sole agli occhi dell' osservatore F; se farà minore d' un dito, la luna coprirà un dito del disco solare, e l' eclisse diraffi d' un dito: se farà minore di sei diti, la luna ne coprirà sei, e il di lei lembo si vedrà dal punto F sul centro del sole. Lo stesso si dice, se farà minore di tre diti, cioè d' un quarto del diametro solare ec.

648. E per trovare il punto F della terra, in cui posta la luna in C l' eclisse a una data ora comparirà di tre diti, partendo dal punto C, ov' è la luna, bisogna 1°. prendere CA eguale alla somma dei semidiametri solare e lunare; 2°. prendere AH, cominciando da A, di tre diti, ec.; 3°. calare una perpendicolare HFN sulla terra, (cioè sul piano GE del cerchio terrestre ch' è perpendicolare alla linea dei centri) e si troverà il punto cercato F della terra; poichè vedendosi dallo stesso il sole in H e la luna in C, la loro distanza è minore di tre diti della somma dei loro semidiametri.

649. Finora ho io supposto, che l' orbita della luna LBM passi per la linea SLT che unisce i centri del sole e della terra, e che la luna in congiunzione non abbia alcuna latitudine: ora osserviamo cosa avvenga, quando farà in qualche latitudine. E primieramente quanto diffi del punto M (645), si deve similmente intendere d' ogni altro punto situato alla medesima distanza dai punti T ed L. Supponiamo adesso che la linea LM (eguale alla somma della parallassi lunare e dei semidiametri solare e lunare) girando intorno al punto L, descriva un cerchio, il di cui piano sia perpendicolare ad LT e al piano della figura, di modo che ciaschedun punto di questo cerchio abbia la medesima distanza dal punto T. Questo cerchio perpendicolare alla linea dei centri, e descritto nella regione lunare, si dice *il cerchio di proiezione*, perchè ad esso si riferiscono, e in lui si considerano quasi delineati il sole e la terra; al quale cerchio applicheremo in seguito quanto abbiamo detto finora sulla

figura-

figura 75. È chiaro che i diversi punti di tal cerchio corrispondono a diversi punti della circonferenza terrestre, siccome il punto A corrisponde al punto E della terra, il punto L al punto K. Il sito poi, ossia i punti del cerchio stesso nella regione lunare, ai quali corrispondono i diversi punti terrestri, restano determinati da altrettante perpendicolari condotte dagli stessi punti terrestri sullo stesso cerchio, o piano della proiezione, che io suppongo nella regione della luna.

650. Supponiamo una linea LB (fig. 76) eguale al raggio della proiezione LM (fig. 75), più alla somma dei semidiametri solare e lunare. Con questa LB (fig. 76) come raggio descriviamo un cerchio BCGD nel piano della proiezione; indi un altro cerchio AEQR col raggio LA eguale alla parallasse della luna, come lo era LA nella fig. 75. Quando la luna prima di giungere alla congiunzione, batterà col suo centro su qualche punto K della circonferenza BCD, allora per qualche punto terrestre (646) comincerà l'eclisse.

E similmente giunto il centro della luna su qualche punto V della circonferenza AVE del cerchio di proiezione, il centro della luna si vedrà sul centro del sole, e perciò si vedrà il principio dell'eclisse centrale da quel luogo terrestre, che si troverà direttamente sotto al punto V, o che avrà la sua proiezione al punto V.

651. L'eclisse generale del sole è quella, che si calcola per la terra in generale, senza considerare i luoghi, ai quali appartiene: dalla quale noi cominciamo colla scorta di Keplero (*Epitome* pag. 373) prima di cercare le fasi dell'eclisse solare proprie di ciaschedun luogo terrestre. Quando la distanza LK del centro della luna dal centro della proiezione sarà eguale alla somma dei semidiametri del sole, della luna e della proiezione, allora comincerà l'eclisse del sole in quel luogo della terra, che corrisponde a perpendicolo al punto I (645); questo dice il principio della eclisse generale: e similmente se giunto il centro della luna in G sarà GL eguale alla somma degli stessi tre semidiametri, allora da quel luogo terrestre, che l'ultimo di tutti vedrà l'eclisse del sole, si vedranno staccarsi per così dire i lembi del sole e della luna, e sarà allora il fine dell'eclisse generale. Parimenti la perpendicolare LM calata sull'orbita determinerà il mezzo dell'eclisse generale, come nelle eclissi lunari (620).

652. Per conoscere l'ora del mezzo dell'eclisse generale, si premettono gli stessi calcoli, e si segue lo stesso metodo, che nelle lunari (620): LAB rappresenta porzione dell'eclittica. L il punto dove si trova il sole nella congiunzione. LH la latitudine della luna nella congiunzione. KMG l'orbita relativa (609). Nel triangolo LMH rettangolo in M sono noti l'angolo HLM inclinazione dell'orbita relativa, e la base HL latitudine lunare, onde si troverà il lato HM, che si ridurrà in tempo in ragione del moto orario della luna per l'orbita relativa; e quindi si saprà la differenza di tempo fra la congiunzione ed il mezzo dell'eclisse; la quale quantità di tempo si leverà dall'ora della congiunzione accaduta in H, se la latitudine della luna va crescendo, cioè se la luna avrà

avrà già passato il suo nodo; e si aggiungerà, se la luna va avvicinandosi allo stesso suo nodo, e si conoscerà così il mezzo della eclisse generale in M, come si è visto all'art. 622.

653. Il cerchio di proiezione AER rappresenta il disco della terra, o sia l'immagine dell'emisfero terrestre illuminato e trasportato nella regione lunare: la linea VX è la porzione dell'orbita lunare descritta dalla stessa luna in tempo dell'eclisse totale, siccome KG quella che sarà descritta dal primo momento in cui la penombra (631) toccherà il disco terrestre in qualche punto I, fino a quello in cui la penombra stessa abbandonerà il punto F della terra, cioè dal principio al fine dell'eclisse generale. Dalla lunghezza dunque KG dell'orbita lunare compresa fra i punti K, G conosceremo la durata dell'eclisse; siccome dal mezzo M della stessa KG il mezzo dell'eclisse generale. La linea poi KG è divisa egualmente dalla perpendicolare LM per essere eguali LK ed LG; lo stesso è della corda VX. Onde il punto M dinota il mezzo dell'eclisse generale, la di cui durata viene espressa dalla KG, e la durata dell'eclisse centrale dalla VX.

654. Esempio. Nella eclisse del primo Aprile 1764 l'ora vera della congiunzione fu la 10 31' 23" matut. a Parigi; la latitudine in quell'ora fu 39° 36' boreale; il moto orario della luna in longitudine 29' 39", del sole 2' 27" $\frac{2}{3}$, l'inclinazione dell'orbita relativa 5° 44' 26", il moto orario relativo o composto 27' 19" $\frac{1}{2}$. Seguendo dunque, come nell'eclissi lunari (625) queste due analogie, R : 39° 36' = sin. 5° 44' 26" : 3' 58" = alla HM; poscia 27' 19" $\frac{1}{2}$: 60' 0" = 3' 58" : 8' 42" di tempo, i quali si leveranno dall'ora della congiunzione, per essere crescente la latitudine della luna, e si avrà 10^h 22' 41" ora del mezzo dell'eclisse generale al meridiano di Parigi.

Col medesimo triangolo HLM troveremo la perpendicolare LM di 39' 24", cioè la più breve distanza della luna dal centro della proiezione a mezza l'eclisse; colla scorta della quale perpendicolare troverassi ancora il principio ed il fine.

655. Il principio dell'eclisse generale rapporto al meridiano di Parigi si trova come nelle eclissi lunari (625); nel triangolo LKM rettangolo in M, sono note la perpendicolare LM (654) e la base LK eguale alla somma dei tre semidiametri del sole, luna e proiezione (645): onde si troverà MK che si ridurrà in tempo in ragione del moto orario, e tolto esso tempo dall'ora del mezzo in M, si avrà il principio dell'eclisse generale in K; e aggiunto si avrà il fine in G.

Esempio: Nell'eclisse del 1764 il lato LM è di 39' 24"; la parallasse della luna di 54' 0" a Parigi (da cui ho levata la parallasse del sole, per sapere quanto la luna è più bassa dello stesso; della quale differenza soltanto si abbisogna in una eclisse), il semidiametro orizzontale della luna 14' 47", del sole 16' 1"; dunque il principio dell'eclisse generale

rale si troverà a $7^h 37' 48''$ matut. e il fine a ore $17' 34'$ dopo il mezzodì; e la durata perciò per tutta la terra di ore $5 29' 46''$.

656. Il principio dell' eclisse centrale succede quando la luna giunge al punto V, in cui l'orbita taglia il cerchio di proiezione; perchè allora il centro della luna e del sole e il lembo della terra sono in una stessa linea, e il punto della terra che corrisponde al punto V vede il centro della luna sopra quello del sole.

Nel triangolo LMV rettangolo in M, note la perpendicolare LM (654) e la base LV, parallasse o raggio della proiezione, si troverà MV che si convertirà in tempo lunare; e questo tolto dall'ora del mezzo dell' eclisse generale, si avrà l'ora numerata a Parigi, quando comincia l' eclisse centrale al punto V della terra.

Esempio. Nella eclisse del 1764 posta $LV = 54' 0'' = 3240''$; $LM = 39' 24''$, si avrà $MV = 36' 56''$, che danno di tempo $1^h 21' 51''$; la metà della quale durata tolta dal mezzo dell' eclisse $10^h 22' 41''$ (654), avremo il principio dell' eclisse centrale a $9^h 1' 36''$, e aggiuntala, il fine a $11^h 43' 46''$; e ore $2 42' 10''$ di tempo impiegato dalla ombra a traversare la terra.

657. Tutti questi calcoli dell' eclisse generale ponno farsi graficamente, siccome quelli delle eclissi lunari (619); descritto un cerchio grande, il di cui raggio LA si dividerà in tanti minuti, quanti ne contiene la parallasse, si prenderà la linea LH eguale alla latitudine della luna, e l'angolo MLH eguale alla inclinazione relativa dell' orbita lunare (609); si prenderà sulla stessa scala una linea eguale al moto orario della luna per l'orbita relativa, e le si farà eguale la HN, notando in H l'ora della congiunzione, e in N un'ora di meno; e divisa la NH in 60 minuti, si seguirà a dividere in uguali minuti tutta l'orbita GK; e in tal guisa si conoscerà l'ora, in cui la luna fu in K, in V, in M, in X, in G, siccome trovato lo abbiamo negli articoli precedenti.

658. Volendosi ora sapere quali sieno li paesi terrestri, cioè quali sieno le loro longitudini e latitudini geografiche, che corrispondono ai punti V, X, quando la luna giunge ai medesimi, noi lo spiegheremo per mezzo d' un globo. E in fatti non configlierei mai alcun astronomo ad adoperare la trigonometria per questi calcoli, se non l'esigesse un qualche caso straordinario, o qualche importante osservazione; essendo assai meglio impiegato il tempo a calcolare delle osservazioni già fatte per estenderne e cavarne delle conseguenze, piuttosto che intrigharsi in tali calcoli laboriosi, per dedurne ciò che dovrà avvenire. Le operazioni grafiche sono sufficienti per delineare una carta simile alla tavola VII. che si suole comunemente e compendiarmente unire all' effemeridi. L'idea e il modello fu dato dal Sig. Cassini quando osservò l' eclisse del sole in Ferrara nel 1664.

659. Suppongo dunque un globo terrestre di 6 pollici almeno di diametro, e una riga con due piedi come GVAE (fig. 77), la di cui lunghezza VA sia eguale al diametro del globo, e l'altezza al raggio dello stesso, o un poco maggiore, per poterla mettere sull'orizzonte GE; e

Z

Z

rag-

raggio di questo globo deve rappresentare il raggio della terra, o la parallasse della luna, come LA nella fig. 76; onde si dovrà supporre diviso in parti 34 per l'eclisse del 1764, in cui la detta parallasse era di 34'.

660. Siccome non si può cangiare il diametro di tal globo per adattarlo alle diverse eclissi, così bisognerà calcolare le diverse parti della figura, cioè il moto orario della luna e li diametri solare e lunare, e quindi ridurli a questa scala: se il globo per esempio avesse 8 pollici di diametro, e la parallasse fosse di 34', si descriverà una linea eguale al raggio del globo, e la si dividerà in 34 parti, 27 $\frac{1}{2}$ delle quali se ne prenderanno per il moto orario.

661. Per situare sul globo l'orbita della luna, si dovrà formare una figura simile alla 76, in cui la linea BLD rappresenta porzione dell'eclittica ed XV l'orbita relativa; e nella quale formando l'angolo ALO eguale all'angolo di posizione (693), o al complemento dell'angolo dell'eclittica col meridiano, sarà descritta porzione dell'equatore OLQ, il quale sarà al mezzodì o al di sotto dell'eclittica all'oriente del globo nei segni ascendenti, cioè quando la congiunzione succede tra li 21 Dicembre e li 21 Giugno. Dalla somma dell'angolo ALO e di quello della inclinazione dell'orbita relativa, o dalla loro differenza secondo il caso, si conoscerà l'angolo che forma la perpendicolare LM col meridiano universale LP, o sia col meridiano del globo, che si suppone immobile; il qual angolo è uguale all'angolo formato dall'orbita con l'equatore. Nella descritta figura prendansi col compasso gli archi OV, QX, e sull'orizzonte del globo cominciando dai cardini d'oriente e d'occidente si contino altrettanti gradi quanti ne contengono i detti archi verso il nord se la latitudine della luna sarà boreale, e verso il sud se australe.

662. Il polo del globo si alzi sopra l'orizzonte tanti gradi, quanti ne contiene la declinazione del sole, la quale se sarà boreale s'intende doverli alzare il polo boreale. Il pezzo GVAE (fig. 77) si dovrà situare in modo che ciascuna delle due estremità della riga superiore VA corrisponda perpendicolarmente sopra i due punti notati sull'orizzonte del globo; nel qual caso questa riga VA rappresenterà l'orbita della luna quasi descritta sull'orizzonte del globo, come lo era nella fig. 76 su' cerchio di proiezione.

Bisogna in oltre prendere dalla figura 76 il pezzo d'orbita VX diviso in tempo colle ore che battono sui punti V, X, cioè che corrispondono al principio ed al fine, il qual pezzo d'orbita si trasferirà sulla riga VA colla divisione del tempo, per il che fare comodamente si coprirà la detta riga VA con un pezzo di carta: così si avrà una porzione VA divisa in minuti di tempo, come lo è l'orbita VX della luna (657); o pure servendosi del moto orario, si noterà solamente l'ora del mezzo dell'eclisse nel punto L della riga, e determinando dal punto L lunghezze eguali al moto orario, si noteranno le ore antecedenti all'ora del mezzo, e le susseguenti, avvertendo di segnare le ore antecedenti all'occidente, o alla dritta.

663. Fatto tutto questo apparecchio, bisognerà situare il globo su quell'ora che gli compete; per esempio nella eclisse del 1764, dovendo la luna trovarsi in A a ore 9^a, principio dell'eclisse centrale (656), si farà girare il globo in modo, che Parigi resti in C cioè per il tratto di ore 2 58' all'occidente del *meridiano universale* MP; nel quale meridiano si suppone fissa il sole, e al contrario tutti li paesi della terra si suppongono col girare del globo da occidente in oriente passare successivamente avanti di lui.

Situato in tal guisa il globo secondo l'ora di Parigi, e supponendo la luna in A, l'eclisse si vedrà centrale in quel luogo della terra, che perpendicolarmente corrisponde sotto alla luna (645) sul globo alla ora stessa 9^a di Parigi; per trovare il qual luogo si dovrà calare (ben livellato l'orizzonte del globo) dal punto A sul globo un filo a piombo, o pure, posto l'occhio sul punto A, guardare perpendicolarmente il globo, o finalmente con una squadra cercare sul globo questo dato paese; trovato il quale si noterà la di lui longitudine e latitudine; e questo è il primo punto della eclisse centrale segnato A sulla carta della Tav. VII.

664. Si pianterà nel punto A il centro d'un cerchio del raggio AD, eguale alla somma dei semidiametri solare e lunare presa sulla scala dei 54 minuti. Questo cerchio si potrà farlo di cartone, e postone il centro in A, si metterà parallelo all'orizzonte del globo; o pure prendendo colle punte del compasso una linea eguale alla somma dei suddetti semidiametri, fissatane una in A, l'altra punta del compasso si farà girare, e intanto si osserveranno tutti que' punti del globo, che corrisponderanno perpendicolarmente alla circonferenza del cerchio descritta da essa punta; e questi saranno i luoghi, che vedranno all'istessa ora toccarsi scambievolmente i lembi del sole e della luna; fra i quali luoghi questo che sarà nell'orizzonte del globo, vedrà il contatto dei lembi al nascere del sole.

665. Si formerà un altro cerchio, il di cui raggio sia minore per la quarta parte del diametro solare, cioè per tre dita (e sarà 8' per l'eclisse del 1764), o pure si diminuirà di tal quantità una porzione del primo cerchio, con cui si trovò la prima fase, come si scorge nella chiocciola della fig. 79; o pure finalmente si regolerà l'apertura del compasso. Questo cerchio o punta del compasso col suo girare intorno al centro A (fig. 77) mostrerà col filo a piombo tutti i luoghi della terra, in cui in quell'ora si vedrà eclissato il sole di tre dita, e la ragione facilmente si vedrà dagli articoli 647, 648.

666. Simili cerchi se ne potranno fare per l'eclisse di 2 3 4 5 dita ec. collo diminuire di altrettanti dita il raggio del cerchio della *penombra*, cioè del cerchio che ha per raggio la somma de' semidiametri del sole e della luna. Ma più brevemente si potrà formare un cerchio solo dividendone la circonferenza in 12 parti, e in cui li 12 settori vadano ordinatamente scemando, come nelle scale degli orologi a ripetizione (fig. 79), in guisa cioè, che ciaschedun settore sia minore del precedente d'un di-

Z a gito,

gito, o duodecima parte del diametro solare preso fulla scala della parallasse orizzontale, e del moto orario (660); facendo girare un filo a piombo sulle circonferenze di questi settori, il piombo segnerà sul globo i paesi, che nella ora indicata vedranno l'eclisse d'un digito, due, ec.

667. Se il centro di questi cerchi si planterà in L sul mezzo cioè della riga AV , facendo la stessa operazione come di sopra, dopo avere col girare del globo fissato l'indice P sull'ora $10^h\ 23'$, che è l'ora di Parigi, quando accade il mezzo dell'eclisse generale, si troveranno tutti i paesi, che alle $10^h\ 23'$ vedranno l'eclisse d'un digito, due ec. E con questo mezzo si potrà segnare sopra d'un globo o carta geografica la figura di tutti i punti, che vedranno un'eclisse centrale, o d'un digito, di due ec. Bisogna notare, che tutti questi luoghi dai quali a una data ora si vedrà l'eclisse d'un digito non anno però assolutamente l'eclisse d'un digito per la maggior grandezza, perchè con tale operazione non si trova già la fase maggiore, ma quella solamente che conviene a una data ora; ma si potrebbe trovare anche questa massima fase cercando quel punto della terra, che più di tutti si scosta dal punto A (*fig. 77*), o pure che dando un piccolo moto al globo e alla luna, si trova nonostanté nella stessa distanza dalla luna.

Trovare le fasi d'un'eclisse del sole col metodo delle proiezioni.

668. Il metodo, che finora abbiamo spiegato non è tanto esatto, onde si spera di schivare un errore di uno o due minuti nel determinare il principio e il fine dell'eclisse in qualunque luogo, se non si faccia però uso d'un globo grandissimo e perfettissimo; ma tale esattezza l'avremo facilmente, servendosi delle proiezioni, e d'una ellisse giusta mente descritta; l'operazione grafica che si farà colla riga soltanto e col compasso, farà più esatta assai e della stessa semplicità di quella del globo. Prima però d'entrarvi voglio farne vedere la teoria collo spiegare distintamente i principj della proiezione ortografica; di cui n'ho già fatto uso nell'art. 643 e seg. Giusta l'asserzione di Flamstedio primo fu Wren a trovare verso il 1660 le fasi d'una eclisse senza il calcolo delle parallassi; e lo stesso Flamstedio asserisce, che il Sig. Halley prima di partire nel 1666 per Santa Elena, gli avea fatta menzione della costruzione delle eclissi, senza però scoprire il metodo, per il quale Flamstedio per allora non avea molta fede.

669. Disegnare la *proiezione* d'una figura, significa delineare la figura stessa sopra un altro piano per via di linee condotte da varj punti della figura stessa sopra lo stesso piano. *Proiezioni* ve n'ha di molte forte; ma fra tutte la più semplice è l'*ortografica*, in cui quelle linee tutte si conducono perpendicolarmente su quel piano; e di questa appunto si fa uso con gran frutto nelle eclissi soggette alle parallassi.

670. Se dalle estremità A, B d'una linea AB (*fig. 78*) si calino sopra un piano qualunque PL , diverso dalla linea AB , delle perpendicolari Aa, Bb , lo spazio ab da esse determinato sul piano, si dice la *pro-*

proiezione ortografica della linea AB , e il piano PL , sopra cui si fanno cadere le perpendicolari, si dice *piano della proiezione*.

671. La proiezione ortografica ab d'una linea AB in tal guisa determinata, è uguale al coseno della inclinazione della stessa linea col piano PL . Poichè condotta AC parallela a PL , l'angolo BAC è uguale a tale inclinazione, ed $AC = ab$ è la proiezione di AB ; ma $AB:AC = R : \cosen. BAC$; o pure raggio al coseno della inclinazione, come la linea AB alla di lei proiezione; dunque, preso il raggio come unità, la proiezione d'una linea è uguale alla stessa linea moltiplicata per il coseno della lei inclinazione col piano di proiezione.

672. La Proiezione d'un arco FI è uguale al seno del medesimo. Sia DFH (fig. 80) la circonferenza del semicerchio, di cui cercasi la proiezione, e il piano del medesimo semicerchio sia perpendicolare al piano della proiezione. Ciascheduna delle perpendicolari FG calate da ciaschedun punto della circonferenza sul raggio CH , (saranno perpendicolari al piano, e segneranno le proiezioni dei punti medesimi. Il punto K farà la proiezione del punto I , e la linea CK sarà la proiezione dell'arco FI : ma posto C il centro del cerchio, $CK = IL$ è il seno dell'arco FI ; dunque i seni degli archi FI sono le proiezioni degli archi stessi, contandoli questi archi dal punto F , che corrisponde perpendicolarmente al centro C . Di questa proposizione ci serviremo assai nel calcolo delle eclissi.

673. La proiezione ortografica d'un cerchio inclinato è sempre un'ellissi. Sia DFH il cerchio, di cui cercasi la proiezione, e di cui il diametro DH sia nel piano stesso della proiezione, o a lui parallelo. Se questo semicerchio inclinato al detto piano si farà girare intorno al diametro DH in guisa che le linee IK mantenghino costantemente il medesimo angolo qualunque d'inclinazione col piano di proiezione, la proiezione di esse tutte saranno le linee KG , ciascheduna delle quali sarà eguale alla sua corrispondente IK moltiplicata nel coseno dell'angolo d'inclinazione (671); onde sarà sempre KG ad IK come il coseno dell'angolo d'inclinazione al raggio: ma, come si dimostra nelle sezioni coniche, proprietà dell'ellissi è, che tutte le sue ordinate KG serbino una costante ragione colle corrispondenti ordinate del cerchio che ha lo stesso diametro; dunque una curva che passerà per l'estremità delle linee KG sarà un'ellissi; e perciò la proiezione d'un semicerchio obliquo DFH sarà la periferia d'un'ellissi DGH , il di cui asse maggiore DH uguaglia il diametro del semicerchio, e il minore ne scemerà in ragione del coseno dell'inclinazione. E lo stesso affatto succederebbe, se il diametro DH del cerchio, di cui vuolsi la proiezione, fosse in una data distanza al di sotto del detto piano.

674. Se dunque si guarda un cerchio obliquamente, si vedrà come trasformato in ellisse. Perchè siccome una linea AB (fig. 81) mirata dal punto O obliquamente comparisce della stessa grandezza colla perpendicolare $AC = AB \text{ sen. } ABC$; così nel cerchio CAD (fig. 82) visto pure obliquamente, tutte le ordinate AB, EF compariranno più piccole nella stessa ragione, e il cerchio comparirà un'ellisse CGD , in cui

cui l'asse minore sta all'asse maggiore, come il seno della inclinazione al raggio; la quale proposizione è la stessa colla precedente; e di essa ne faremo uso perpetuamente.

675. La fig. 83 rappresenta le linee principali della proiezione per una qualche eclisse. ST è la linea condotta dal centro del sole a quello della terra, e la diamo linea dei centri. IL è un piano che perpendicolare alla detta linea dei centri passa per il centro della terra. Questo piano forma il *cercchio d'illuminazione*, e distingue la parte illuminata IDL dalla oscura LOVL. In questo piano noi considereremo le diverse parti della proiezione; e quanto ci diremo sopra, si applicherà allo stesso piano di proiezione, anche quando si trasporterà nella regione della luna (682), perchè si manterrà sempre parallelo ed eguale al cerchio d'illuminazione. La linea PO è l'asse della terra, EQ il diametro dell'equatore, PELOQIP il *meridiano universale* (661), cioè quello che passa perpetuamente per il sole, e sotto di cui vanno passando successivamente i diversi paesi tutti della terra col moto diurno della medesima. ED è la declinazione o sia distanza del sole dall'equatore; l'arco PI è l'elevazione del polo sopra il piano di proiezione, la quale altezza è uguale alla declinazione del sole, perchè levando dagli angoli retti, o quadranti di cerchio PE, DI la porzione comune PD, resterà $PI = DE$. Questa elevazione è altresì uguale alla inclinazione di tutti i paralleli terrestri colla linea dei centri; cioè uguale al complemento della loro inclinazione col piano di proiezione.

Presi dall'equatore gli archi EG, QF uguali alla latitudine d'un luogo terrestre, per esempio di Parigi, e condotta la linea GH perpendicolare all'asse PO, ch'è il coseno della latitudine EG, farà essa il raggio del parallelo di Parigi, cioè del cerchio che descrive Parigi col moto diurno della terra; e il di lui diametro farà GF. Se dalle estremità G, F e dal centro H di tal parallelo si caleranno le perpendicolari GM, FR, HN, i punti che restano determinati M, R, N sul cerchio di proiezione IL faranno le proiezioni delle estremità e centro del parallelo.

676. La distanza TM del centro T della proiezione dalla estremità interiore M della proiezione del parallelo di Parigi, è uguale al seno dell'arco GD, o della differenza fra EG latitudine di Parigi, e DE declinazione del sole; e la distanza TR del centro T della proiezione dalla estremità R la più lontana del parallelo di Parigi, è uguale al seno dell'arco DF, o sia VF; il quale VF è uguale alla somma degli archi VQ, QF, uno de' quali nota la declinazione del sole, l'altro la latitudine di Parigi. Dunque la distanza del centro della proiezione dalla ultima estremità del parallelo è uguale al seno della somma della latitudine del luogo e della declinazione del sole.

677. Per trovare la proiezione del polo P si calerà una perpendicolare dal punto P sulla linea TI; la quale segnerà un punto lontano dal centro T d'una quantità uguale a TP. cosen. PTI, cioè TP. cosen. declin. del sole (674).

678. La distanza TN del centro T della proiezione dal centro N del para-

parallelo è uguale a TH . cosen. HTN (671); ma TH è il seno della latitudine di Parigi, $HTN = PI = DE$ declinazione del sole; dunque TN è uguale al seno della latitudine del luogo moltiplicato nel coseno della declinazione del sole a un' ora data, intendendosi preso per raggio il raggio stesso della proiezione.

679. Il punto D della terra ha il sole nel zenit, e un altro qualunque E lo ha lontano quanto è l'arco DE : presa dunque nella proiezione una linea TA , e convertita in arco per avere DE , si avrà in seni la distanza del sole dal zenit, o sia il coseno della di lui altezza per un luogo qualunque della terra, la di cui proiezione sia nel punto A ; cioè la linea TA , seno dell'arco DE , sarà la proiezione della detta distanza del sole dal zenit.

680. Quindi ne segue, che la linea TA esprime la parallasse d'altezza per un luogo che ha la proiezione in A ; poichè TL parallasse orizzontale (646), è anche il seno tutto; dunque TA , che è il coseno dell'altezza, sarà parimenti la parallasse d'altezza, la quale è sempre $= p$. cosen. b (582); dunque in genere la distanza d'un luogo terrestre dal centro della proiezione è uguale alla parallasse d'altezza, preso per la parallasse orizzontale il raggio della proiezione.

681. La proiezione del paralello di Parigi, o del cerchio che ha il centro H , e il diametro FG , disegnata sul piano ITL , è una ellissi (673); e appunto questa ellissi bisognerà descrivere sul piano, per trovarvi le fasi dell'eclissi; ma prima bisogna osservare, che si può trasferire nella regione della luna il piano di proiezione ITL , dove l'ellissi sarà abbatto la stessa come sul piano che passa per il centro della terra; perchè realmente ella è determinata da linee parallele alla linea dei centri TDS , che s'estendono fino alla luna, dove formano una proiezione della terra eguale alla terra stessa (642), per essere $LA = TE$ (fig. 75).

682. Benchè per piano di proiezione si possa scegliere quello che passa per il sole, o per la terra (*Mem. dell'Acad.* 1744 p. 191); nonstante io scelgo quello che si concepisce nella regione lunare, parendomi questo il più comodo, perchè il moto e il diametro della luna vi sono quali realmente li veggiamo dalla terra, e il raggio stesso della terra vi comparisce d'una grandezza nota e data dalle tavole, che è la parallasse orizzontale della luna. Addottando il piano che passerebbe per il centro della terra, come lo proponevano Keplero e Boulliaud, siamo obbligati di supporre l'occhio dell'osservatore posto nella luna, il che può rendere questa materia più difficile ai principianti.

683. Scelta la regione lunare per piantarvi la nostra proiezione, cerchiamo adesso, come vi si debbano riferire i paralelli terrestri. La proiezione della terra tutta sarà un cerchio parallelo ed uguale al cerchio d'illuminazione, come l'abbiamo detto; ma la proiezione del paralello di Parigi non può essere se non in forma ellittica (673), per non essere il medesimo parallelo al piano della proiezione. Ora bisogna descrivere questa ellissi, che sul piano nella regione lunare è la stessa come sul piano, che passerebbe per il centro della terra; perchè queste due ellissi so-

no

no comprese fra linee parallele; e perciò quanto si è detto sulla fig. 83 (675) si dovrà intendere dell' ellissi, che ora descriveremo nel piano di proiezione che passa nell' orbita lunare.

684. Nelle seguenti osservazioni non bisogna scordarsi, che la distanza della luna dal punto della proiezione, che rappresenta un qualche luogo terrestre, nota per lo stesso luogo la distanza apparente dei centri del sole e della luna. Supponiamo un punto E della terra (fig. 75) di cui la proiezione trovata col raggio EA, sia in A; questi vede il sole sulla linea EA (643); e se allora il centro della luna corrisponde al punto L della proiezione, l' osservatore in E vedrà la luna discosta dal sole quanto è AL; e la distanza apparente sul piano di proiezione fra la luna L e il punto A che corrisponde al punto E della terra, sarà AL. Bisogna notare, che essendo il punto A la proiezione del luogo terrestre E, il sole veduto dal punto E si riferisce allo stesso punto A: così è lo stesso il dire, che un punto A della proiezione dinoti il luogo E della terra, per esempio Parigi, o che dinoti il luogo del sole visto da Parigi (644).

685. Per mezzo delle proposizioni degli art. 675 e seg., è facile di disegnare una ellissi di proiezione per un luogo e giorno qualunque dato. Sia AOB (fig. 85) il cerchio d' illuminazione, cioè il cerchio della terra perpendicolare alla linea de' centri: bisogna supporre il sole al di sopra della figura, che corrisponde perpendicolarmente sopra del centro C della terra. La linea OPDC è un diametro del meridiano universale, in cui il sole si suppone fisso; tra il quale e l' asse della terra v' è una differenza eguale alla declinazione del sole. ACB è un diametro dell' equatore perpendicolare al meridiano universale. P è la proiezione del polo, cioè il punto del piano della proiezione, cui perpendicolarmente corrisponde il polo (677). Si prendano gli archi BL, AK eguali alla latitudine del luogo; indi KM, KN, LR, LV eguali alla declinazione del sole. Condotte le linee MER, NFV, sarà CE uguale al seno di BR, cioè della somma della latitudine del luogo e della declinazione del sole; e CF uguale al seno di BV = AN, cioè della differenza degli archi stessi. Onde i punti E, F saranno le estremità della proiezione del parallelo (675); dunque sarà EF l' asse minore della ellissi, che rappresenta il parallelo, e il centro della stessa sarà in G punto di mezzo delle EF, dovendo necessariamente il centro dell' ellissi trovarsi in distanze uguali dalle estremità dell' asse minore.

686. Veramente il punto G è diverso dal punto D, per cui passa il diametro KL del parallelo di Parigi; ma ciò avviene, perchè il cerchio AOB, su di cui presumo gli archi BL, AK eguali alla latitudine di Parigi, non è nè un meridiano, nè un cerchio su cui si contino le latitudini; poichè l' asse è inclinato al cerchio di proiezione, e il meridiano al cerchio AOB, e il punto dell' asse, per cui passa il parallelo di Parigi è bensì in una distanza dal centro uguale a CD; ma questo punto, riferito al cerchio di proiezione, corrisponde perpendicolarmente al punto G, in guisa che CG è uguale a CD moltiplicato per il coseno della decli-

declinazione (671). Così ciò che abbiamo fatto per trovare il punto G , è soltanto una costruzione per avere le grandezze CE , CF , come abbiamo dimostrato doverli trovare , ma in cui non si fa uso della linea KDL come diametro del parallelo.

687. L'asse maggiore dell'ellisse è uguale al diametro del parallelo; presi gli archi AK , BL uguali alla latitudine del luogo , sarà KL il diametro stesso del parallelo , eguale al coseno della latitudine del luogo . Trovato l'asse si condurrà per il centro G , determinato di sopra , la linea SGX , parallela ed eguale alla KL , che eguaglia il diametro del parallelo di Parigi ; e sarà SGX l'asse maggiore dell'ellisse da descriversi .

688. Noti l'asse maggiore SGX e il minore EGF dell'ellisse cercata , se ne troveranno tutti i di lei punti di ora in ora . Per il che fare descritto sull'asse maggiore SX un cerchio SHXQ , che rappresenterà il parallelo di Parigi , sebbene situato in un diverso piano , si divida esso cerchio in 24 ore 1 , 2 , 3 , ec. ciaschedun punto *g* di esso parallelo comparirà sulla linea *gf* perpendicolare all'asse maggiore SX , e condotta da ciaschedun punto della divisione ; perchè qualunque sieno l'inclinazione del cerchio SHX e l'obliquità sotto di cui sarà visto , purchè passi per li punti S , X , il punto *g* della di lui circonferenza corrisponderà sempre perpendicolarmente al punto *b* dell'asse maggiore , e l'ascissa Gb dell'ellisse sarà sempre uguale al seno dell'arco Hg del parallelo , o ella distanza dal meridiano .

689. Parimenti per trovare l'ordinata *bb* corrispondente dell'ellisse , noti , che la linea *gb* del parallelo essendo vista obliquamente , deve comparire d'una lunghezza *bb* minore di *gb* nella stessa ragione , con cui GE è minore di GH , cioè l'asse minore del maggiore . Si dovrà dunque sminuire il coseno *gb* d'un angolo orario di 15°, ec. nella stessa ragione .

690. Per trovare questi tali coseni si può adoperare un compasso di proporzione ; o pure descrivere col centro G un altro cerchio EYF sull'asse minore , e dividerlo come l'altro HXQ in 24 parti , o pure 48 se vogliansi nell'ellisse segnate le ore di 30 in 30 minuti . Quindi da ciaschedun punto del cerchio maggiore si condurranno delle linee *gbb* parallele all'asse minore , e da ciaschedun punto del cerchio minore che corrisponde alle medesime ore si condurranno altrettante *abb* parallele all'asse maggiore ; le quali prodotte incontreranno le prime nei punti *b* , che rappresenteranno l'ellisse ricercata . Per esempio la seconda *gf* condotta dal punto 30 taglia la seconda *ab* similmente condotta dal punto lontano 30° da E , nel punto *b* , e questo è quel punto dell'ellisse , che è lontano dal meridiano due ore ; poichè *bb* è il coseno di 30° nel cerchio minore , cioè il coseno *gb* diminuito nella ragione degli assi . Il punto poi corrispondente *c* a sinistra nota due ore dopo mezzodì . E in tal guisa si trova per ciaschedun' ora la proiezione del parallelo di Parigi , e il sito di Parigi sul cerchio di proiezione per qualsivoglia ora del giorno .

691. Nella figura 88 si vede delineata in tal modo una ellisse per un' eclisse di stella, a 16 gradi di declinazione, in cui però sonosi cancellate le linee, colle quali bisognò descriverla. La parte inferiore serve quando la declinazione è boreale; perchè allora la parte illuminata del parallelo, come CB nella fig. 83, relativamente al raggio solare ST è più bassa o più meridionale. Ma s'adopri l'inferiore o superiore, bisogna sempre considerare Parigi o il luogo dell'osservatore muoversi a sinistra verso l'oriente, nella parte visibile del parallelo, o nella parte rivolta verso del sole (qui della stella).

La parte dritta o sia occidentale della ellisse (fig. 88) nello eclissi del sole serve per le ore della mattina; ma nelle eclissi delle fisse, la detta parte serve al tempo ch'è avanti al passaggio delle medesime per il meridiano, poichè il moto della terra è verso l'oriente, o si consideri sulla terra stessa o sulla di lei proiezione. Nell'estremità dell'asse minore si notano 0^h , o 12^h , trattandosi del sole; ma trattandosi dell'eclisse d'una fissa cagionata dalla luna vi si nota l'ora del passaggio della stessa per il meridiano.

692. Nella fig. 88 vi sono descritti i diametri dell'ellissi corrispondenti a diverse declinazioni, posto lo stesso raggio di proiezione. E nella stessa ancora si vede quali farebbero i punti di distanza dal vertice S della proiezione, per i quali passerebbero tutte queste ellissi, cioè il valore di SV. In mezzo all'ellisse vi ho segnati i punti, che faranno i centri di quelle diverse ellissi; onde ciascheduno possa descriversele sopra altrettante carte, per calcolarne l'eclissi di tutte le fisse.

693. Calcolando l'angolo di posizione (313) si potrebbe avere il sito del cerchio di latitudine rispetto al cerchio di declinazione CG (fig. 84) ma più brevemente lo troveremo colla seguente operazione grafica. Suppongo FGH un arco di cerchio di proiezione eguale alla doppia obliquità dell'eclittica, cioè gli archi GF, GH presi dal punto G termine del meridiano CG della proiezione, eguali ciascheduno a $23^{\circ} 28'$. Centro in G, col raggio GV, eguale alla tangente dell'arco GF si descriva un cerchio XMV, e si divida in 12 segni, siccome l'eclittica, cominciando dal punto X dalla parte d'occidente, in cui si noterà l'ariete, cioè 0° di longitudine, e si continuerà da X verso M, V, B. Prendasi su questo cerchio un arco XM eguale alla longitudine del sole, o della stella, e calata sul diametro VX la perpendicolare MN, si avrà il punto N della tangente GNX, per cui si dovrà condurre il cerchio di latitudine CN.

E infatti, preso per raggio GX, GN è il coseno dell'arco XM, cioè della longitudine del sole; dunque $GX : R :: GN : \text{cosen. longit. del sole}$; cioè $GN = GV \cdot \text{cosen. longit.}$ Ma per la costruzione, $GM = GX = \text{tang.}$

$23^{\circ} \frac{1}{2}$, posto il raggio $= 1$, cioè CG, o CH; dunque $GN = \text{tang.}$

$23^{\circ} \frac{1}{2} \cdot \text{cosen. longit.}$ ch'è lo stesso che la proporzione di trigonometria sferica con cui, nota la longitudine del sole e l'obliquità dell'eclittica, si tro-

693. abbiamo dalla Fig. 11. *Mania*
 1. cof. base, e largh. can. obli. col. can. a. p.
 abbiamo fig. 54.
 1. cof. long. :: can. obli. col. can. a. N
 1. cof. il cof. CA. sta al raggio CA. come
 1. cof. di long. supposto a quel raggio
 1. cof. di long. supposto a CA.
 1. prop. ora da due primi termini
 abbiamo la analogia porta la po
 1. ora da due secondi. E sottraendo
 1. raggio di quelli termini. Resta
 N. a. long. dell'angolo di 11. 1/2. in



si trova l'angolo di posizione: il raggio è al coseno della base, o longitudine del sole, come la tangente dell'angolo eguale all'*obliquità* dell'eclittica, alla cotang. dell'altro angolo, cioè alla tang. dell'angolo di posizione. Dunque il cerchio di latit. CN deve formare col meridiano CG l'angolo NCG.

694. Si potrebbe fare una simile costruzione anche per le stelle incontrate dalla luna. E' vero che si suppone il coseno della latitudine uguale al raggio, ma l'errore riesce insensibile; perchè non passando la latitudine della luna li 6° , l'errore non arriva a $\frac{1}{180}$, cioè a 8 min. di grado nell'arco AF; e questi 8' sono insensibili anche in una figura d'un piede di raggio, come io la uso. Sulla circonferenza della fig. 88 vi ho segnati i punti, per li quali si dovranno condurre i cerchi di latitudine per diverse stelle, come per la γ η cioè per la stella γ della vergine ec. Si vede che tutte quelle, che hanno la loro longitudine nel primo ed ultimo quadrante dell'eclittica, cioè ne' segni ascendenti, sono alla dritta del meridiano CS, e le altre alla sinistra; perchè nella fig. 84 li tre primi e tre ultimi segni di longitudine sono alla dritta o all'occidente del punto G, il che è facile a vedersi sopra d'un globo. La direzione poi dell'eclittica in tutti i casi tende all'oriente; e se nello stesso tempo ella s'accosta al nord, la perpendicolare deve declinare alla parte opposta alla direzione dell'eclittica, cioè all'occidente, quando la si consideri dalla parte del nord.

Trovare le fasi d'una eclisse di sole, o di stella, con la riga e col compasso.

695. Il fin qui detto è bastante per trovare con l'esattezza d'un minuto il principio e fine d'una eclisse, lasciati i calcoli delle parallassi. Il semicerchio della fig. 88. d'un raggio di $5\frac{1}{2}$ poll. (qui è ridotta alla metà) rappresenta la proiezione della terra nella regione lunare (649); il raggio CR è diviso in tanti minuti, quanti ne ha la parallasse; il diametro TR è parallelo all'equatore, CS è una porzione del meridiano universale, o del cerchio di declinazione, che passa per il sole, o per la stella. CK è la distanza fra i centri, C della proiezione, e K della ellisse (678); KF è il semiasse maggiore della ellisse (687), eguale al coseno della latitudine del luogo, per esempio di Parigi, per cui si calcola l'eclisse. La linea KV, o KQ è il semiasse minore che sta al maggiore, come il seno della declinazione dell'astro, al raggio (674). Questa ellisse fig. 88 rappresenta il parallelo di Parigi, o pure la linea descritta sul piano di proiezione dal raggio condotto da Parigi ad *Antares*, la cui declinazione è di 26° Australe.

696. La parte superiore dell'ellisse è l'arco diurno, o pure quello di cui si deve servirsi nella declinazione meridionale del sole; la inferiore FQH

A a a

fer-

serve per le declinazioni boreali (691) : la linea CL rappresenta (694) il cerchio di latitudine.

697. Si prenda dalla scala CR la latitudine della luna nella congiunzione, e si faccia CL eguale alla stessa sul cerchio di latitudine; così si avrà il punto L, per cui si farà passare con la debita inclinazione l'orbita della luna. Per il che fare dal punto della congiunzione L si condurrà una linea LM perpendicolare a CL, sulla quale da L in M si segnerà il moto orario della luna in longitudine, meno quello del sole, preso dalla scala CR; e parimenti da M verso N parallelamente al cerchio di latitudine si segnerà il moto di lei orario in latitudine, al mezzodì del punto M se la luna tende verso il nord, al nord se tende al sud; cioè se la latitudine sarà australe crescente, o boreale decrescente; si condurrà per li punti N, L una linea che sarà l'orbita relativa I N L; e al punto L si segnerà l'ora della congiunzione, e in N un'ora di meno, indi si dividerà NL in 60 min. di tempo, e si continuerà la stessa divisione per tutta l'orbita.

698. Sulla ellisse si noteranno le ore del sole, o della stella, trovate (690), prendendo la parte inferiore, se la declinazione del sole o stella sarà dalla parte del polo elevato (691). Se si tratta d'una eclisse di stella, sul meridiano in V o in Q si nota l'ora del dì lei passaggio per il meridiano.

699. Dalla scala CR presa col compasso la somma dei semidiametri solare e lunare, o il semidiametro solo della luna nell'eclisse di stelle, si pianti una punta del compasso in L momento cioè della congiunzione, e si osservi se l'altra punta del compasso cada sulla ellissi in un punto, ove sia scritta la stessa ora ch'è in L; se sì, il tempo della congiunzione sarà altresì l'ora del principio o del fine della eclisse, secondo che questo punto dell'ellissi sarà all'oriente o a sinistra del punto L, o pure all'occidente o a destra del medesimo.

Che se la distanza dei due punti dell'orbita e dell'ellissi corrispondenti alla ora stessa non è uguale alla detta somma dei semidiametri, allora piantata una punta dello stesso compasso a dritta o a sinistra del punto L sull'orbita della luna, per esempio in I, si osservi se l'altra punta cadesse sull'ellisse in un punto (come A) che notasse la stessa ora del punto I; se il punto A fosse troppo lontano, allora tenendo sì cerchino essi due punti, che segnino la stessa ora, uno sull'orbita, l'altro sull'ellissi.

Trovati che sieno essi due punti come I, A lontani uno dall'altro della quantità IA, eguale alla somma dei semidiametri, il primo de'quali I dell'orbita sia alla dritta o all'occidente di A, allora si dirà essere questa l'ora del principio dell'eclisse (646).

700. La luna cammina verso l'oriente per la sua orbita da I in E, e Parigi sul suo parallelo da A in B, ma assai più lentamente, perchè in 12 ore percorre mezza la ellissi, e la luna in due ore fa molto viaggio; onde si vede che la luna arriverà all'oriente di Parigi in E, mentre Parigi non sarà che in B, e si troveranno perciò di nuovo in distanza tra loro

loro di B E uguale alla somma degli stessi semidiametri , quando la luna farà per lasciare il sole ; se tali sieno essi due punti B , E , si avrà il fine dell'eclisse .

701. Il mezzo dell' eclisse è in circa all' ora di mezzo fra il principio ed il fine ; onde si dividerà per mezzo in D la porzione I E , e si cercherà l' ora in G di mezzo fra l' ora A e B : e dalla distanza G D di essi punti G , D , si avrà la più corta distanza fra i centri della luna e del sole nel mezzo dell' eclisse .

702. La quale distanza trasportata sulla scala C R , si avranno i minuti e secondi di grado, ch' essa contiene ; che sarà facile distinguerli se il raggio C R sia di 6 pollici circa . Se il punto D dell' orbita si trovasse al di sotto , o al mezzodì del punto G del parallelo , farà ciò indicio che la luna passa al mezzodì della stella .

703. Per ischivare la divisione del raggio della proiezione C R sempre in tante parti , quante ne contiene la parallasse (da cui si levano sempre le frazioni di minuto) si pianta una scala E F (fig. 89) di 60 minuti , le linee della quale sono più lunghe del raggio del cerchio , quando la parallasse è minore di 60' , e più corte quando eccede a 60' . Se la parallasse , per esempio , è di 54' , cioè d' una sesta parte minore del raggio della proiezione supposto sempre di 60' , in tal caso bisogna adoperare una scala , in cui il compasso indichi 54' invece di 60' ; poichè quell' apertura di compasso , che, posta la parallasse 60' , equivale a 10' , non deve indicare se non che 9' , posta la parallasse 54' ; dunque si deve servirsi d' una scala maggiore della sesta parte . Questa scala sebbene divisa in 60 parti , non ce ne darà che 54 , portandovi il raggio della proiezione , perchè è maggiore di esso raggio , e perciò maggiori ancora le di lei parti .

704. Essendo sempre il semidiametro della luna $\frac{2}{11}$ della parallassi (584) , si potrà descrivere una linea retta C D sulla scala , in modo che abbracci le $\frac{2}{11}$ di tutte le scale della parallassi , cominciando dalla linea segnata 10 , 10 ; si avrà da questa scala facilmente il semidiametro della luna ch' è per esempio 16' $\frac{2}{3}$, posta la parallasse di 61' ; di 14' $\frac{2}{3}$, posta di 54' ec ; prendendolo col compasso senza doverne sapere il di lui valore .

705. Quando dalla nota minima distanza G D fra i centri del sole e della luna , si vuole ricavare la grandezza dell' eclisse in digiti (628) , bisogna levare questa distanza dalla somma dei semidiametri , e confrontare il restante col diametro del sole diviso in 12 digiti , si vedranno i digiti e parti di digiti eclissati del sole .

706. Quando si tratta di eclisse d' una stella si opera nello stesso modo come in quelle del sole , avvertendo 1º. che C L è la differenza fra le latitudini della luna e della stella ; 2º. che L N è il moto orario della luna sola ; giacchè la stella non ne ha ; 3º. che nei punti V , o Q dell' ellisse si nota l' ora del passaggio per il meridiano , o più esattamente

te la differenza fra l'ascensioni rette della stella e del sole, ridotta in tempo, all'ora della eclisse; 4°. che si prende la distanza IA eguale al solo diametro della luna.

707. *Esempio.* Li 7 Aprile 1749, antares fu in congiunzione colla luna a ore $2^h 23'$ matut. la parallasse della luna era $57' \frac{1}{4}$, il moto orario $33' 12''$ in longit. e in latit. decrescente $1' 56''$; la latitudine nella congiunzione era $3^\circ 45' 22''$ per la luna, e $4^\circ 32' 12''$ per la stella; e la luna perciò era al nord della stella di $46' 50''$.

Conduco in primo luogo l'asse dell'eclittica, o il cerchio di latit. CL al punto corrispondente alla longitudine d'antares $8^h 6^m 16''$ (693); indi prendo sulla linea nella scala delle parallassi (fig. 89) che corrisponde a $57'$, la quantità $46' 50''$, e la porto sul cerchio di latit. da C in L , e dal punto L innalzo la perpendicolare LM (fig. 88).

Dalla stessa linea 57 nella scala delle parallassi prendo il moto orario della luna $33' \frac{1}{5}$, e prendo eguale LM ; e prendo finalmente MN eguale a $2'$, perchè il moto orario della luna in latit. verso il nord è di $2'$; onde la luna un'ora prima della congiunzione, cioè a $1^h 22'$ matut. si trovava in N ; noto in N $1^h 22'$, e divido LN in $60'$ di tempo, notandoli di 10 in 10.

Antares passa per il meridiano di Parigi a $3^h 11'$ (363), e tale ora scrivo in V , e sulle altre divisioni dell'ellissi scrivo $2^h 11'$; $1^h 11'$ ec. e gl'intervalli fra quelle ore, in cui si può credere che avvenga l'eclissi, cioè la congiunzione, li divido di 10 in 10' almeno.

Preso col compasso sulla scala il semidiametro della luna dalla linea 10, 10, fino alla CD sulla linea dei $57'$, piantandone una punta del compasso stesso sull'orbita della luna, l'altra sull'ellisse, osservo che le dette punte cadono in I ed A , nei quali sono scritte le stesse ore $1^h 11'$; dunque conchiudo che giunta la luna in I , e la proiezione di Parigi o sia il luogo apparente della stella in A , succederà un'eclissi cioè un contatto dei lembi della stella e luna, per essere allora la distanza della luna dalla stella eguale al semidiametro della stessa luna.

Cerco due altri punti segnati con una stessa ora, dall'altra parte verso l'oriente; li trovo E sull'orbita, B sull'ellissi, colla stessa ora $2^h 11'$; è questo sì è il tempo dell'emersione; onde la luna dall'immersione fino all'emersione ha percorso la porzione IE , e la stella apparentemente AB . Dunque la più corta loro distanza sarà stata, essendo la luna in D e la stella in G , che ne sono i punti di mezzo; il che facilmente si verificherà misurandone la distanza di minuto in minuto; e si troverà realmente, che in vicinanza circa della ora $1^h 36'$, questa distanza cessa di calare e si va accrescendo. Portata questa più corta distanza DG sulla linea 57 della scala delle parallassi, si troverà di $6'$; il che indica che il centro della luna passò $6'$ al mezzodì della stella, nel tempo della più corta distanza. Se l'eclisse fosse del sole si prende la somma de' se-

midia-

radiometri del sole e della luna, e la si porta sulle divisioni della orbita e dell'ellisse.

708. Sarebbe facile di ridurre al calcolo tutte le operazioni grafiche finora spiegate; ma vi sono altri metodi, coi quali si calcolano esattamente le fasi d'una eclisse solare; dei quali se ne può vedere un dettaglio nella mia *Astronomia*. In questo compendio non posso dare che qualche idea di quel metodo, che io ho prescelto e perfezionato, e che io chiamo il metodo degli angoli parallattici.

Sia S il sole (fig. 86), o pure la stella, di cui si calcola l'eclisse, ZCSD il verticale del sole, PBSE il cerchio di latitudine condotto dal polo dell'eclittica per il sole, OS il cerchio di declinazione condotto dal polo dell'equatore. Nota la declinazione del sole, e l'ora per cui si vuole calcolare la distanza apparente dei centri, lo stato, o la fase dell'eclissi, si cercherà l'altezza del sole (368), e il suo angolo parallattico OSZ (369), da cui se ne leverà l'angolo di posizione OSP (313, 318) formato nel centro del sole dai cerchi di declinazione e di latitudine; o pure vi si aggiungerà se il sito del polo dell'eclittica sarà dall'altra parte del punto O, il che si rileverà facilmente con un globo piantato secondo il giorno e l'ora proposta (192); e si avrà l'angolo parallattico propriamente detto, formato dal verticale e dal cerchio di latitudine.

709. Nota per la stessa ora la longitudine vera del sole e della luna, si avrà la loro differenza, che bisogna moltiplicare per il coseno della latitudine della luna, e che nel caso nostro è rappresentato dalla linea AB parallela all'eclittica, o perpendicolare al cerchio di latitudine. Si fa parimenti la latitudine vera della luna per l'ora stessa, cioè l'arco SB del cerchio di latitudine compreso fra il sole e il punto B, a cui perpendicolarmente corrisponde la luna. Nel triangolo ABS rettangolo in B noti i due lati AB, BS, colla trigonometria rettilinea si troverà l'angolo di congiunzione ASB, e la base AS, vera distanza della luna dal sole. Dallo stesso angolo ASB si leverà l'angolo parallattico PSC, o pure si prenderà la loro somma, se il punto A fosse dall'altra parte rispetto a BS, e si avrà l'angolo d'azimuto ASC; noto il quale angolo con la base AS, si troverà SC differenza d'altezza del sole e della luna, e anche AC vera loro differenza d'azimuto. La quale differenza d'altezza aggiunta all'altezza del sole, darà l'altezza vera della luna. Nota la parallasse orizzontale, si calcolerà la parallasse d'altezza (582), che tolta dall'altezza vera, darà l'apparente. La differenza fra quest'altezza apparente e quella del sole, darà l'arco SD del verticale, che indicherà la linea orizzontale DL, su di cui deve trovarsi il luogo apparente L della luna. La differenza apparente d'azimuto DL, è un poco maggiore della differenza vera CA, ma tale divario non oltrepassa mai i 30°, e si può per lo più trascurare; sebbene si può facilmente trovarlo, perchè è CA : DL come il seno della distanza vera dal zenit al seno della apparente. Nella *Connoissance des temps* per il 1764 ne ho data una Tavola. Parimenti si correggerà la differenza d'azimuto DL, colla

pa-

parallasse d'azimuto (592) ; e se si ricerca un calcolo esattissimo , la parallasse d'altezza CD si correggerà con l'equazione prodotta dalla figura schiacciata della terra (594). Noti pertanto DL , DS , si troverà la base SL , che è la distanza apparente dei centri solare e lunare .

710. Se questa distanza si troverà eguale alla somma dei semidiametri apparenti del sole e della luna (o della luna soltanto nell'eclissi delle stelle) , si avrà il principio dell'eclissi , o il fine . Se sarà minore di detta somma , per esempio di $5'$, farà allora l'eclissi di $5'$. Calata dal luogo apparente L della luna una perpendicolare LE sul cerchio di latitudine BSE , si ha la latitudine apparente SE della luna , e la differenza di longitudine apparente EL . Onde la quantità BE è la *parallasse di latitudine* , e la differenza delle AB ed LE la *parallasse di longitudine* , supposti i punti L ed A dalla medesima parte del cerchio di latitudine BSE .

711. Fatto che si abbia questo calcolo per due punti diversi di tempo , si hanno due latitudini apparenti , e due differenze di longitudine del sole e della luna ; onde si potrà descrivere l'*orbita apparente* affetta dalla parallasse , e calcolarne le fasi d'un'eclissi solare , come abbiamo fatto nelle lunari descrivendo l'*orbita relativa vera* (620) .

Uso delle eclissi per trovare le longitudini geografiche.

712. Il metodo più esatto che abbiamo per conoscere le longitudini terrestri (47) , o le differenze de' meridiani (51 , 54) è certamente quello delle eclissi del sole o delle stelle ; la di cui sola difficoltà consiste nei lunghi calcoli che vi entrano , il che però non ci proibisce di farne grande uso per vantaggio della Geografia .

713. Dalla osservazione del principio e fine d'una eclissi solare , della immersione ed emersione d'una stella , o d'un pianeta , nascosti dalla luna , bisogna dedurre il tempo della vera congiunzione ; noto il qual tempo in ciascheduno di due paesi , la differenza dello stesso farà la differenza dei meridiani (*Kepl. astron. par. opt.* 395) . Per esempio di tale metodo , il più diretto , il più elegante , il più sicuro di quanti se ne possono adoprare , scelgo il calcolo d'una eclissi di stella , siccome quello , che contiene alcune considerazioni di più del calcolo delle solari , cui però aggiungerò ciò che ha luogo nelle eclissi solari .

714. Sia S il sole (*fig.* 90) o la stella eclissata , L il luogo apparente del centro lunare rispetto al sole sul principio dell'eclissi ; F il luogo apparente del centro stesso sul punto della emersione ; LF il moto apparente della luna rispetto al sole , o alla stella , durante l'eclissi . SH il cerchio di latitudine , che passa per la stella ; GHI un arco dell'eclittica , DSE una linea perpendicolare ad SH , che passa per la stella , e sensibilmente parallela all'eclittica ; supponiamo parimenti FA parallela a DE ; farà il moto apparente in latitudine AL , ed FA il moto apparente relativo in longitudine sopra un arco di cerchio massimo ; il quale arco sensibilmente si confonde col parallelo all'eclittica , ma è però mino-

minore di alcuni secondi dell'arco GI dell' eclittica. E questo moto apparente è la prima cosa che si dee cercare.

715. Si fa dalle Tavole l' ora della congiunzione vera calcolata, e parimenti le longitudini e latitudini vere della luna e dell' astro eclissato al principio e al fine dell' eclisse; per le stesse ore si calcola la differenza delle parallassi in longitudine e latitudine (710); si aggiunge ciascuna parallasse alla longitudine vera, o vi si leva secondo che il luogo apparente della luna è più o meno avanzato del luogo vero, e così si hanno le longitudini apparenti, o affette dalla parallasse; la differenza delle quali è il moto apparente della luna per l' eclittica; e levandovi il moto del sole o astro eclissato (o aggiungendolo se fosse retrogrado), si avrà GI moto relativo apparente per l' eclittica.

716. La differenza delle parallassi in latitudine per gli stessi due punti di tempo si applica ancora alla latitudine vera della luna data dalle Tavole (o alla di lei distanza dal polo boreale dell' eclittica), e si avranno le due latitudini apparenti IL, GP per il principio e fine dell' eclisse; la differenza di queste latitudini apparenti (o la loro somma, se una fosse australe, l' altra boreale) darà il moto apparente della luna in latitudine; da cui sottraendovi il moto in latitudine dell' astro eclissato, se il cangiamento della di lui latitudine s' accorda nel nome con quella della luna, si avrà AL moto relativo apparente della luna. Finalmente la differenza delle longitudini apparenti GI si moltiplica per il coseno della latitudine apparente media fra le latitudini IL, GP (531), e si avrà il valore del moto FA misurato nella regione dell' eclisse.

717. Così noti nel triangolo FAL rettangolo in A i due lati FA, AL, si conoscerà ancora l' angolo LFA e la base FL, cioè l' inclinazione dell' *orbita apparente*, e il moto apparente in linea retta per l' orbita apparente della luna rispetto all' astro S, che sempre si suppone immobile durante l' eclisse.

718. Nel triangolo SLF si fanno i tre lati, cioè il moto apparente FL in linea retta, e la somma dei semidiametri della luna e dell' astro, accresciutone però prima quello della luna in ragione della di lei altezza (572); al principio dell' eclisse la somma dei semidiametri è SL, al fine SF: noti dunque i tre lati si cerchino gli angoli SLF, SFL per via della trigonometria rettilinea, cioè il moto FL si ha alla somma delle due distanze osservate SL, SF, come la loro differenza, alla differenza dei segmenti BL, BF; la metà della quale differenza aggiunta alla metà del moto FL darà il maggiore dei due segmenti, e sottratta il minore.

719. Noti essi due segmenti si troveranno gli angoli BLS, BFS; uno dei quali aggiunto alla inclinazione apparente LFA, e levatone l' altro dalla medesima, averemo i complementi degli angoli di congiunzione apparente, cioè DSF, LSE.

Il raggio sta alla somma dei semidiametri apparenti SF, che corrisponde alla maggior latitudine, come il coseno dell' ang. DSF alla SD, la quale divisa per il coseno della latitudine HS dell' astro S (se non

B b

fosse

fosse però il sole) darà la distanza GH della congiunzione apparente , per la osservazione , che corrisponde alla maggior latitudine apparente DF della luna . Questa distanza GH si leverà dalla longitudine vera della stella o del sole , se in questa maggior latitudine si avesse il principio dell'eclisse, o si aggiungerà, se il fine , e si avrà la longitudine apparente della luna osservata . Dal paragone della quale longitudine osservata colla calcolata si conoscerà l'errore delle Tavole in longitudine .

720. Applicata la parallasse di longitudine alla longitudine apparente , avremo la longitudine vera della luna ; e dalla differenza fra questa longitudine vera e quella della stella S ridotta in tempo in ragione del moto orario per l'eclittica , troveremo l'ora della congiunzione vera nel luogo dell'osservazione . Lo stesso calcolo si ripeterà per un'altra osservazione , e si otterrà nello stesso modo l'ora della congiunzione vera per questo nuovo meridiano ; la differenza fra questa e la prima sarà la differenza dei meridiani di quei due luoghi , dove si sono fatte queste osservazioni .

721. Questo metodo per trovare le longitudini geografiche è il più esatto che abbiamo ; il solo discapito , che abbia , è la lunghezza del calcolo , ch'è di gran remora per quei pochi , che cercano questo punto . Nonnonostante da alcuni anni si sono determinate le longitudini di moltissime città colle eclissi del sole , e le ho pubblicate nella *Connoiss. des temps* 1774.

722. Nell'osservare le immerzioni delle stelle , queste compariscono per lo più sul disco lunare per alcuni secondi : la quale apparenza probabilmente nasce dalla irradiazione del lume lunare : tutti i corpi luminosi compariscono in tal guisa ingranditi per la luce che li circonda .

723. Dall'atmosfera della luna nasce un altro fenomeno , che sembra dimostrato dal Sig. de Sejour nelle Mem. de l'Acad. per il 1767 ; che consiste in una *inflessione* di $4'' \frac{1}{2}$, eguale alla doppia rifrazione orizzontale dell'atmosfera lunare . In forza di questa inflessione nelle eclissi solari bisogna diminuire il semidiametro lunare di quella stessa quantità , come si diminuisce quello del sole di $3''$ in forza della irradiazione . La circostanza più opportuna per verificare questa inflessione sarebbe quella , in cui avvenisse un'eclisse totale in quei paesi , nei quali la luna fosse in grande altezza sopra l'orizzonte , e annulare in altri ; nei quali fosse presso dell'orizzonte ; e tale appunto ha dovuto essere l'eclisse del 23 Settembre 1699.

724. L'eclissi dei pianeti fatte dalla luna si calcolano come quelle del sole e delle fisse ; bisogna però badare ai loro moti in longitudine e latitudine , onde viene accresciuto o diminuito quello della luna , e d'onde nasce qualche diversità nella posizione dell'orbita relativa .

725. I pianeti alle volte s'eclissano scambievolmente . Marte parve che eclissasse giove li 9 Gennaio 1591 ; e restò eclissato da venere li 3 Ottobre 1590 (*Kepl. astron. par. opt. pag. 305*) . Mercurio fu eclissato da

da venere il 17 Maggio 1737 (*Philos. trans. n. 450*). Nelle opere degli astronomi si trovano anche scritte molte eclissi di stelle indotte dai pianeti : saturno coprì la stella ϵ di sesta grandezza nel corno australe del toro il dì 7 Gennajo 1679 giusta il Sig. Kirch (*Miscell. Berolin. pag. 105*).

Dei passaggi di venere e di mercurio sotto al sole.

Venere e mercurio , che girano intorno al sole in una distanza minore di quella della terra (.393) , in ciascheduna rivoluzione sinodica si trovano fra noi ed il sole ; nel qual caso , se sono in pochissima latitudine , si veggono sul sole come una nera macchia e rotonda , larga in circa una trigesima parte del disco solare , se sarà venere , e $\frac{1}{150}$ se mercurio .

716. Averroe credette di vedere mercurio sul sole , ma Albategnio e Copernico pensavano e con ragione che non potesse averlo veduto a occhio nudo . Anche Keplero credette vedere mercurio a occhio nudo , ma poi s' accorse che sarebbe stata una macchia solare , delle quali ve n' hanno talvolta di tanto grandi , che si possono benissimo vedere senza telescopio ; le quali Galileo attesta averle vedute a occhio nudo e fatte vedere agli altri , e ne addurrò degli esempj (936 , 941) . Ma mercurio , il di cui diametro è di soli 12" , è impossibile che si abbia mai potuto vedere sul sole ; al più e appena poteasi rassimulare venere nel 1761 , che avea un diametro di 52" . Non è dunque da meravigliarsi , se prima della scoperta dei telescopj non si sia mai veduto mercurio o venere sul sole .

717. Questi passaggi succedono soltanto quando venere e mercurio nella loro congiunzione inferiore sono in una latitudine che non eccede il semidiametro solare , cioè quando essa congiunzione succede assai vicina al nodo , e per venere in distanza dallo stesso al più di $1^{\circ} \frac{1}{4}$.

718. Questi passaggi sono molto utili , perchè con essi si determina esattamente il luogo del nodo N di mercurio , o di venere (*fig. 91*) vista che si abbia la situazione OR della loro orbita . Con essi si conosce la longitudine eliocentrica senza ricorrere alla parallasse dell' orbe magno ; poichè la congiunzione del pianeta col sole S prova , che la longitudine del pianeta visto dal sole è la stessa colla longitudine della terra ; ma i passaggi di venere anno sopra tutto questo singolar vantaggio di far conoscere con esattezza la parallasse del sole (735) , da cui dipendono le distanze che hanno tra loro scambievolmente , e da noi , li pianeti (185) : quindi è che sono tanto celebri essi passaggi , e per li quali si scrissero tante memorie , e s' interpretarono tanti viaggi .

719. I passaggi di venere sono vantaggiosi per tre capi ; 1.^o per la grande esattezza , con cui s' osserva il contatto de' due astri , uno de qua-

B b 2 li e

li è opaco e posto sopra il luminoso; nel qual caso solo in tutta l'astronomia si può osservare un angolo di distanza fino alla precisione d'una decima parte di secondo. 2°. per la nota ragione fra le parallassi di venere e del sole con quelle di tutti gli altri pianeti. 3°. la grandezza di questa parallasse, onde si ha più di 15' di tempo di differenza fra le osservazioni, e che è doppia di quella del sole.

730. Keplero fu il primo, che nel 1627, descrisse le sue tavole Rudolfine sulle osservazioni di Ticone, si studiò d'indicare, quando venere e mercurio passerebbero sotto il sole: e in un avvertimento agli astronomi stampato in Lipsia nel 1629 annunciò un passaggio di mercurio per il 1631, e due di venere per il 1631 e 1761. Le Tavole di Keplero non potevano essere tanto esatte, onde ne potesse trarre con sicurezza l'avvenimento di questi fenomeni, che dipendono dalle cose le più minute; quindi il passaggio di venere predetto per il 1631, non si verificò; e Gassendo che vi si era ben preparato in Parigi restò deluso. Al contrario avvenne un passaggio di venere nel 1639 non predetto da Keplero, ma osservato in Inghilterra. Morì Keplero qualche giorno prima di quello, in cui avea predetto il passaggio di venere nel 1631, ma quello di mercurio avvenne come l'avea predetto.

731. Prima di tutto esaminiamo perchè questi passaggi sieno sì rari, e specialmente quelli di venere. Tornando venere alla sua congiunzione inferiore in capo d'un anno e di giorni 219 (454), parrebbe, che in ogni sua congiunzione dovesse vederli sul sole, giacchè si frappone tra lui e noi; ma queste eclissi vanno del pari colle lunari (600); poichè non basta che venere sia congiunta col sole, ma di più si ricerca, che lo sia in vicinanza del suo nodo, e con una latitudine geocentrica niente maggiore del semidiametro solare, cioè di 16' circa. Sia S il centro del sole (fig. 91), SN l'eclittica, ORN l'orbita di venere; la di cui latitudine geocentrica SV in quel punto, in cui perpendicolarmente corrisponde al punto S centro del sole: se questa latitudine è minore del raggio solare SA, venere comparirà sul disco OAR del sole; e lo stesso dicasi di mercurio.

732. Nota che sia la rivoluzione sinodica di mercurio, ch'è di giorni 115 21^h 3' 22", 3. (454), si può trovare per quanto tempo si vuole, tutte le di lui congiunzioni inferiori col sole. Fra queste si sceglie quella, in cui il sole trovasi vicino al nodo di mercurio, cioè verso il principio di Maggio e Novembre, la quale, calcolandola con più scrupolosa attenzione, ci farà vedere, se in essa congiunzione vera la latitudine geocentrica ecceda o no il semidiametro solare. In tal guisa il Sig. Halley nel 1691 calcolò molti passaggi di mercurio sotto il sole, che sono descritti nelle *Trasazioni Filosofiche*. Sono essi calcoli per 29 passaggi tanto per il passato secolo che per il presente. Si era servito dei periodi di anni 6, 7, 13, 46 e 265, coi quali spessissimo si ritrovano di bel nuovo i passaggi di mercurio sotto il sole nello stesso nodo, e i quali bastano per indicare gli anni, in cui succederanno. Il medesimo Sig. Halley s'era adoprato anche per li passaggi di venere, e trovò dei pe-
riodi

riodi di 8 anni, di 135 e di 243, che riconducono i detti passaggi; e dall'anno 918 fino al 2119 calcolò 17 passaggi di Venere.

733. Il primo di tali passaggi, che si sia osservato, fu quello di mercurio osservato a Parigi da Gassendo li 7 Novembre 1631 la mattina. Dopo il quale se ne osservarono altri 12 compresi quello delli 9 Novembre 1769, ch'è stato visto in America e nelle Indie; noi siamo in aspettazione di altri negli anni 1776, 1782, 1786, 1789, 1799 ec.

734. Venere fu osservata sul sole nel 1639; ma specialmente nel 1761 e 1769; e vi passerà di nuovo nel 1874, 1882, 2004, 2012, 2117, 2125 ec. Il passaggio di Venere del 1769 è una delle osservazioni più importanti che sieno mai state fatte dagli astronomi, per essersi conosciuta la vera parallasse del sole; qual punto interessante fu notato dal Sig. Halley nel 1677; se la parallasse che abbassa gli astri fa vedere Venere sulla linea BC, in vece che sull'orbita OR, essa descriverà sopra il sole una corda meno lunga, e la durata del di lei passaggio sarà minore; dalla quale durata conosceremo la parallasse di Venere. Quindi è che si aspettavano con impazienza i passaggi di Venere del 1761 e 1769: quasi tutti i Sovrani e tutte le Accademie d'Europa si sono proposti de' viaggi in lontani paesi, perchè l'effetto della parallasse riuscisse maggiore, e l'esito di essi viaggi specialmente nel 1769 fu sì felice, che non ci resta più che desiderare.

La Società reale di Londra secondata dal Re d'Inghilterra, inviò osservatori al Forte del Principe di Galles nella Baja d'Hudson, e all'Isola Taiti in mezzo al mare del sud; l'Abbate Chappe si portò in California; il P. Hell a Wardus nell'estremità più settentrionale della Lapponia. Il Sig. Planman si mise in Cajanebourg in Finlandia; dalle quali cinque osservazioni riuscite felicemente si conchiuse la parallasse del sole di 8", 5, o pure 8", 6.

735. Per trovare questa parallasse basta calcolare il principio ed il fine d'un passaggio di Venere, adoperando la parallasse come abbiamo fatto per l'eclissi solari (710). Si trova che la durata del passaggio nel 1769 vista dal centro della terra doveva essere di 5^h 41' 56" fra i due contatti interiori, cioè fra il momento in cui il disco di Venere si trova intieramente sul sole, e il momento in cui principia ad uscirne. Ma calcolando queste fasi per Wardus, e adoperando una parallasse di 8", 5 per il sole (onde si ha per quel giorno un eccesso della parallasse di Venere sopra quella del sole di $21'' \frac{32}{1000}$) si trova che la durata del passaggio doveva essere maggiore di 10' 52" di tempo. Al contrario nell'Isola Taiti doveva essere minore di 11' 43". Dal che ne segue, che se a Taiti si è veramente osservata una durata minore di 22' 35" di quella di Wardus, la parallasse del sole è realmente di 8", 5. Ora il P. Hell osservò questa durata di 5^h 53' 14", e li Sigg. Green, Cook, e Solander l'osservarono a Taiti di 5^h 30' 4", minore della prima di 23' 10": questa quantità è bensì diversa di 33"; ma in una differenza

totale-

totale di $23' 10''$, non si riduce nè anche a $\frac{1}{30}$ di differenza; e dall' altro canto avendo nello stesso modo paragonate fra loro le altre osservazioni, le ho trovate d'accordo con una parallasse di $8''$, 6; onde l' incertezza intiera su questo punto non arriva a $\frac{1}{60}$. Tutte le osservazioni, calcoli, metodi, e risultati si ponno vedere nella mia *Memoire sur le passage de Venus* stampata separatamente nel 1773 (a Paris, chez Lattre Graveur, rue S. Jacques); la quale opera potendosi avere da tutti, non mi estenderò più a lungo su questo punto. Appresso lo stesso Incisore si trova un Mappamondo, in cui ho notato per via di cerchi l' effetto della parallasse in tutti i paesi della terra, aggiuntavi una spiegazione, in cui ho notato tutti i luoghi, dai quali si doveva fare l' osservazione per renderla più certa: ed ho avuto il piacere di vedere verificato quanto avevo indicato.

736. Il modo d' osservare questi passaggi consiste nel determinare con un quadrante, o con un reticolo, la differenza d' ascensione retta e di declinazione, onde concluderne la differenza di longitudine (946) e l' ora della congiunzione. Questi passaggi servono ancora per trovare il luogo del nodo con esattissima precisione, osservatane però la differenza fra le ascensioni rette e declinazioni di Venere e del sole (535, 946). Se ne conchiude la distanza SM di Venere dal centro del sole in mezzo al suo passaggio, e la latitudine geocentrica SV si riduce al sole; e così nel triangolo SNV nota l' inclinazione N dell' orbita e il lato NV, si trova la distanza SN del sole dal nodo del pianeta.



LIBRO SESTO.

Delle rifrazioni.

737. L'atmosfera, cioè la massa d'aria che circonda la terra, indebolisce la luce, la disperge, la divide, e cangia la di lei direzione. Si è dimostrato con molte sperienze, che i raggi di luce che da un mezzo meno denso entrano obliquamente in uno più denso, cangiano la loro direzione, e s'avvicinano alla perpendicolare, quasi che fossero fortemente attratti dalla materia più densa; questo cangiamento è diverso secondo l'obliquità del raggio; e le Tavole, che ne contengono l'effetto, si dicono *Tavole della rifrazione, o Tavole anaclastiche*.

Sia ABD la superficie della terra (fig. 92); EKG la superficie esteriore dell'atmosfera, la di cui densità è sensibile per alcune leghe d'altezza; A il luogo dell'osservatore, ed MK un raggio che entra obliquamente in K; questo raggio incurvatosi nell'atmosfera giunge al punto A, come se avesse seguita la direzione della linea retta NKA; e l'occhio riceve l'impressione della luce secondo la direzione NKA; e l'astro, che veramente è in M, corrisponde al raggio AKN; onde la rifrazione lo fa comparire più alto quanto è l'angolo NKM, che chiamiamo *la rifrazione astronomica*.

738. Essendo il raggio CKR perpendicolare alla superficie refringente in K, l'angolo MKR dicefi *angolo d'incidenza* formato dal raggio incidente colla perpendicolare avanti la rifrazione; e l'angolo NKR = AKC, dicefi di *rifrazione*, formato dallo stesso raggio colla stessa perpendicolare dopo la rifrazione: i seni di questi due angoli hanno fra loro un rapporto costante, che dicefi *il rapporto della rifrazione*; e che Newton suppone eguale alla ragione di 3201 : 3200. Onde non v'ha rifrazione alcuna nel raggio perpendicolare alla superficie refringente, perchè essendo nullo uno degli angoli, anche l'altro necessariamente svanisce; e poi il raggio perpendicolare a una superficie più densa, non cangia la direzione per esserne più attratto, perchè vi cade quanto più direttamente lo può, e per la via più breve. Dal che ne segue che la rifrazione si forma sempre in un piano verticale, perchè non avendo il raggio rifratto se non che una tendenza ad avvicinarsi alla linea verticale o zenit, non si volgerà nè alla dritta nè alla sinistra di questa linea, e si conserverà nello stesso piano del raggio diretto e della linea verticale; così il luogo vero e l'apparente faranno in uno stesso verticale.

739. Le leggi, le proprietà, e gli effetti della rifrazione e della luce si troveranno in molti libri d'Ottica, specialmente in quello che porta per titolo: *A compleat System of Optiks by Robert Smith, Cambridge 1738 2 vol. in 4°* di cui ve ne sono due edizioni Francesi, d'Avignone e di Brest pubblicate dal P. Pezenas e dal Sig. le Roy.

Gli

Gli antichi conobbero benissimo il fenomeno delle rifrazioni in generale: Aristotele in uno de' suoi problemi parla sulla curvatura apparente d'un remo nell'acqua; e si dice che Archimede abbia scritto un trattato sulla figura d'un cerchio visto sotto l'acqua; gli angoli della rifrazione si credevano in que' tempi proporzionali agli angoli d'incidenza: Snellio, e Descartes mostrarono che costante proporzione non si dava che fra i seni di essi angoli.

Non fu parimenti incognita la rifrazione astronomica a Tolommeo, quantunque non se ne sia servito ne' suoi calcoli. Sul fine del libro VIII dell' *Almagesto* dice esservi della diversità nel levare e tramontare degli astri che dipende dai cangiamenti dell'atmosfera: Alhazen, Ottico Arabo del X secolo, ne fece menzione più precisa e spiega il modo di verificarla colla sperienza nella sua *Ottica*, opera che non ci è pervenuta (*Montucla Hist. des Mathém.* I. 308); ma si crede generalmente che l'abbia presa questa sua Ottica quasi tutta da Tolommeo.

Prendete, dic' egli, uno strumento formato con cerchj che girino intorno ai poli; misurate la distanza d'una stella dal polo del mondo, quando passa per il meridiano vicina al zenit, e quando si leva dall'orizzonte; in questo ultimo caso troverete la distanza dal polo più picciola; Alhazen dimostra poi dover ciò avvenire per la rifrazione: della cui quantità in vero non ne parla, ma questo suo passo ci mostra in qual modo si osservasse l'effetto della rifrazione, e come si fosse riconosciuta. Parimenti quando gli antichi osservavano l'equinozio colle loro armille, potevano vederlo due volte in uno stesso giorno, per causa della rifrazione, (*Fiamstedio, Prolegom. pag. 21*); e questo effetto stesso potevasi vedere nelle stelle vicine al polo; perchè osservando due stelle come γ d'Andromeda e la polare, lontane fra loro 47° , questa distanza si troverà maggiore di $30'$, quando la prima passerà per il meridiano in vicinanza del zenit, che quando passerà sotto il polo presso l'orizzonte: e in tal modo più o meno saranno tra loro diverse le distanze delle stelle.

Snellio pubblicando le osservazioni di Waltero, notò, che queste osservazioni erano sì esatte, che Waltero per mezzo d'esse s'era accorto dell'accrescimento d'altezza cagionato dalla rifrazione; ma il primo a determinarla in modo da poterne piantare le Tavole, fu Ticone: ed ecco il modo, con cui la scoprì (*Progymnasmatum pag. 15*).

749. Avea determinata con uno o due strumenti ben lavorati l'altezza del polo per via delle altezze superiore e inferiore della stella polare (.33); e la determinò ancora colle altezze del sole nei due solstizj (70), e trovò la seconda minore di $4'$ della prima. Sospettò da principio dell'esattezza de' istrumenti, ma adoperandone fino a dieci di varia grandezza e forma, e benissimo lavorati, trovò sempre lo stesso; e non potendo incolpare le osservazioni, cercò seriamente la causa di un tale fenomeno, e pensò finalmente che provenisse da una notevole rifrazione che dovea patire il sole nel solstizio d'inverno, la di cui altezza allora per il suo paese era di 11° . Questa spiegazione s'accordava coll'Ottica; non obstante egli a stento si persuadeva che questa rifrazione potesse produrre un errore

rore sì grande; la giudicava di 9' almeno all'altezza di 11° (ella non è veramente che 4' $\frac{1}{4}$; ma Ticone l'accresceva perchè giudicava la parallasse del sole di 2' 50" invece di 8") : e quindi è che fece costruire dei cerchj di dieci piedi di diametro, l'asse dei quali corrispondeva esattamente al polo del mondo, e con i quali misurava la declinazione degli astri fuori del meridiano; e allora s'avvide che la rifrazione del sole; anche nell'estate, sebbene insensibile all'altezza meridiana, nonostante si rendeva sensibile presso l'orizzonte, ove era di 30' circa.

Ticone credeva che la rifrazione del sole si riducesse nulla all'altezza di 45°, e delle stelle a 20°; mentre a quest'altezza ella è di 2' $\frac{1}{2}$, il quale errore durò per molto tempo. Il P. Riccioli stesso nel 1663; supponeva che non si avesse più rifrazione dopo i 26° d'altezza o circa; quantunque sia ancora di due minuti.

741. Il Sig. Cassini fu il primo verso il 1660, che cominciò a formare una nuova Tavola delle rifrazioni nel mentre che formava parimenti nuove Tavole del sole d'una esattezza molto maggiore delle precedenti. Ma per verificarne l'aggiustatezza, il Sig. Cassini desiderò avere delle osservazioni del sole fatte al zenit, dove ognuno sa non esservi rifrazione; e con questo mezzo poteva rilevare, se le sue tavole solari fossero più esatte delle Ticoniane. Nel qual caso non avrebbe più dubitato della preferenza delle sue tavole del sole e delle rifrazioni sopra di quelle di Ticone, rappresentandosi meglio colle sue le osservazioni tanto nel caso, in cui hanno luogo le rifrazioni, quanto in quello in cui non ve ne sono.

Luigi XIV e il grande Colbert, che avevano tante volte mostrato il loro zelo per la gloria delle scienze, lasciarono questo pensiero all'Accademia: la quale giudicò l'isola Cayenna più a proposito d'ogni altro luogo; ella ha 5° di latit., e la Francia vi mandava delle navi più volte all'anno. Se la rifrazione fosse nulla all'altezza di 45°, le altezze meridiane del sole dovevano essere esenti da rifrazione; perchè in quel luogo la minore altezza del sole è di 61°; dunque si doveva avere l'obliquità dell'ecclittica senza alcuna diminuzione per la rifrazione, ma al contrario accresciuta dalla parallasse del sole nei due solstizj: così nell'ipotesi Ticoniana dovea nella Cayenna trovarsi la distanza de' due tropici maggiore di 47° 3'; e secondo il Cassini, che diminuiva la parallasse e vi supponeva qualche rifrazione anche nelle maggiori altezze, non dovea trovarsi nella Cayenna che di 46° 58'; e così v'era fra queste due ipotesi la differenza di 5', che poteva esattamente trovarsi nella stessa isola, e quindi decidere a un tempo stesso sulla parallasse, sulla rifrazione e sull'obliquità dell'ecclittica. Questi motivi erano bastevoli per decretare un tal viaggio; v'era ancora da verificare la lunghezza del pendolo, la parallasse della luna, di marte e del sole, la teoria di mercurio, le longitudini geografiche, la posizione delle stelle australi, le maree, le variazioni del barometro; queste furono le cagioni del viaggio intrapreso dal

dal Sig. Richer. Egli partì da Parigi nel mese d'Ottobre 1671, e si trattene nella Cayenna dalli 22 Aprile 1672 finogli ultimi di Maggio 1673; e le di lui osservazioni furono pubblicate nel 1679, e sono anche inserite nella raccolta delle osservazioni pubblicata dall'Accademia nel 1693.

Il tutto successe nella Cayenna appresso a poco secondo le dimostrazioni del Cassini; l'obliquità apparente dell'ecclittica fu trovata di 23° 28' 32", cioè molto minore di quella che doveva essere secondo Ticone; non fu diversa che di 5" da quella che dovea trovarsi, stando alle Tavole di rifrazione e alla parallasse del sole del Cassini; dalle osservazioni della Covenna non se ne dedussero altre conseguenze; solo è da notarsi, che gli elementi coi quali aveansi rappresentate le osservazioni in Europa, colla stessa esattezza rappresentavano le osservazioni dell'America; il che non s'ottenne cogli elementi di Ticone rispetto all'obliquità dell'ecclittica, alla parallasse del sole, e alle rifrazioni astronomiche.

Metodo di trovare le rifrazioni astronomiche.

742. Dopo la storia della rifrazione, passo ai metodi successivamente adoperati per osservarla. Ho spiegato quello delle declinazioni (740): ecco quello delle altezze. Essendo la rifrazione la differenza fra l'altezza apparente e vera, il metodo consiste nel calcolare la vera per quel punto di tempo, in cui si osservò l'apparente.

Quando non si praticavano gli orologi, si adoperava l'azimuto, o l'angolo Z (*fig. 31*) per risolvere il triangolo PZS, e trovare l'altezza vera; l'angolo PZS non è punto affetto dalla rifrazione, poichè il luogo vero e l'apparente sono in un solo e medesimo verticale ZS (739), e perciò nello stesso grado d'azimuto. Dunque nel triangolo PZS sono noti per il dato tempo i lati PZ, PS e l'angolo Z opposto ad uno di loro, e perciò si troverà colla trigon. sferica il terzo lato ZS, il di cui complemento è l'altezza vera, che paragonata coll'apparente osservata nello stesso tempo darà la rifrazione. (*Ticone Progymn. pag. 93*). Questo metodo degli azimuti oggidì non si pratica.

743. Le altezze corrispondenti del sole, o d'una stella forniscono il mezzo più proprio per trovare il valore della rifrazione, se però si prendano con un gran quadrante, e un esatissimo pendolo. Suppongo per esempio che l'altezza del sole osservata in distanza di sei ore dal meridiano la mattina e la sera siasi trovata esattamente di 90°, e che secondo il calcolo (368) non debba essere se non di 80° 54'; si saprà da ciò, che all'altezza apparente di 90° corrisponde una rifrazione di 6', e che il sole si vede più alto di 6'.

Nel triangolo PZS (*fig. 31*) formato al polo, al zenit, al sole, si suppongono note le distanze PZ del polo dal zenit, e PS del sole dal polo boreale del mondo, indipendentemente dalle rifrazioni; ma l'errore che ne può risultare nelle gran rifrazioni, è piccolissimo; farà parimenti nota dall'osservazione delle altezze corrispondenti l'ora in quel punto, e l'angolo orario ZPS; dunque si troverà ZS distanza dal zenit; ch'è il com-

complemento dell'altezza vera, poichè i due lati PZ, PS, e l'angolo P sono quantità vere e date, indipendentemente dalle rifrazioni. Quest'altezza vera trovata col calcolo è sempre minore dell'apparente osservata col quadrante, e dalla differenza si ha il valore della rifrazione corrispondente all'altezza osservata. Questo metodo fu in passato adoperato dal Sig. Picard, e nel 1751 dal Sig. de la Caille; e con esso si trovò che la rifrazione orizzontale, cioè la massima, è di $32' \frac{1}{2}$ circa.

744. Il Sig. de la Caille, prima del suo viaggio in Affrica, s'era impegnato di determinare le rifrazioni per via degli angoli orari, e delle altezze corrispondenti del sole e delle fisse più lucide; egli fu il primo che avesse il vantaggio d'impiegare questo metodo senza piantare ipotesi; perchè tornato dal Capo, conoscendo le declinazioni delle stelle osservate presso il zenit del Capo indipendentemente dalle rifrazioni, aveva il lato PS con grande esattezza; ha egli dunque calcolato la maggior parte di queste altezze corrispondenti dopo il suo ritorno; e gli servirono per descrivere una tavola di rifrazioni più esatta e più sicura di quante se ne avevano.

745. V'è un mezzo di conoscere le rifrazioni in certe altezze, senza dover supporre noto l'angolo P: e consiste nell'osservare una stella che passa per il meridiano nel punto stesso del zenit, o ad esso vicino e che poi passa per il meridiano sotto il polo. Essendo nulla la rifrazione nel zenit, si avrà la vera distanza della stella dal polo; e dopo 12 ore circa passando essa per il meridiano sotto il polo, e vicina assai all'orizzonte, si troverà la di lei distanza dal polo molto minore, perchè sarà accorciata dalla rifrazione, che alza la stella, e si avrà quindi la rifrazione in questa altezza.

Esempio. La Chiara di Perseo passava, alcuni anni sono, in distanza di sei minuti dal zenit di Parigi; così era certa la sua distanza di $41^{\circ} 4'$ dal polo, perciò dovea passare per il meridiano sotto il polo in distanza di $41^{\circ} 4'$ dal polo stesso, cioè all'altezza vera di $7^{\circ} 46'$. Questa però si osservò di $7^{\circ} 52' 25''$; era dunque certo, che la rifrazione all'altezza apparente di $7^{\circ} 52' \frac{1}{2}$, alzava la stella di $6' 25''$.

746. Il Sig. de la Caille ancora trovò un metodo ingegnoso, per determinare le rifrazioni, quando si trovava al Capo, paragonando le osservazioni delle stelle, che erano molto vicine al suo zenit, finchè si trovavano quasi sull'orizzonte di Parigi, e di quelle che erano vicine al zenit di Parigi, nel tempo ch'ei le vedeva sull'orizzonte.

747. Quando fossero state in tal guisa osservate le rifrazioni a diversi gradi d'altezza, sarebbe stato facile il vedete, che dal zenit sino alli 80° di distanza, seguono la ragione delle tangenti delle distanze dal zenit; ma il Bradley fu il primo che verso il 1760 guidato dalle ricerche del Sig. Simpson sulla traiettoria dei raggi di luce, mostrò, che diminuendo ciascuna distanza dal zenit del triplo della rifrazione, la tangente del residuo era esattamente come la rifrazione stessa; dopo questa legge

Il Sig. Bradley descrisse una Tavola delle rifrazioni, poco invero diversa da quella del Sig. de la Caille; esse sono minori di $14''$ all' altezza di 60° , di $26''$ a 30° , e di $11''$ a 40° .

748. Il Sig. Bouguer osservò, che la rifrazione orizzontale al Perù nel 1740 era di $37'$, in vece di $32\frac{1}{2}'$ come in Europa: ma questa diminuzione non si trova se non sotto la zona torrida; e si trovò che le rifrazioni sono le medesime a Parigi, in Lapponia, e per fino sotto il cerchio polare. Il Sig. de la Caille al Capo le trovò quasi le stesse che a Parigi.

Il Sig. Picard colle altezze meridiane del sole trovò nel 1669, che le rifrazioni erano maggiori d' inverno, che d' estate; maggiori la notte che il giorno. Era facile di conchiudere, che le rifrazioni farebbero più o meno notabili, secondo la maggiore o minore densità dell' aria, e che tali diversità dovevano corrispondere a quelle del barometro e termometro. Il Sig. Mayer trovò nel 1753 che la rifrazione media s' accresceva di $\frac{1}{33}$, quando il barometro si alzava per 15 linee, o quando il termometro s' abbassava per 10 gradi sulla scala del Sig. Reaumur.

I vapori presso l'orizzonte, i quali per l'umidità, per li venti, per altre cause variabilissime si cangiano, diversificano sensibilmente le rifrazioni; quindi gli astronomi si dispensano più che possono dal fare osservazioni presso l'orizzonte.

749. La rifrazione accresce tutte le altezze degli astri, e diminuisce le rispettive loro distanze; e quando, per avere la longitudine della nave, si misura sul mare qualche distanza fra la luna e una stella, bisogna correggere essa distanza osservata.

La rifrazione fa comparire il sole e la luna di figura ovale; in cui un diametro è minore dell' altro $4' 21''$; fa altresì comparire gli oggetti terrestri più elevati; e se ricerchisi in qualche livellamento molta esattezza, bisogna computare la rifrazione.

750. I raggi traversando l'atmosfera si dispergono, in modo che l'intensità della luce del sole, quando si trova sull'orizzonte, è 1354 volte minore di quando si trova al zenit, secondo l'esperienze del Sig. Bouguer (*Traité d'optique sur la gradation de la lumière*).

751. Il crepuscolo dopo il tramontare del sole, e l'aurora prima del nascere (108) sono effetti simili a quello della rifrazione; nascono dall'atmosfera, che riflette e disperge i raggi solari, in modo che giungono a' nostri occhi, e ci levano la vista degli astri, sebbene sia tramontato il sole.

752. L'arco d'emersione d'un astro, è la quantità della discesa del sole sotto l'orizzonte computata in un verticale, quando si comincia a vedere lo stesso astro a occhio nudo. L'arco di emersione per venire comunemente si stima di 5° , sebbene in certi tempi sia nullo, vedendosi essa in pieno dì; di 10° per mercurio e giove, di 11° verso 12° per marte saturno e le stelle di prima grandezza. Nonostante Sirio si vede anche
di

di giorno nei paesi meridionali. Il Sig. de la Nux l' ha visto spesso volte all' Isola di Bourbon. *Canopo* è in apparenza tanto grande quanto sirio, almeno di bella notte; ma la sua luce è un po' meno bianca, e nel crepuscolo non si vede sì facilmente. L' arco d'emersione per le stelle di terza grandezza è di 14° ; e finalmente di 18° per le piccole stelle; e questo si chiama l'abbassamento del *cerchio crepuscolare*. Ma si vede che questa quantità può essere molto varia: v' hanno certi paesi meridionali d' un' aria sì pura, che in certi tempi si vede sirio di giorno; a Parigi nell' estate in bel dì sereno si vede venire a occhio nudo, quando è lontana dal sole e vicina alla terra.

753. L' altezza dell' atmosfera dedotta da questi 18° , è di circa 25 leghe (cioè miglia geogr. moderne 36 poco meno) secondo il calcolo del Sig. de la Hire (*Mem. Acad.* 1713): ma in un' altezza di 11 leghe, o 25100 toese (migl. geogr. 26) l' aria è tanto rara, che il barometro non avrebbe che una linea d' altezza in vece di poll. 27. Si dividono 25275 piedi per il numero delle linee, che indicano l' altezza del barometro, si ha la quantità d' altezza, a cui bisogna giungere, onde il barometro si cangi per una linea; questo numero di piedi suppone il termometro alla temperatura di 10 gradi. Vedasi la grande Opera del Sig. de Luc, che ha per titolo: *Recherches sur les modifications de l' atmosphère, en 2 vol. in 4°* in cui tratta profondamente tutto ciò che appartiene al termometro e al barometro, il calore dell' aria, e le rifrazioni.



LIBRO SETTIMO.

Dei moti delle stelle fisse.

754. Sei specie di moto devonfi considerare nelle stelle fisse; la *precessione*, l'*aberrazione*, la *mutazione*, il *cangiamento generale in latitudine*, i *cangiamenti particolari a diverse stelle*, e la *parallasse annua*, sospettata già da molti astronomi. Abbiamo già parlato sulla precessione (320), cioè dell'annuo cangiamento di longitudine di circa $50' \frac{1}{3}$ in ogni stella: ne risultano dei cangiamenti nelle ascensioni rette e nelle declinazioni. Ma è facile dalla nota longitudine e latitudine d'un astro trovarne colla trigon. sferica l'ascensione retta e la declinazione (318), e d' avere perciò il cangiamento dell' una dal noto cangiamento dell' altra.

755. Questa precessione generale nasce dalla retrogradazione dei punti equinoziali sulla eclittica immobile; e non suppone perciò alcun cangiamento nelle latitudini delle stelle fisse: immaginiamoci che tutto il cielo si muova lentamente intorno ai poli e all'asse dell'eclittica, e che tutte le stelle sian trasportate verso l'oriente per $50' \frac{1}{3}$ all'anno parallelamente all'eclittica.

Questa retrogradazione degli equinozj nasce, come lo diremo parlando dell'attrazione, dalla schiacciata figura della terra, su la cui protuberanza s'esercita l'attrazione laterale del sole e della luna. Questi due astri attraendo lateralmente l'equatore terrestre, gli fanno cangiar insensibilmente sito, in guisa che non corrisponde più alle stesse stelle; ed è lo stesso come se le stelle avessero un moto rispetto all'equatore, avanzandosi parallelamente all'eclittica.

756. Dopo la scoperta dell'attrazione, si vide che tutti i pianeti dovevano avere un moto nei nodi (1062) loro come la luna, e l'osservazione lo ha verificato (518). Si vide che ciascun pianeta, o l'orbita di ciascun pianeta cangiava di sito per l'attrazione degli altri; dunque anche l'orbita della terra.

Il Sig. Eulero nel 1748 notò, che l'attrazione di giove sopra la terra dovea essere sensibile, e bastante a spiegare la diminuzione nell'obliquità dell'eclittica, e la varietà nelle latitudini delle fisse rispetto all'eclittica, di cui Ticone ne avea già fatta menzione.

757. Eratostene, Ipparco, Tolommeo trovarono essa obliquità di $23^{\circ} 50'$; Albategnio di $23^{\circ} 33' \frac{2}{3}$ verso l'anno 880; Ticone nel 1587 di $23^{\circ} 31' 30''$: noi attualmente non la troviamo che di $23^{\circ} 28' 0''$: onde tale diminuzione pare fuori di dubbio. Questa deve essere seguita da un cangiamento di latitudine nelle fisse, e da una piccola disuguaglianza nel-

nelle loro longitudini; tutto ciò è spiegato a lungo nel XVI libro della mia *astronomia*.

758. Questi moti generali appartengono a tutte le stelle; ma ve ne sono alcune, che anno sofferto qualche disordine, qualche moto proprio, prodotto da qualche causa fisica che non si sa, e che soltanto si cerca di determinare colla osservazione.

Il Sig. Halley lo notò nel 1718. Il moto proprio di *arturo* è il più sensibile che in ogni altra stella. Secondo l'osservazioni di Flamstedio la declinazione d'*arturo* sul principio del 1690 era di $20^{\circ} 49'$; e secondo le osservazioni del Sig. De la Caille di $20^{\circ} 29' 39''$ sul principio del 1750; la differenza è di $19' 21''$; e secondo le note leggi della precessione degli equinozi non dovrebbe essere che $17' 7''$, 2; dunque li $2' 13''$, 8 residui appartengono al moto proprio di questa stella in declinazione nello spazio di 60 anni, cioè $22''$, 3 per ogni dieci.

759. Le stelle di prima grandezza come *sirio*, *aldebaran* e *rigel* sembrano essere state soggette a simili moti, ma però in minor quantità. Non possiamo attribuirne la causa che all'attrazione di altre stelle, o pianeti appartenenti a qualche vicino sistema; ma le stelle sono in una distanza da noi sì enorme, che riesce impossibile l'affermare qualche cosa con certezza su questo punto.

760. La *parallassi annua*, di cui mostrammo gli effetti nel moto de' pianeti (441), potrebbe essere la causa di tali moti delle stelle, se queste non fossero tanto distanti dalla terra. Nonostante fu creduto per lungo tempo, che doveano avere una parallassi annua; ma sebbene questa parallassi sia oggidì dimostrata insensibile e come nulla nelle fisse, nonostante voglio dare un'idea di questa questione tante volte trattata, anche nel 1760.

761. Sia S il sole (fig. 93), AB il diametro dell'orbe magno (413), A il punto in cui si trova la terra il primo di Gennaio, B il primo di Luglio, E una stella che si vede per il raggio AE; essendo la linea AB nel piano dell'eclittica, e supponendosi l'orbe della terra perpendicolare al piano della figura, l'angolo EAB è la latitudine della stella; ma quando la terra sarà in B, essendo la stella in opposizione col sole, essa comparirà sul raggio BE, e la di lei latitudine apparente farà l'angolo EBC; questa latitudine EBC è maggiore della prima, e l'angolo AEB ne nota la differenza; finalmente l'angolo AES, che è sensibilmente la metà di AEB per l'estrema piccolezza di AB, è la *parallassi annua* in latitudine.

762. Se la distanza SE della stella fosse dugento mille volte maggiore della distanza SA del sole dalla terra, l'angolo AES farebbe di $1''$, e la latitudine EAS d'una stella in congiunzione farebbe minore di $1''$ della latitudine EBC nella opposizione, supponendo la latitudine di 90° circa. Copernico dimostrando con molte ragioni il moto della terra, non dissimulò questa obbiezione (Cop. Lib. 1. c. 10). Affinchè la latitudine delle stelle, ad onta del moto della terra, si vedesse sempre la medesima, bisognerebbe che fossero a una distanza sì grande, che non vi fosse tra

essa

essa e l'orbita della terra sensibile proporzione, e che l'angolo AES fosse quasi infinitamente piccolo; ma, dice Copernico, *io stimo meglio ammettere questa distanza sì enorme, piuttosto che la grande quantità di moti che avrebbero luogo supposta fissa la terra*. E poi la distanza grande delle stelle non contiene alcuna contraddizione, anzi è facilissima a concepirsi (464).

763. Se la parallassi annua fosse sensibile, per es. di $20''$, una stella realmente situata nel polo dell'eclittica, ci parrebbe che descrivesse annualmente un piccolo cerchio del raggio di $20''$, perchè ci comparirebbe lontana dal polo di $20''$ alla parte sempre opposta al sito della terra. Il Sig. Picard nel 1672 notò nella stella polare alcune diversità, non per altro conformi all'effetto di questa parallassi, ma erano esatte; ed egli facendo la prima scoperta dell'astronomia moderna nelle fisse, ebbe la gloria di gettare i fondamenti di tutte le altre che ne seguirono.

764. Il Dottore Hook celebre in quasi ogni genere di scienza, e che si reputava egli stesso il più dotto dell'Inghilterra, per determinare queste variazioni piantò nel Collegio di Gresham in Londra un telescopio di 36 piedi, con cui osservò le distanze dal zenit della γ del dragone; e le osservazioni che produsse sono esattamente concordi colla teoria delle parallassi come se vi si fossero accomodate ad industria supposta la parallassi di quella stella di $15''$; nonostante tutto si trovò poi falso.

765. Il Sig. Picard volle verificare questa osservazione; ma l'altezza meridiana della lira nei due solstizj gli parve la stessa, il che è contrario al Sig. Hook, come lo notò lui medesimo nella radunanza dell'Acad. li 4 Giugno 1681 (*Hist. celeste pag. 252*).

Flamstedio avendo osservata nel 1689 e negli anni seguenti la stella polare col suo quadrante murale, trovò che la declinazione nel mese di Luglio era minore di $40'$ che nel mese di Dicembre; queste osservazioni erano esatte, ma non dimostravano la parallasse annua, come lo fece vedere il Sig. Cassini (*Mem. Acad. 1699*). Per altro quantunque Flamstedio lo credesse, nonostante dubitava delle sue osservazioni, e desiderava che si fabbricasse uno strumento di 15, 20 piedi di raggio e solidamente piantato, per decidere con più sicurezza su questo punto. Il Sig. Cassini credette aver trovata in sirio una parallassi di $6''$ (*Mem. Acad. 1717 pag. 265*).

766. La scoperta dell'aberrazione, di cui ora tratteremo, mostrò che tali disequaglianze nelle stelle nascono da causa molto diversa dalla parallassi; e questa causa è tanto giusta e d'accordo colle osservazioni, che esclude ogni pensiero di parallasse.

767. La cognizione della parallasse ci condurrebbe a quella delle distanze delle stelle, se questa parallasse potesse osservarsi; ma giacchè ella è insensibile, ne assegneremo almeno per esclusione un limite. Se la parallasse assoluta d'una stella, o l'angolo APS (*fig. 93*) fosse di $1''$, il lato PS farebbe 206264 volte maggiore del raggio AS, il quale contiene 34 milioni di leghe (83 milioni circa di migl. geogr.) La distanza media del sole AS è uguale a 22918 semidiametri terrestri (postane la

p2-

parallasse di $9''$); se dunque la parallasse annua d'una stella fosse di $1''$, la di lei distanza sarebbe 4727 milioni di volte maggiore del raggio terrestre, cioè conterrebbe 6771770 milioni di leghe (16137736 milioni di migl. geogr.) Ma la parallasse delle stelle, anche le più prossime alla terra, non arriva nè pure a un secondo; dunque la loro distanza deve essere anche maggiore.

768. La grandezza delle stelle, che prima della scoperta dei telescopj, stimavasi d'un minuto, è incomparabilmente minore: resta già dimostrato oggi, che le quattro stelle di prima grandezza regolo, aldebaran, la spica della vergine e antares non hanno nè anche $1''$ di diametro; perchè quando restano eclissate dalla luna non perdono nè anche $2''$ di tempo a nascondersi sotto il disco lunare, il che dovrebbe accadere, se avessero un diametro di $1''$; perchè la luna impiega $2''$ di tempo circa a descrivere $1''$ di grado; ma le stelle svaniscono in un mezzo secondo, e prontissimamente ricompariscono come un punto lucido; dunque il loro diametro non arriva a $1''$.

769. Si vede nei telescopj una luce che circonda le stelle, le ingrandisce, e le fa comparire d'un diametro di $5'$, $6''$; ma questa apparenza nasce dalla vivacità della loro luce, dall'aria d'intorno illuminata, dall'aberrazione dei vetri, dall'impressione troppo viva fatta nell'occhio.

770. Se il diametro d'una stella, e anche la parallasse annua fossero ciascuna di $1''$, il diametro reale della stella sarebbe eguale al raggio dell'orbe magno, cioè a 34 milioni di leghe. Ma può anche darsi che le parallasse delle stelle sieno maggiori dei loro diametri apparenti, e che perciò i loro veri diametri sieno minori del raggio dell'orbe magno. Siamo all'oscuro su questo punto; forse gli astronomi un dì saranno più rischiarati.

771. Nella gran piccolezza del diametro apparente delle fisse consiste probabilmente la causa della loro scintillazione; perchè la molecula più minima di vapore, che passa avanti alla stella, in tal caso ce ne nasconde una parte, e prestissimo ce la scopre; in modo che tale nascondimento e scoprimento cagiona come un moto di vibrazione nella loro luce.

Dell'aberrazione delle stelle.

772. L'*aberrazione delle stelle* è un moto apparente scoperto in esse nel 1728, col quale ci compariscono descrivere delle ellissi di $40''$ di diametro; questo nasce dal moto della luce combinato col moto annuo della terra (783). La definizione della *nutazione* si darà poi (794). La storia di questa scoperta esige che si ripeta ciò che fu detto sulla parallasse annua (763).

773. Flamstedio non solo per le osservazioni del Dottore Hook (765), ma ancora per le sue stesse credeva, che ci fosse una parallasse annua nelle fisse; nonostante la quantità e la legge erano poco note; Samuel Molynæus Irlandese si pose verso il 1735 a verificare questo punto, e

determinare questi moti ; e infatti noi siamo debitori ad esso Sig. Molyneux di quanto fu di ciò esporremo ; ma il Sg. Bradley ebbe la gloria di eseguire ciò che avea solo principiato Molyneux.

774. Molyneux si fece fabbricare sullo stesso guscio del Dottore Hook , colla scorta del celebre oriolajo *Giorgio Graham* un settore di 24 piedi esattissimo più d'ogn'altro per misurare piccoli archi del cielo.

Questo settore fu piantato a Kevv vicino a Londra , e il 3 Dicembre 1725 Molyneux scegliendo le stesse stelle di Hook osservò la stella γ nel capo del dragone , e ne notò esattamente la distanza dal zenit ; ripetè questa osservazione nei dì 5, 11 e 12 dello stesso mese , e non trovò gran differenza ; e siccome in quel tempo dell' anno la parallassi annua non dovea andar soggetta a variazione , così stimò inutile di continuare per allora le osservazioni.

775. Il Sig. Bradley si trovava allora a Kevv , e volle osservare la stessa stella il dì 17 Dicembre 1725 , e s'accorse che la stessa passava un po più al sud che nei primi giorni del mese ; sul principio li due astronomi non fecero gran caso di questa differenza , che poteva derivare da qualche errore nell' osservazione . Nonostante il dì 20 la stella s'era avanzata ancora verso il sud , e così seguitò nei giorni appresso , senza poter attribuire questo progresso ad errore .

776. Tale differenza riusciva tanto più sorprendente , perchè l' effetto si trovava alla parte affatto contraria a quella che si avrebbe dalla parallassi annua ; si esaminò bene intanto e si verificò l' esattezza dello strumento , per non averne ad incolpare il medesimo ; ma la stella sempre più si portava verso il sud ; e allora non si studiò ad altro che a misurare con esattezza questo progresso , a scoprirne le circostanze e la causa . Sul principio di Marzo 1726 la stella si trovò discosta 20" dal luogo , in cui s'era vista tre mesi prima ; e allora per alcuni giorni rimase stazionaria ; intorno la metà d' Aprile cominciò a dirigersi verso il nord , e sul principio di Giugno passò nella stessa distanza del zenit , come sei mesi avanti ; la sua declinazione cambiava allora in tre giorni di 1" ; onde era facile a vedersi che la medesima stella continuava a portarsi verso il nord ; e infatti la stella nel mese di Settembre trovossi di 20" più vicina al nord che in Giugno , e di 39" che in Marzo ; da questo punto tornò verso il sud e nel Dicembre 1726 fu osservata alla stessa distanza dal zenit come nell'anno precedente , colla sola differenza dovuta prodursi dalla precessione .

777. Da ciò era mostrato , che tali differenze non nascevano da difetto nell' istrumento ; ma d' altro canto questo effetto troppo regolare non poteva dipendere da una irregolare fluttuazione della materia eterea , come avea sospettato il Sig. Manfredi , che non avea altro che cattive osservazioni . La difficoltà consisteva a spiegare chiaramente tale fenomeno .

778. La prima idea fu di esaminare , se potesse ciò nascere da qualche nutazione dell' asse terrestre prodotta dall' azione del sole e della luna atteso lo schiacciamento della terra , come dovea succedere per l' attrazione

(794) ;

(794); ma l' osservazione di altre stelle fatta nello stesso tempo non dava luogo a questa ipotesi: una piccola stella che si trovava nella stessa distanza dal polo ed opposta in ascensione retta alla γ del dragone avrebbe dovuto essere stata soggetta per tale nutazione allo stesso cangiamento in declinazione; nonnostante non lo fu che per la metà; questa fu la trigesima quinta stella della giraffa. Il Sig. Bradley per verificare maggiormente questi fatti, fece fabbricare un altro settore, che fu piantato nel 1727, e cominciò ad esaminare attentamente quali fossero le variazioni delle stelle, secondo la diversa loro situazione.

779. S'accorse che ciascheduna stella compariva stazionaria, o nel suo maggiore allontanamento verso il nord, o verso il sud, quando passava per il zenit verso le ore sei della sera, o della mattina; che ciascheduna s' avanzava verso il sud, quando vi passava la mattina, e verso il nord quando la sera, e che lo scostamento maggiore era, come il seno della latitudine di ciascheduna. Finalmente quando, passato un anno, tornò a vedere ciascuna stella nello stesso luogo, in cui prima le avea vedute, il Sig. Bradley guidato da sì numerose osservazioni si studiò a cercarne la causa. Questa doveva essere annua e costante, uguale per le stelle sì tenui come per le più brillanti, l' effetto maggiore della quale dal nord al sud fosse come il seno della latitudine della stella, (cioè nullo per le stelle situate sull' ecclittica) e contrario all' effetto della parallasse, ed eguale nel suo massimo valore a $40''$.

780. Il Bradley felicemente s'accorse, che questa differenza di $40''$ era appunto lo spazio percorso dalla terra nella sua orbita in $16'$ di tempo, e li sovvenne che la luce spendeva lo stesso tempo a percorrere il diametro della orbita terrestre giusta la scoperta di Romero nel 1675 (838). Il Bradley poté pensarsi da principio, che quando le stelle erano in congiunzione si vedevano $16'$ più tardi per la loro lontananza, che quando erano in opposizione, e perciò meno avanzate di $40''$; ma secondo questo discorso non si vedrebbe soggetta all' aberrazione quella stella che fosse nel polo dell' ecclittica, perchè la distanza è sempre la stessa.

781. Nonnostante la stella γ del dragone era soggetta a un' aberrazione dal nord al sud di $20''$, che si accresceva come il seno delle distanze da quel punto, in cui era nulla. Il Bradley giudicò, che questa stella descriveva un cerchio simile a quello, che si avrebbe in una parallasse di $20''$; ma che lo descriveva in modo, onde restasse sempre più avanzata di $20''$ verso quella parte, alla quale si porta la terra. Tale è il fenomeno indicato dalle osservazioni del Bradley; di esio ne parleremo più a lungo (791). Resta dunque a cercare come la stella comparisca sempre verso quella parte, verso cui si porta la terra.

782. Finalmente il Bradley ebbe la sorte di combinare il moto della luce con quello della terra, secondo le leggi della risoluzione delle forze; e di questa sua scoperta pienamente concorde colle osservazioni ne rese conto nel Dicembre 1728 (*Philosoph. transf.*).

Per mostrare il quale accordo ordinò in una tavola 15 osservazioni della γ del dragone fatte in tutti li mesi dell' anno; si vedeva quanto in

D d 2

cia-

ciascun giorno doveva essere più meridionale secondo il calcolo rigoroso dedotto dai principj che spiegheremo , e quanto la si era veduta coll' osservazione ; la differenza non arrivava mai a $1^{\circ} \frac{1}{2}$.

Il medesimo accordo si vide in ogn' altra stella ; onde il Sig. Bradley non doveva più riguardare come un' ipotesi un principio che si accordava sì perfettamente col moto osservato delle stelle , e colla successiva propagazione della luce già verificata dalle eclissi dei satelliti (838).

783. Passo dunque alla spiegazione di tale causa ; ma siccome si dura fatica comunemente a ben concepirla , così procurerò di mostrarla con tanta evidenza , quanta ne ha una proposizione di geometria . La spiegherò dunque in diversi modi , ma che tutti suppongono nota la risoluzione delle forze nei parallelogrammi (479). Sia E una stella (fig. 94), e il di lei raggio a noi diretto si consideri come un corpuscolo , che tende da E in B ; sia AB una piccola porzione dell' orbita terrestre , per es. di $20''$ (presto si vedrà il perchè di $20''$) , e CB lo spazio che il raggio ha percorso finchè la terra descrisse AB ; dunque il corpuscolo di luce B si trovava in C quando la terra in A , e giunge al punto B quando la terra . Così CB , AB esprimono le velocità della luce e della terra in $20''$ di tempo .

784. Descrivo la linea CD parallela ed eguale alla AB , e compio il parallelogrammo DBA ; la velocità CB della luce si può considerare come un risultato delle due velocità dirette per CD , CA ; delle quali la CD essendo nella stessa direzione e della stessa quantità colla velocità AB della terra , resta nulla per noi ; l' occhio non potendo vedere per via d' un raggio , che si porta alla stessa parte e colla stessa velocità con cui si porta lo stesso occhio . Dunque la sola parte CA della velocità della luce avrà luogo per noi ; il raggio giungerà all' occhio nostro colla direzione CA , e noi vedremo la stella per la AC , o per la BD che le è parallela ; l' angolo CBD si chiama l' *aberrazione* ; e fa che una stella per causa del moto della terra e della luce ci comparisca lontana dal suo vero sito d' una quantità eguale all' angolo CBD .

785. Altra spiegazione . Il corpuscolo di luce B ferisce il nostro occhio colla velocità CB ; ma poichè l' occhio nel tempo stesso si porta da A in B colla velocità AB , l' occhio stesso va a ferire il raggio , in modo che a un tempo stesso v' ha un doppio urto , cioè quello del raggio che va incontro all' occhio colla velocità CB , e quello dell' occhio che va incontro al raggio colla velocità AB . Invece di questo secondo urto , possiamo immaginarci (non nascendone alcuna diversità nell' effetto) che il corpuscolo sia venuto da F in B a ferire l' occhio colla velocità FB eguale alla AB ; così l' occhio riceve un' impressione secondo CB , e un' altra secondo FB ; da queste due impressioni rappresentate dai lati CB , FB del parallelogrammo CF , ne nasce una impressione unica e composta , secondo cioè la diagonale BD ; perciò si vedrà la stella secondo la direzione BD , non già secondo la BCE .

786. Con un esempio comune si può mostrare il meccanismo di queste com-

composte impressioni. Sia una nave GCFA (*fig. 93*), che si porta da dritta a sinistra; siasi dall' angolo C della stessa nave lanciata una pietra contro l'altro angolo A, e nel tempo ch'essa pietra ha percorso la CA, siasi avanzata la nave per lo spazio di CD o AB; quegli che nella nave sta in A, si troverà in tal caso in B, e riceverà la stessa impressione, come se la nave non si fosse mossa; poichè la relazione del punto C col punto A, il loro sito e la loro distanza non dipendono punto dal moto della nave, essendo questo moto comune alla pietra e alla nave; ed è nullo rispetto all' urto. Nonnonostante relativamente allo spazio assoluto questa pietra si portò da C in B; ed ha descritto lo stesso viaggio che avrebbe fatto una pietra lanciata dal lido R direttamente contro B. Ecco due pietre, una delle quali partitasi dal lido R percorse la linea CB, l' altra dal punto C angolo della nave percorse CB per causa del moto di essa nave; ma questa seconda ebbe la direzione DB, dunque l' altra gettata da R si farebbe fatta parimenti vedere secondo la direzione stessa DB da colui, che posto nell' angolo A della nave fosse stato trasportato da A in B, finchè la pietra passò da C in B.

787. L'aberrazione di $20''$ corrisponde a $8' 7'' \frac{1}{2}$ nelle tavole del sole; così siamo certi, almeno dentro $5''$, che la luce del sole abbisogna di $8' 7''$ per giungere alla terra, nelle sue distanze medie; dal che ne segue che la velocità della luce è 10313 volte maggiore della velocità media della terra. (La velocità del moto annuo della terra è di 23531 leghe in ogni ora, (*migl. geograf.* 56076 $\frac{1}{2}$) cioè 6 $\frac{1}{2}$ leghe in un secondo; (*migl.* 15 $\frac{1}{2}$ e più). Ma quella del moto diurno è di 238 toese per secondo, come la velocità circa d'una palla di cannone).

788. Prima di spiegare esattamente i fenomeni dell' aberrazione, avvertasi, che il piano ECBA (*fig. 94*), che congiunge la linea AB descritta dalla terra colla stella E, dicesi *piano dell' aberrazione*, perchè questa si compie in esso piano; il luogo apparente della stella, e il luogo vero, l' occhio dell' osservatore e lo spazio descritto in $8'$ di tempo si trovano tutti in questo piano, di modo che l' aberrazione non può rappresentarci la stella in un altro piano diverso. Il triangolo CBA formato dalle linee del viaggio della luce e della terra, e il di cui piccolo angolo C misura l' aberrazione, dicesi *triangolo dell' aberrazione*. Osserviamone le diversità, secondo che questo triangolo sarà rettangolo o ottusangolo.

789. Si vede chiaro dalle dimostrazioni (783) precedenti, che una stella ci comparisce sempre più avanzata dalla stessa parte, verso cui noi ci portiamo colla terra, d'una quantità eguale all'angolo BCA; il valore di questo angolo dipende dalla proporzione fra le velocità AB della terra e CB della luce; questa ragione si è come 1 : 10313 (787); che dà un angolo di $20''$, quando CB sia perpendicolare alla AB; dunque l' aberrazione sarà sempre di $20''$ quando la strada segnata dall' occhio sarà

farà perpendicolare al raggio della stella; ma quando CB (fig. 99) è obliqua alla strada AB dell'occhio, allora l'angolo ACB diviene minore; ed essendo $CB : AB$, come il seno dell'angolo A al seno dell'angolo C, farà il seno dell'angolo d'aberrazione, o la stessa aberrazione, come il seno dell'inclinazione del raggio CA sulla AB, che è sempre un piccolo arco dell'orbita terrestre; cioè farà eguale a $20''$ moltiplicati nel seno dell'angolo, che forma la strada dell'occhio col raggio di luce. Finalmente se la linea CA fosse tanto obliqua alla ABD, che arrivasse a confonderfi con essa, l'angolo C sarebbe nullo, e nulla perciò l'aberrazione; il che apparisce anche da ciò che il raggio in tal caso ci giungerebbe sempre nella stessa direzione.

790. Supponiamo adesso che l'occhio, invece di portarsi da A in B, venga da B in A, e il raggio arrivi in A quando l'occhio; se si risolve la velocità CA (784) nelle due CE, CB, la CE resta distrutta dalla velocità della terra BA, e ne resta CB o la parallela EA; dunque in tal caso la stella sembrerà alzarsi sopra la linea, che l'occhio descrive, invece d'abbassarsi come sopra; si farà vedere in E invece che in C: sempre l'aberrazione porta la stella verso la parte cui tende la terra. Quando la terra si trova nel punto G della sua orbita GHD (fig. 96), indi in K, sembra che cammini per direzione contraria; nel primo caso la stella è in opposizione, e comparisce a sinistra del luogo medio C; nel secondo camminando la terra da D in K, la stella è in congiunzione col sole, e comparisce per $20''$ a dritta, cioè all'occidente del punto C sulla linea DS. Quando la terra descrive il piccolo arco FL, l'aberrazione si diminuisce, perchè non v'è se non la perpendicolare LN; che produca l'aberrazione, ed essa LN è molto minore della LF, nella stessa ragione, in cui il coseno dell'arco GL della elongazione è minore del raggio, o SV minore di SL, per la somiglianza de' triangoli LFN, SVL, nei quali $LF : LN :: SL : SV$. Così l'aberrazione in longitudine, che dipende dal moto BG o NL della terra perpendicolarmente al raggio condotto verso la stella, è proporzionale al seno della distanza dal punto, in cui essa è nulla, cioè dal punto H della quadratura. Per la stessa ragione l'aberrazione in latitudine dipende dal moto della terra nella direzione perpendicolare a quella del piccolo moto FN, ed è proporzionale al seno della distanza GL o alla linea LV, perchè negli stessi triangoli LFN, LVS si ha $LF : FN :: SL : LV$.

791. Se questa stella fosse nel polo dell'ecclittica, la si vedrebbe sempre per $20''$ avanzata verso la parte per cui tende la terra; e perciò mentre la terra descrive un cerchio, si vedrebbe pure la stella a descriverne uno; il che fu osservato dal Sig. Bradley nella γ del Dragone.

Se la stella sia più vicina al piano dell'ecclittica, e si veda obliquamente, l'effetto dell'aberrazione perpendicolarmente al piano dell'ecclittica sarà minore in ragione del seno della obliquità (789); ma resterà l'istesso se si confideri in senso parallelo all'ecclittica, e così il cerchio diverrà un'ellisse come LAK (fig. 98). L'asse maggiore LK
para-

parallelo all' ecclittica farà sempre di $40''$, perchè quando la stella è in congiunzione o in opposizione, l'aberrazione è sempre di $20''$, o sia che la stella abbia o non abbia latitudine, per essere la strada BG (*fig. 96*) della terra sempre perpendicolare al raggio della stella; ma l'asse minore AF farà più piccolo in ragione del seno di latitudine.

Il punto L ch'è il più alla sinistra o all'occidente, è il luogo, in cui si vede la stella in opposizione, il punto K quello della congiunzione. Il punto A se la stella è australe, o F se boreale, cioè il punto dell' ellissi, ch'è più vicino all'ecclittica, indica il luogo apparente della stella tre mesi dopo la congiunzione. Essendo l'aberrazione in longitudine come il coseno dell' elongazione della stella nel cerchio circoscritto all' ellisse, e che colla sua inclinazione forma l' ellisse, se si tira in K il luogo del sole, ch'è uguale alla longitudine della stella, e se si divide il cerchio circoscritto in 360° , le perpendicolari calate da ciaschedun grado di longitudine sull' asse maggiore LEK noteranno sull' ellissi tutti i punti, nei quali la stella dovrà vederfi negli stessi tempi; e per questo ho notati sull' ellissi ALFK i luoghi d' *arturo* per il primo di ciaschedun mese.

792. Arturo si trova sull' estremità occidentale dell' asse maggiore della sua ellissi a dritta li 13 Ottobre giorno di sua congiunzione; e sulla estremità inferiore o meridionale F dell' asse minore gli 11 Gennajo, giorno della prima quadratura. L' ellisse d' arturo rispetto alla linea orizzontale AB, che suppongo parallela all' equatore, è inclinata quanto è l' angolo di posizione (318): basterebbe calare delle perpendicolari sopra AB, per vedere in diversi tempi dell' anno l' aberrazione in ascension retta e in declinazione. In questa stessa ellissi si scorge l' effetto della parallasse (763), che farebbe comparire la stella sugli stessi punti dell' ellissi tre mesi più presto, di quello che succeda per l' aberrazione, supposta la massima parallasse di $20''$ come l' aberrazione; le situazioni che si avrebbero per la parallasse annua quattro volte all' anno, le ho segnate dentro all' ellissi.

793. L' aberrazione in longitudine, che in questa figura si misurerebbe sul parallelo della stella, supposta EL di $20'$, si deve ridurre all' ecclittica per gli usi astronomici, bisogna cioè dividerla per il coseno della latitudine della stella (531); e quindi ne avviene, che l' aberrazione assoluta, ch'è sempre di $20''$ di cerchio massimo, se si prenda nella regione d' una stella, diviene grandissima per le stelle vicine al polo, misurandola sull' equatore, o avendo riguardo al cangiamento, che ne nasce nell' ascensione retta: ho pubblicate delle tavole d' aberrazione per moltissime stelle in diversi volumi della *Connoiss. des temps*.

Della Nutazione .

794. La nutazione, o deviazione è un moto apparente di $9''$ osservato nelle fisse, il di cui periodo si compie in 18 anni, prodotto dall' attrazione della luna sulla sferoide terrestre. Nel libro XII si vedrà, che la

la precessione degli equinozi, di 50" all'anno, è prodotta dall'azione del sole e della luna sulla parte che si concepisce elevata nella sferoide (1064). L'azione sola della luna ne produce almeno 36 di que' 50"; ma la luna non può produrre questi 36" di precessione uniformemente, poichè i suoi nodi cangiano perpetuamente sito, e perchè la sua inclinazione rispetto all'equatore, da cui il suo effetto ne nasce, si cangia di dieci gradi; ne deve nascere una disuguaglianza non solamente nella precessione annua degli equinozi in diversi anni, ma ancora una nutazione nell'asse della terra. Per causa di questa nutazione le stelle ci devono comparire ora avvicinarsi ed ora allontanarsi dall'equatore, poichè l'equatore corrisponde a diverse stelle.

Non vediamo che Flamstedio abbia sperato verso il 1690 di determinare, per mezzo delle stelle vicine al zenit, la quantità di questa nutazione, che doveva nascere dalla Teoria di Nevvton; ma egli lasciò questo punto, perchè, diceva, se questo effetto esiste, deve essere insensibile, finchè non si abbiano istrumenti maggiori di 7 piedi, più sodi e meglio piantati de'miei (*Hist. cel. tom. III. pag. 113*).

Horrebov porta un passo formale tratto dai manoscritti di Romero, dal quale si vede, ch'esso pure sospettava una nutazione nell'asse della terra, e che sperava di trovarne la Teoria (*Basis Astronomie 1733 pag. 66*).

Queste idee della nutazione doveano presentarsi a chiunque vedeva nelle stelle un cangiamento di declinazione; e abbiamo visto che i primi sospetti di tale nutazione in Bradley nacquero dal vedere la γ del Dragone più o meno vicina al polo (778); ma la serie delle sue osservazioni l'obbligò a indagare un'altra causa per le variazioni annue; e non riconobbe questo secondo moto che dopo alcuni anni.

795. Per meglio spiegare questa seconda scoperta di Bradley, bisogna tornare a quel tempo, in cui scoperse l'aberrazione. Vide nel 1728, che il cangiamento annuo di declinazione nelle stelle vicine al coluro degli equinozi era alquanto maggiore di quello che doveva essere per la precessione supposta di 50", e calcolata al modo comune; senza che questa differenza potesse ascriversi all'istrumento, perchè nelle stelle vicine al coluro dei solstizj questa differenza non si scorgeva.

In genere nelle stelle vicine al coluro degli equinozi erasi osservato un cangiamento di declinazione di circa 2" di più di quello che si avrebbe avuto per la precessione media notissima; e nelle stelle vicine al coluro dei solstizj uno minore di quello che avrebbe dovuto essere. Ma, aggiunge Bradley, o sia che queste piccole diversità nascano da una causa regolare, o da alcuni cangiamenti del settore, io non sono ancora in caso di determinarle. Il Sig. Bradley però fu ansiosissimo per determinare il loro periodo e la legge; rimase quasi sempre a Wansted fino al 1732, in cui fu obbligato di portarsi a Oxford a rimpiazzare il posto di Halley; seguitò con la stessa esattezza ad osservare tutte le circostanze dei cangiamenti di declinazione in un gran numero di stelle. In ciaschedun anno vedeva ristabilirsi i periodi dell'aberrazione secondo le regole che abbiamo spie-

pie-

spiegate; ma v'era un'altra differenza fra un anno e l'altro; le stelle poste fra l'equinozio di primavera ed il solstizio d'inverno si trovavano più vicine al polo boreale, e le stelle opposte se n'erano discostate; cominciò a sospettare che dall'azione della luna sopra l'equatore, o la parte elevata della terra, potesse nascere nell'asse della terra una qualche variazione; giacchè il suo settore rimaneva ancora piantato a Wansled, seguì a portarsi colà per osservare, e nel 1747 pronunziò sulla causa di tale fenomeno, e noi tosto renderemo conto di questa scoperta seguendo lo stesso Bradley (*Phil. trans. Janu. 1748*).

796. Nel 1717 il nodo ascendente della luna concorreva con l'equinozio di primavera, in guisa che nella massima sua latitudine la luna si allontanava dall'equatore per $28^{\circ} \frac{1}{2}$; nel 1736 trovandosi il nodo della luna nell'equinozio d'autunno, non poteva la luna scostarsi dall'equatore per più di $18^{\circ} \frac{1}{2}$; in guisa che l'orbita della luna nel 1717 era più discosta dall'equatore di 10° che nel 1736, ciò che rendeva più sensibile la di lei attrazione sull'equatore.

Bradley nel 1717 per via del cambiamento di declinazione nelle stelle vicine al coluro degli equinozi, osservò, che la precessione sembrava maggiore della media (795), e nonostante le stelle vicine al coluro dei solstizj sembravano muoversi in modo contrario agli effetti di questo accrescimento; le stelle opposte in ascensione n'erano affette nello stesso modo. Nella γ del dragone e nella β della giraffa s'era scorto il medesimo cambiamento in declinazione, nell'una verso il nord, nell'altra verso il sud; e tutto ciò s'accordava perfettamente con una nutazione dell'asse terrestre, da cui deve evidentemente prodursi una eguale differenza nelle stelle opposte in ascensione retta.

Nel 1713 essendosi portato il nodo della luna con moto retrogrado fino al solstizio d'inverno, le stelle situate presso il coluro degli equinozi sembrarono soggette a un cambiamento di declinazione corrispondente alla precessione di $50'$. Negli anni seguenti questo cambiamento si diminuì fino al 1736, in cui il nodo ascendente pervenne all'equinozio d'autunno.

Le stelle vicine al coluro de' solstizj cambiarono la loro declinazione dal 1717 fino al 1736, di $18''$ meno di quel che voglia la precessione di $50'$; in guisa che il polo del mondo o l'asse della terra fu soggetto a una nutazione di $18''$ durante una semirevoluzione dei nodi della luna. Nel 1745, a capo cioè di 18 anni, essendo ritornati i nodi al primiero loro sito, le stelle si videro ai medesimi punti, considerata la precessione degli equinozi: si scoprirono gli stessi fenomeni del 1717, e il Sig. Bradley non ebbe più dubbio che la vera causa non dipendesse dalla nutazione dell'asse terrestre.

797. Il Sig. Machin Segretario della Società Reale, cui avea spedite le sue congetture, s'accorse ben presto che per ispiegare la nutazione e il cambiamento della precessione, bastava supporre che il polo della terra

E e

de-

descrivesse un picciolo cerchio, come l'avea supposto Ticone per l'orbita della luna. Fissando il diametro di esso cerchio di $18''$, e che dal polo fosse descritto nello spazio della rivoluzione dei nodi lunari, come trovò Bradley, il Sig. Machin spiegava ad un tempo il cangiamento della precessione annua, come erasi trovato nelle stelle vicine al coluro degli equinozj, e la nutazione parimenti dell'asse terrestre dimostrata dalle stelle vicine al coluro de' solstizj.

Per mostrare il consenso della sua teoria coi fenomeni, il Bradley produce un gran numero d'osservazioni fatte dal 1727 fino al 1747 in diverse stelle, ma specialmente nella γ del dragone. Fra le 300 osservazioni fatte in detta stella, non se ne trovarono che undici, che si scostavano di $2'$ dalla media.

798. Sia E il polo dell'ecclittica (fig. 97), P il polo dell'equatore lontano dal primo per $23^{\circ} \frac{1}{2}$, e intorno al punto P un piccolo cerchio del raggio PB di $9''$. Invece del punto P, che è il luogo medio del polo, si suppone, che il vero polo descriva un cerchio ABCD, e che si trovi in A, quando il nodo della luna è sul coluro degli equinozj PY, e che seguiti a muoversi da A in B come il nodo; di modo che quando il polo è in O, l'arco AO in gradi sia eguale alla longitudine del nodo della luna; il luogo del polo vero farà sempre più avanzato tre segni di più in ascensione retta sul cerchio ABC di quello che sia il nodo della luna sull'ecclittica, e il polo sarà in D quando il nodo in $\varnothing$. Poichè il polo retrocede da A in B, egli deve avvicinarsi alle stelle che sono nel coluro PBY degli equinozj; in guisa che la precessione comparirà maggiore, poichè produce nelle stelle, che sono sul coluro degli equinozj, un cangiamento di declinazione maggiore di $9''$ di quello che dovrebbe averfi, e ciò per lo spazio di 4 anni e 8 mesi consumato dal nodo per passare dall'ariete al capricorno, e dal polo per passare da A in B; il polo nel tempo stesso sembrerà essersi avvicinato alle stelle, che sono presso il solstizio d'inverno E. E queste sono infatti le circostanze osservate dal Bradley (796).

799. Il primo effetto generale e il più facile a vedersi della nutazione si è il cangiamento dell'obliquità dell'ecclittica; questa s'accresce di $9''$, quando il nodo ascendente della luna si trova in ariete; poichè allora il polo è in A, e la distanza dei poli EA si fa di $9''$ maggiore di quando il nodo è in libra, ed il polo si trova in C. Questa obliquità nel 1764 era di $23^{\circ} 28' 15''$, nel 1755 $23^{\circ} 28' 5''$; non solamente dunque non si è diminuita di $8''$ come dovea succedere (758); ma si è accresciuta di $10''$, ciò che dà $18''$ di più per l'effetto solo della nutazione, ch'è eguale ad AC.

Quando il polo della terra è giunto da A in O, l'obliquità dell'ecclittica è EO, o sia EH, e la nutazione si trova eguale a PH; l'arco AO, o l'angolo APO, è uguale alla longitudine del nodo, e PH è il suo coseno; ma $PH = 9'' \sin. OB$, o pure $9'' \cosen. AO$; dunque la nutazione $PH = + 9'' \cosen. nodo$, cioè $9''$ moltiplicati nel coseno del-

della longitud. del nodo lunare . Quando il nodo della luna si trova nel secondo e terzo quadrante dell'eclittica, questa nutazione si deve sottrarre dalla obliquità media o sia uniforme , e aggiungere , quando si trova nel primo e quarto .

La nutazione cangia eziandio le longitudini , le ascensioni rette e le declinazioni degli astri ; le sole latitudini ne sono esenti ; poichè il polo E dell'eclittica è immobile nella teoria della nutazione : l'ipotesi precedente è bastevole a calcolare questi cangiamenti ; perchè non si deve se non che prendere O per il polo dell'equatore , EO per il coluro degli equinozj invece di EP ; dal punto O considerato come polo del mondo , si descrive un arco OS verso una stella S, e sarà OS il complemento della di lei declinazione , l'angolo SEO complemento della longitudine , l'angolo SOE dell'ascensione retta , e l'arco SE della latitudine ; e questa è la sola quantità nel triangolo ESP , (che diviene il triangolo ESO) che non si cangia . Tutte queste variazioni sono facili a calcolarsi colla trigonom. sferica , nota che sia la posizione del coluro EO rispetto al coluro medio EP , che si dovrebbe considerare rimossa la nutazione .



LIBRO OTTAVO.

Della figura della terra.

800. Si è spiegato nel primo libro (39) il metodo , con cui si trovò la grandezza della terra ; ma gli antichi erano poco certi delle loro misure : secondo le misure citate da Plinio , un grado terrestre era di 100 stadj, e gli stadj di Plinio contenevano $91 \frac{3}{4}$ toese (o , 96 migl. geog.) e il grado perciò di 66000 toese (69 migl. poco meno) altri lo facevano di 8999 (39) . Secondo le misure ordinate verso l'anno 830 dal Califo Almamon , il grado si ridusse a toese 47000. Fernellio nel 1550 lo trovò di 56746 , Snellio nel 1617 di 55021. Norvood nel 1635 di 57424 , e Riccioli di 62900 toese. Tale era la nostra incertezza : quando l' Accademia delle Scienze volle che si misurasse un grado in mezzo della Francia . Sarebbe stato lungo e faticoso il misurare uno spazio di 25 leghe a toesa per toesa , sebbene fu ciò praticato nell' America Settentrionale (*Phil. transf.* 1768).

Il Sig. Picard volle piuttosto adoperare la trigonometria , e si contentò di misurare esattamente un tratto di due leghe da Ville-juive fino a Juvisy , strada lastricata e dritta , e trovò il restante per via di triangoli : dopo di che l' Accademia fece innalzare nei detti due luoghi due piramidi , gli assi delle quali sono distanti tra loro 5717 toese , come l' abbiamo noi trovato nel 1756.

801. La toesa , di cui ci siamo serviti , sta in deposito nel Gabinetto dell' Accademia , e se ne spedirono esatti modelli per tutto il Regno , per ovviare qualunque difficoltà sulla vera toesa di Francia , come ce ne fu fino a questo tempo , e come ve ne sono anche in Inghilterra , dove non si sono mai accordati sulle misure . La toesa dell' Accademia è la più verificata di tutte le misure del mondo , e la più celebre in tutti i colti paesi . Io ho seguitato a dare nella *Connaissance des temps* per molti anni il paragone fra le misure forastiere e la nostra .

802. Il primo triangolo piantato dal Picard sulla base di Ville-juive finiva alla Torre di Brie-comte-Robert ; il secondo avea per base la distanza fra Ville-juive e Brie-comte-Robert , e terminava alla Torre di Montlhéry ; con questo secondo triangolo trovò la distanza fra Brie e Montlhéry di toese 13122 $\frac{1}{2}$. In tal modo giunse fino alla torre di Nostra-Dama d' Amiens , che è più settentrionale della facciata meridionale dell' osservatorio di toese 60390 (*Méridienne verif. pag. 46 e 50*) ; e di cui però la latitudine è maggiore di 1° 3' 9" , da cui si ha il grado di toese 57069. La lega comunemente si è $\frac{1}{55}$ di questo grado ; onde essa contiene toese 1283 , e la circonferenza della terra è di leghe 9000. Le leghe
ma-

marine sono di 20 al grado , o di toese 2853. Le si adoprano tali sul mare, acciocchè 3 minuti, che sono tre miglia marine d'Inghilterra e d'Italia, formino una lega marina di Francia, ed affinchè i navigatori d'ogni paese s'intendano più facilmente.

Della figura e schiacciamento della terra .

803. Supponendo la terra sferica col grado di Picard si avrebbe potuto trovarne la grandezza, ma se non fosse sferica, li 360 gradi farebbero diversi tra loro; per decidere questo dubbio l'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1683 pensò di far misurare diversi gradi in diverse latitudini.

804. Non so chi sia stato il primo a suscitare questa ricerca; solamente trovo, che il Picard nell' art. 4 della sua misura della terra pubblicata nel 1671 parla d'una congettura *ch'era già stata proposta nell'Assemblea, che, posto il moto della terra, i gravi doveano discendere con minor forza sotto l'equatore che sotto i poli*; e di più nota, che si vedrebbe da ciò una maggiore celerità nei penduli a secondi, dove la gravità fosse maggiore, o minore la forza centrifuga. Aggiunge di più ancora, che secondo esperienze fatte in Londra, Lyon, e Bologna in Italia, sembra che i detti penduli debbano accorciarsi più che si accostano all'equatore, ma che non era pienamente informato di tali sperienze, onde poterne cavare delle conseguenze fondate. Al contrario, soggiunge, che all'Haya, cioè in maggior latitudine di Londra, si trovò la stessa lunghezza di pendulo che a Parigi.

805. Intanto nel 1671 fu inviato il Sig. Richerio alla Cayenna (742), per osservare tra le altre cose anche la lunghezza del pendulo. Nel capo X delle sue osservazioni che pubblicò, parla espressamente sulla lunghezza del pendulo, e la chiama una delle sue più notabili osservazioni. *La stessa misura del pendulo a secondi notata nella Cayenna sopra una verga di ferro, trasportata in Francia si trovò minore di quella di Parigi, ch'è di piedi 3 lin. 8 $\frac{2}{5}$, di linee 1 $\frac{1}{4}$; questa osservazione è stata ripetuta in ogni settimana attentamente per lo spazio di dieci mesi. Le vibrazioni del pendulo semplice erano molto piccole, e si mantenevano molto sensibili fino a 52 min. di tempo, e si paragonavano con quelle d'un orologio esattissimo a secondi (Recueil d'observat. faites en plusieurs voyag. in fol. 1693).* Il pendulo dell'orologio a secondi di Richerio esattissimo a Parigi, si ritardava nella Cayenna di 2 min. in ciaschedun giorno; ciocchè dimostrava essere minore la gravità della lente nella Cayenna, ove discendeva verfo terra con minore velocità (Regie Scient. Acad. historia L. I.).

806. Dopo questa osservazione, si esaminò la lunghezza del pendulo in diversi paesi, e si trovò come nella segu. Tavola in pollici, linee e centesime di linea.

Sotto

Sotto l'equat. all'altezza di 2434 toefe (Bougu. fig. de la ter. pag. 342)	— — — — —	36. 6, 70
Sotto l'equat. all'alt. di 1466 toef. (ibid.)	— — — — —	36. 6, 83
Sotto l'equat. al livello del mare (ibid.)	— — — — —	36. 7, 07
In Portobello-latit. 9° 34' (ibid.)	— — — — —	36. 7, 16
Petit Goave-nell'Isola di S. Domingo 18° 27' (ibid.)	— — — — —	36. 7, 33
Capo di B. Sper. - 33° 55' (Mem. Acad. 1751 p. 438)	— — — — —	36. 8, 07
Ginevra-46° 12'; Mallet col pendulo invariabile	— — — — —	36. 8, 17
Parigi-48° 50' (Mem. Acad. 1735) de Mairan	— — — — —	36. 8, 52
Bouguer dopo fatte le riduzioni	— — — — —	36. 8, 67
Leyde-52° 9' — Lulofs	— — — — —	36. 8, 71
Pietroburgo- 59° 56' — Mallet	— — — — —	36. 8, 97
Pello-66° 48' — Maupertuis (fig. de la terre p. 180)	— — — — —	36. 9, 17
Ponoi in Lapponia 67° 4' — Mallet	— — — — —	36. 9, 17

807. Così la prima sperienza che dimostrò il moto della terra intorno all'asse fu quella del pendulo nel 1672. Huygens allora sospettò, che per la forza centrifuga rendendosi la gravità de' corpi minore sotto l'equatore che a Parigi (1011), poteva nascere, che le parti della terra fossero ivi più elevate e più lontane dal centro, e che la figura della terra sarebbe perciò sferoidea schiacciata ai poli; e per crederla così si trovava una gran ragione nello schiacciamento di giove osservato già dal Sig. Cassini prima del 1666, come lo disse lui stesso (Mem. Acad. 1701 p. 180).

808. Osserviamo adesso come gli astronomi se ne assicuraron per via dei gradi terrestri in diverse latitudini. Se la terra non è rotonda, i gradi devono essere diversi da quei d'un globo. Sia EPQO (fig. 100) la circonferenza compressa della terra; EDFQ quella d'un cerchio circoscritto dello stesso diametro ECQ; preso un arco DF in esso eguale a un grado, anche l'angolo DCF sarà d'un grado; ma l'arco terrestre GH non deve dirsi un grado, quantunque determinato dalle linee DC, FC comprendenti nel centro C un angolo d'un grado.

809. Suppongo prima noto, come un principio d'idrostatica, dimostrato dalla sperienza e dalla ragione, che la gravità agisce sempre perpendicolarmente alla superficie della terra, qualunque siane la figura. Dai livelli d'aria o d'acqua, o fatti col filo a piombo, si ha sempre lo stesso risultato nelli livellamenti, con che si prova che il filo a piombo è esattamente perpendicolare alla superficie dell'acqua, che ha la stessa figura colla terra. Le acque del mare sono sempre state necessariamente disposte perpendicolarmente alla direzione della gravità; perchè se in qualche momento non lo fossero state, sarebbero scorse verso quella parte, a cui tendeva la gravità, per mettersi in equilibrio, il quale non può darsi se non nel caso della gravità esattamente perpendicolare alla superficie dell'acqua, senza alcuna azione laterale.

810. Dunque il filo a piombo, che nota la linea verticale, è perpendicolare alla superficie della terra; e se un osservatore in P (fig. 101) per

per es. a Parigi, vede una stella come la Chiara di Perseo, che passando per il meridiano, passa anche per il zenit, la vedrà sulla linea BPZ, perpendicolare alla superficie terrestre, che non va al centro C se non quando fosse perfettamente sferica. Un altro osservatore in A, per es. in Amiens, vede la stella sulla AS parallela a PZ per la gran distanza delle stelle; ed essa gli comparirà discosta dalla verticale XAB quanto è l'angolo SAX. Se trovisi esattamente che la Chiara di Perseo passa in distanza d'un grado dal zenit d'Amiens, ne seguirebbe, che l'angolo SAX sarebbe d'un grado, e d'un grado pure l'angolo PBA ch'è uguale ad SAX; e si direbbe che l'arco terrestre PA è d'un grado; da cui ne nasce la definizione che segue.

811. Il grado della sferoide terrestre (qualunque siane la figura) è uguale allo spazio che si deve camminare sulla terra, finchè la verticale cangi d'un grado. Così li gradi restano misurati dagli angoli, che hanno il loro vertice non nel centro C della terra, ma dove concorrono le verticali ZPB, XAB perpendicolari alla superficie.

812. Da questa definizione segue, che i gradi devono essere maggiori dove la terra è più compressa. E infatti quanto è più convesso un arco PA (fig. 102) tanto sarà più corto restando l'angolo F sempre d'un grado. Così posta DG parallela alla AF, l'arco PD più convesso di PA è minore di esso PA, quantunque abbia la stessa amplitudine, cioè d'un grado PGD, eguale a PFA. Nell'ellissi e nelle curve ad essa simili, la curvatura è maggiore all'estremità dell'asse maggiore, e minore a quelle del minore; se dunque la terra è schiacciata ai poli, il grado conterrà maggior numero di pertiche quanto più sarà vicino ai poli stessi.

813. Per decidere sulla figura della terra, l'Accademia d'ordine del Re nel 1683 continuò la meridiana da Parigi al nord e al sud, dall'Oceano fino al mediterraneo. Il Sig. Cassini unito ai Signori Sedileau, Chazelles, Varin, Deshaies e Pernin s'invì al sud; il Sig. de la Hire con i Sigg. Potenot e le Fevre al nord, e si avanzavano nel loro lavoro, quando all'improvviso restò interrotto per la morte del gran Colbert accaduta li 6 Settembre 1683.

814. Non fu ricominciato questo lavoro se non nel 1700, ma sulla diversità dei gradi s'ebbe a disputare fino al 1733, perchè non s'estendevano oltre i limiti della Francia, onde la differenza degli stessi era piccolissima. Il Sig. de la Condamine espone, che si levarebbe ogni difficoltà misurandosi un grado presso l'equatore, e si esibì lui stesso per misurarlo. Il Sig. Godin nel 1734 mostrò i vantaggi, che si trarrebbero da questo viaggio all'equatore; ed esso pure si esibì d'andarvi col Sig. de Fouchy. Il Sig. de Maurepas Ministro di Stato l'espone al Re, e i Signori Godin, de la Condamine, Bouguer, infatti partirono nel Maggio del 1735. Dopo la partenza dei quali il Sig. de Maupertuis mostrò allo stesso Ministro che tale disuguaglianza dei gradi, e la figura perciò della terra sarebbe decisa; più sicuramente misurandone uno al nord nella maggiore distanza che si potesse dall'equatore; e per ordine del Re nel

1736 partirono per la Svezia esso Sig. de Maupertuis , Clairaut ec. e giunsero a Torneo sul fine dell' Inverno .

815. E nell' anno seguente 1737 il dì 13 Novembre il Sig. de Maupertuis nell' Assemblée publica dell' Accademia lesse la relazione e il risultato del suo viaggio e la pubblicò poi nel suo Libro *Figure de la Terre* ec. da cui si vede che trovò il grado del meridiano che taglia il cerchio polare di toese 57422, maggiore cioè del grado di Parigi di toese 353. Dal che restò dimostrato lo schiacciamento della terra ai poli.

816. L' impresa al Perù non fu finita per le grandi difficoltà incontrate che nel 1747. Trovarono il primo grado del meridiano di toese 56750 (*Mesure de 3. prem. degrés du merid. dans l' hémisphère Austral* ec. par M. de la Condamine). Onde si confermò di nuovo la diminuzione de' gradi verso l' equatore, e la compressione della terra verso i poli; come era dimostrata dalla diminuzione del pendulo (805), e dalla figura di giove . Ella è parimenti una conseguenza del moto diurno della terra, e della forza centrifuga (1010).

817. Nevvton , e dopo lui Maclaurin e Clairaut nella Teoria della fig. della terra, dimostrarono , che, supposta la terra omogenea e fluida, dovea essere ellittica , e compressa di $\frac{1}{250}$; la differenza dei gradi ora descritti è più considerabile ; ma molti altri gradi misurati in Allemagna , in Italia , al Capo di B. Speranza e in America , mostrano , che la compressione non è infatti più considerabile , anzi forse minore , e il Sig. Boscovich non la trova che di $\frac{1}{311}$, volendo conciliare insieme i diversi gradi , secondo le regole di probabilità .

818. Posta la terra ellittica , e noti due gradi di qualunque latitudine , si può trovarne la compressione . Se i due gradi si suppongano N ed M , e i seni delle latitudini geografiche verso il mezzo di essi gradi s e r , la compressione sarà espressa dalla frazione $\frac{N-M}{3M(ss-rr)}$ (*Mem. Acad. 1735*). Se il grado M sia misurato sotto l' equatore , sarà $r = 0$, ed $\frac{N-M}{3Mss}$ la compressione che si cerca . Questa espressione mostra che nell' ipotesi della terra ellittica gli accrescimenti de' gradi sono io circa come i quadrati dei seni di latitudine , perchè $N-M$ è proporzionale ad ss , giacchè la frazione $\frac{N-M}{3Mss}$ è costante .

Se presosi uno dei gradi M sotto l' equatore , l' altro N trovissi esattamente al polo , sarà la compressione $\frac{N-M}{3M}$; così la differenza degli assi della terra non è se non la terza parte di quella dei gradi ; per esempio se i due gradi estremi hanno per differenza $\frac{1}{77}$, la differenza fra i diametri sarà $\frac{1}{231}$.

819. Sostituendo in questa formola i gradi misurati in Francia e al Perù , il Sig. de la Condamine trova la compressione della terra di $\frac{1}{304}$. Ma sostituendovi il grado del nord , e quello del Perù la trova di $\frac{1}{210}$. Questa differenza ci fa credere , che la terra non è d' una figura ellittica regolare ; o pure che nella misura de' gradi v' è corso qual-

qualche errore, o che v'ha qualche altra causa, senza di cui avrebbesi lo stesso grado di compressione, per via di quelli due diversi paragoni; il Sig. Boscovich conclude, che il grado del nord è un po' troppo grande.

820. Trovato che si abbia il grado di compressione, è facile di calcolare l'angolo della verticale col raggio della terra in qualunque latitudine. Supponiamo il semiasse minore CP (fig. 101) $= 1$, il maggiore $= 1 + \beta$, la lettera β esprime la frazione della compressione; il quadrato di $1 + \beta$ sarà $1 + 2\beta$, perchè si può trascurare β^2 per la piccolezza di β ; sia l'ascissa $CM = x$, sarà la subnormale $MK = \frac{1}{1+2\beta}$ per la proprietà dell'ellisse $= x(1 - 2\beta)$ trascurando similmente i termini seguenti; dunque $CK = 2\beta x = 2\beta \cos. lat.$ La piccola perpendicolare KD calata sopra $CO = CK. \text{sen. } KCD = CK \text{ sen. latit.} = 2\beta \cosen. latit. \text{ sen. latit.} = \beta \text{ sen. } 2 \text{ latit.}$ e il seno dell'angolo $KOD = \frac{DK}{DO}$, o $\frac{DK}{CO} = \beta \text{ sen. } 2 \text{ latit.}$ Noi supponiamo OD sensibilmente eguale al semiasse minore, perchè non ne è diverso che d'una quantità insensibile alla formula. Quindi è che si può calcolare la seconda colonna della Tavola seguente, o gli angoli COK formati dal raggio CO , e dalla verticale OK , perpendicolare alla superficie, supposta la compressione di $\frac{1}{330}$.

821. Cogli stessi principi dell'ipotesi della terra ellittica si dimostra che gli eccessi dei raggi della terra sopra l'asse minore sono come i quadrati dei seni di latitudine; per esemp. che OA (fig. 100) $: KM$, come il quadrato del raggio al quadrato del seno dell'arco EL , supposta sempre piccolissima la differenza dei gradi. E in fatti per la proprietà dell'ellissi $OA : KL :: CA : BL$, o pure $\beta : KL :: 1 : \text{sen. latit.}$ Dunque $KL = \beta \text{ sen. latit.}$; ma per li triangoli simili BKC , MKL , si ha $KL : KM :: CK : BK$, o pure $\beta \text{ sen. latit.} : KM :: 1 : \text{sen. latit.}$; dunque $KM = \beta \text{ sen. latit.}$, cioè la differenza fra il raggio dell'equatore e il raggio CK d'una data latitudine, è uguale alla compressione moltiplicata nel quadrato del seno della latitudine. E su questo principio sono stati calcolati i numeri dell'aggiunta Tavola, che sono gli accrescimenti della parallasse della luna in diverse latitudini, dipendenti dalla diversità dei raggi CE , CP . Così la parallasse orizzontale della luna sotto il polo, che ha per base CP , supponendoci di $60' 0''$, o di $3600''$, si vede da questa Tavola, che a 50° di latitudine bisogna aggiungerci $6'' \frac{1}{2}$ per avere la parallasse corrispondente al raggio CG di questa data latitudine; e l'angolo della verticale col raggio della terra in questa stessa latitudine è di $14' 44''$. Si adopera questo angolo per correggere le distanze dal zenit osservate, e per ridurle al centro della terra.

Latit.	Angoli della vertic.	accrescimen. della paral.
0°	0' 0"	15" 8
10	5' 6"	15" 3
20	9' 36"	13" 0
30	13' 58"	11" 8
40	18' 44"	9" 3
45	19' 52"	8" 7
48	19' 58"	8" 3
49	19' 58"	7" 6
48	19' 58"	7" 0
50	19' 44"	6" 5
55	14' 4	5" 3
60	12' 58"	4" 0
65	11' 26"	3" 8
70	9' 36"	1" 9
80	5' 6"	0" 5
90	0' 0"	0" 0

822. Negli accrescimenti dei gradi dall'equatore al polo si sono scorte alcune irregolarità procedenti piuttosto da circostanze locali, che da irregolarità nella terra: il grado per es. misurato in Italia è minore, e il grado al Capo maggiore che non dovrebbero essere secondo la legge stabilita dei tre gradi sotto l'equatore, in Francia e sotto il cerchio polare; ma una parte di tale differenza può essere prodotta dall'attrazione laterale delle montagne sopra il filo a piombo. Secondo le osservazioni esatte degli Sigg. Bouguer e de la Condamine nel 1737 al Perù presso il monte Chimboraco, il filo a piombo era sviato per 8" dalla gran mole

le di questo monte. Simili effetti si sono visti sui pirenei, sulle alpi e nell'apennino.

823. Posta la figura della terra ellittica, un diametro della quale sia di toese 6562024, (migl. 6850) o leghe 2874 $\frac{2}{3}$, e l'altro di toese 6525376, (migl. 6811 $\frac{1}{2}$) o leghe 2858 $\frac{2}{3}$, il suo volume o solidità sarà di leghe cubiche 12366044000, la superficie di leghe quadrate 25858089; dal che facilmente si trova la superficie di ciascheduna zona (139).

Per dare un'idea della massa o del peso totale della terra, supponiamola interiormente composta d'una materia appresso a poco analoga alla argilla, un di cui piede cubico pesa circa 140 libbre; una toesa cubica peserà 30240 libbre, una lega cubica 359775200000000, e il peso di tutta la terra sarà di libbre 4448994000000000000000000. Se si volesse sapere il numero dei granelli di sabbia contenuti in questa massa, supponendo il diametro di ciascheduno di $\frac{1}{20}$ di linea, si troverebbe il numero di essi 7591212000000000000000000000000.

824. L'abbassamento del livello vero rispetto all'apparente è l'effetto il più noto della curvatura terrestre. Se AH (fig. 92) è l'orizzontale, e siavi in distanza di AO un monte OH, dal punto A non si vedrà se non il vertice H del monte sulla orizzontale AH, ed OH è l'abbassamento del livello vero O rispetto al livello apparente H. E' facile di calcolare OH, o CH, poichè è noto il raggio della terra CA, e l'arco AO, cioè l'angolo ACO. Questa curvatura OH in 1050 toese è d'un piede, o pure più facilmente per ricordarselo, d'un braccio per una lega (piedi 3, poll. 8 per 2000 toese) ma ella s'accresce come i quadrati delle distanze (988); dunque per 4000 toese ella è di piedi 14, poll. 8. E questo è ciò che determina la distanza dell'orizzonte sensibile (13) almeno sul mare aperto; perchè se l'osservatore è in H, la linea HA va a toccare il mare sul confine dell'orizzonte sensibile; e si cangia in ragione dell'altezza OH.



LIBRO NONO.

Dei satelliti di giove e di saturno.

I satelliti di giove sono quattro piccoli pianeti , che li girano intorno , come lo mostrammo nella fig. 42. Galileo li chiamò *Mediceæ sydera* ; *Evelio circulatores jovis* , *jovis comites* ; di essi se ne servono continuamente gli astronomi per determinare le differenze di longitudine in diversi paesi della terra (54) ; per il che era molto importante d' avere una teoria sicura dei loro moti , per cui molti astronomi grandemente s' affaticarono.

825. Furono essi scoperti da Galileo li 7 Gennaio 1610 , poco dopo la scoperta dei telescopi ; Simone Mario pretende d' averli veduti nel Novembre precedente . Gassendo attesta nella vita del Sig. de Peiresc , che il medesimo fu uno dei primi dopo Galileo e il P. Reineri , che unitamente col Morino lavorò per ridurre in Tavole i moti dei satelliti . Ma tavole alquanto esatte non si ebbero che nel 1668 , e queste del Sig. Cassini . Quelle che oggi adoperiamo per l' eclissi degli stessi satelliti sono del Sig. Wargentin ; egli ne avea data la prima edizione nelle Mem. di Upsal nel 1746 , e le nuove di lui tavole le ho pubblicate nella mia *Astronomia* .

826. La prima cosa da farsi per costruire queste tavole , è di determinare i tempi delle rivoluzioni ; il che si potrebbe ottenere coll' osservare molte volte il momento , in cui ciaschedun satellite si trova in congiunzione visto dalla terra , purchè sia la stessa con quella che si vedrebbe dal sole ; bisogna dunque scegliere quelle congiunzioni , che succedono , quando giove è in opposizione ; perchè allora se il satellite passa sopra o sotto al disco di giove , il momento in cui corrisponde al centro di giove , è quello stesso della congiunzione tanto per il sole quanto per la terra . Le quali congiunzioni viste dal sole si ottengono più facilmente coll' eclissi ; perchè quando un satellite si trova in mezzo all' ombra di giove , è chiaro essere il satellite in congiunzione con giove , poichè si trova sulla stessa linea condotta dal sole a giove . L' intervallo da una eclisse all' altra sarà la durata d' una *rivoluzione sinodica* (557) ; cioè d' una rivoluzione rispetto al sole : e queste sono le sole rivoluzioni , delle quali quasi unicamente si fa uso . Per compensar meglio le disuguaglianze dei satelliti , quelle di giove e gli errori inevitabili nelle osservazioni , si sogliono paragonare fra loro congiunzioni lontanissime una dall' altra ; queste rivoluzioni calcolate colla maggior attenzione si troveranno all' art. 860 , quali il Sig. Wargentin le ha dedotte dalle più recenti osservazioni .

827. La *rivoluzione periodica* è il ritorno d' un satellite allo stesso punto della sua orbita , o allo stesso punto di Cielo visto da giove , dopo percorsi 360° ; questa è un po più breve della sinodica , com' è chiaro . Noi non parleremo che delle sinodiche , le sole che si possono osservare immediatamente e dalle quali dipendono le eclissi , sola cosa , che oggi

fi noti. Nonostante si troveranno nella tavola degli elementi (860) le rivoluzioni periodiche dei quattro satelliti rispetto agli equinozi; per cavare le rivoluzioni periodiche dalle sinodiche osservate, si adoprerà quest'analogia; 360° , più il moto di giovè durante una rivoluzione sinodica, sono alla durata di questa rivoluzione sinodica osservata, come soli 360° alla durata della periodica.

828. Note le rivoluzioni dei satelliti, bisogna anche conoscere le loro distanze dal centro di giovè, misurandole quando sono nella maggior loro elongazione con un micrometro; basta anche di conoscere la distanza d'un solo, perchè le altre facilmente si calcolano, per la ragione costante fra i quadrati dei tempi ed i cubi delle distanze (830).

Così si trovarono le distanze, o elongazioni, quali le ho descritte nella tavola (860). Quella del quarto satellite fu trovata dal Sig. Pound di 8' 16" con un micrometro applicato a un telescopio di 15 piedi; e quella del terzo di 4' 43" con un telescopio di 123 piedi. Le due altre sono state calcolate e trovate di 2' 56' 47", ed 1' 51" 6" (Nevvton Lib. III.)

Esse distanze si esprimono in semidiametri di giovè e centesime, il che riesce più comodo. Nella Tavola (860) si troveranno quali furono determinate dal Cassini; per es: la distanza del primo satellite è di 3, 67, cioè 3 semid. di giovè e 67 centesime, o due terzi. Da queste se ne conchiuderebbero facilmente le reali, perchè il semidiametro di giovè è undici volte circa maggiore del terrestre. Basterebbe dunque di moltiplicare le distanze date in semid. di giovè per 11, per averle in terrestri, o per 16132 per averle in leghe.

829. Il diametro di giovè visto dal centro del sole nelle sue medie distanze dal sole, o dalla terra nelle distanze sue medie dalla terra è di $37^\circ \frac{1}{4}$, e perciò il semidiametro $18^\circ \frac{1}{8}$. Moltiplicando questa quantità

per le distanze espresse in semidiametri di giovè, si averanno queste stesse distanze in minuti e secondi, quali si osservano nelle distanze medie di giovè dalla terra; ma possono accrescersi o diminuirsi d'un quinto per causa della distanza di giovè maggiore o minore dalla terra. Le distanze dei satelliti in min. e sec. possono servire per paragonare queste distanze stesse con quelle dei pianeti dal sole; vogliasi per esempio prendere la distanza di venere dal sole per unità, o scala comune, e cerchisi la distanza del quarto satellite dal centro di giovè, si sarà quest' analogia: la distanza di venere dal sole 723 (450) a quella di giovè, come 1 a 7, 1903, distanza di giovè dal sole; poi si dirà il raggio è al seno di 8' 16", elongazione del satellite, come 7, 1903 a 0, 01729 distanza del satellite espressa in parti di quella di venere: in questo modo ne faremo uso all'art. 1020.

830. Paragonando le distanze dei satelliti colle rivoluzioni loro periodiche, vi si vedrà ben presto la legge di Keplero (469), come nei pianeti. In fatti presi i quadrati di giorni 18^h 28' e di giorni 26 16^h 32", o più esattamente i tempi periodici del primo e quarto satellite rispetto
alle

alle file, e presi parimenti li cubi delle loro distanze 5, 67; e 25, 30 si averanno (ritenute le prime sole cifre) i numeri 6642, 5775, 1820, 1619, che sono veramente in proporzione.

831. Se si aggiungano successivamente le rivoluzioni dei satelliti, fino a tanto che formino de' numeri simili, si trovano in circa i seguenti periodi

247	rivoluzioni del I	danno giorni	437	3 ^h 44'
123	— — — del II	— — —	437	3 42
61	— — — del III	— — —	437	3 36
26	— — — del IV	— — —	435	24 26

832. Così dopo lo spazio di giorni 437, li tre primi satelliti, ritornano alla medesima situazione fra loro, dentro un errore di 8'. Questo periodo ci servirà quando parleremo delle reciproche attrazioni de' satelliti (845), e delle disuguaglianze che ne nascono, specialmente nei tre primi.

Ineguaglianze de' satelliti.

833. La massima ineguaglianza nella rivoluzione dei satelliti rispetto al disco di giovè è quella che nasce dalla parallasse annua (441); sia S il sole (fig. 103), I il centro di giovè, B un satellite in congiunzione sulla linea dei centri, o sull'asse dell'ombra, T il luogo della terra, TIG il raggio condotto dalla terra per il centro di giovè, l'angolo TIS eguale all'angolo BIG, è la parallasse annua di giovè, che può crescere fino ai 12°, e allora bisogna che il satellite cammini da B in G, e percorra 12° della sua orbita, per mostrarsi a noi in congiunzione sulla linea TIG, quantunque la vera sua congiunzione sia seguita in B; questi 12° fanno 14 25' per il primo satellite; 2^h 50', 5^h 44', e 13^h 24' per gli altri. Ma non si scorge questa ineguaglianza nei satelliti, quando si fa uso delle eclissi, per conoscere la rivoluzione.

834. Passiamo alle ineguaglianze rispetto alla linea de' centri SIB, e che alterano il ritorno dei satelliti alle loro congiunzioni, e gl'intervalli delle eclissi. Nel cercare i periodi (826), abbiamo supposto preso un intervallo di tempo assai lontano, affinchè le ineguaglianze si potessero compensare; se nella ricerca delle rivoluzioni e de' moti medj non si prende se non che l'intervallo d'una sola rivoluzione del satellite, il risultato sarebbe involto nelle ineguaglianze di giovè, e con quelle del satellite; ma se si paragonano insieme delle osservazioni lontane quanto è uno, o molti periodi di giovè, cioè 12 anni, 24 ec. si avrà esattamente il moto medio, non considerata l'ineguaglianza dei ritorni. Queste equazioni poi si conoscono col paragonare insieme gl'intervalli particolari delle eclissi, intervalli, che non si diversificano se non in ragione delle ineguaglianze, delle quali trattiamo.

835. La massima ineguaglianza nel ritorno delle congiunzioni e delle
ec-

ecclissi nasce dall' ineguaglianza nel moto di giovè ; perchè la differenza fra il ritorno d' una congiunzione e una rivoluzione periodica completa del satellite dipende dal moto di giovè visto dal sole , in quello spazio di tempo , o per quell' arco , che il satellite ha da percorrere per tornare alla sua congiunzione col sole ; per l' irregolarità di tal moto soltanto l' ecclissi non ritornano dentro spazj eguali di tempo . L' intervallo fra due ecclissi è uguale a una rivoluzione del satellite , più il tempo che spende a raggiungere l' ombra di giovè che si è avanzata , quanto lo stesso giovè , ma inegualmente ; dovendosi poi l' equazione di giovè di $5^{\circ} 34'$ ora aggiungere , ora sottrarre ; la somma di tutti i piccoli intervalli , dei quali ciascheduna rivoluzione sinodica eccede ciascheduna periodica , può produrre una differenza di 11° fra due osservazioni .

836. Sia ABP (*fig. 104*) l' orbita di giovè , S il sole , F il foco superiore dell' ellisse , intorno a cui il moto di giovè è sensibilmente uniforme (495) ; suppongasì un satellite , che dentro un periodo di giovè compisca un numero intero di rivoluzioni periodiche ; e che giovè sia giunto alla quarta parte della sua rivoluzione , cioè che l' angolo AFB , che esprime l' anomalia media , sia di 90° ; il satellite parimenti dovrà aver percorso la quarta parte delle sue rivoluzioni periodiche , che può compiere dentro un periodo di giovè , e sarà giunto al punto H che corrisponde in cielo allo stesso punto con il luogo medio di giovè ; ma il satellite arriverà in K , in congiunzione cioè con giovè , e ne rimarrà ecclissato , molto prima d' essere arrivato in H ; la differenza KH è misura dell' angolo KBH eguale all' angolo FBS , ch' è l' equazione del centro di giovè , cioè $5^{\circ} 34'$; il primo satellite consuma $0^h 39' 22''$ a percorrere $5^{\circ} 34'$ della sua orbita ; dunque l' ecclissi che si osservano dovranno a capo di tre anni anticipare di $39' 22''$; e sei mesi dopo , quando giovè sarà nella parte opposta della sua orbita , ritarderanno dello stesso tempo .

837. Per avere la quantità di questa equazione in ciascuna orbita de' satelliti , si farà quest' analogia : 360° sono alla rivoluzione sinodica , come $5^{\circ} 34' 1''$ a un quarto , che si troverà $39' 22''$; $1^h 19' 13''$; $2^h 39' 42''$; e $6^h 12' 39''$. Questo è il fondamento della massima disuguaglianza nelle congiunzioni ed ecclissi dei satelliti .

L' ineguaglianza che dipende dalla eccentricità di giovè , e che finora ho spiegata , fu la prima dal Cassini impiegata nelle sue Tavole per il calcolo delle ecclissi ; ma egli tosto s' accorse , che non era essa sufficiente a spiegare tutte le differenze che si osservano fra i ritorni di queste ecclissi . Adoperò sul principio nelle sue effemeridi certe equazioni empiriche , cioè indicategli dalle osservazioni , senza vederne le leggi e i principj ; e noi ne adoperiamo ancora di simili (846) .

838. La prima ineguaglianza , di cui si conosce la vera causa , è quella che nasce dalla successiva propagazione della luce . Sia S (*fig. 104*) il sole , ABP l' orbita di giovè , TVR l' orbita della terra , il di cui diametro TR eguaglia 69 milioni di leghe ; la luce , che ci riflette giovè , è un corpo , la di cui impressione deve giungerci all' occhio , per far-

farsi vedere giove, e i satelliti; e giacchè la di lui velocità non può essere infinita, spende qualche tempo per arrivare da T in R; così quando la terra è in T, e giove in opposizione, la di lui luce ci giunge più presto, che quando la terra è in R, e giove vicino alla congiunzione; e infatti si osserva che l'eclissi dei satelliti nascono un quarto d'ora circa più tardi posta la terra in R, che posta in T.

839. Leggiamo nella Storia dell' Academ. che il Cassini li 22 Agosto 1675 pubblicò un piccolo scritto, in cui prenunziava le configurazioni de' satelliti, e in cui parlava sulla successiva propagazione della luce, su di cui Romero lesse la sua dissertazione all' Accademia li 22 Novembre seguente, ed ecco le parole del Cassini.

Il Sig. Romero spiegò molto ingegnosamente una di queste ineguaglianze da lui per molti anni osservate nel primo satellite, per mezzo della successiva propagazione della luce, che impiega maggior tempo ad arrivare da giove in terra quando è più lontano, che quando è più vicino; ma non esaminò se questo stesso si otterrebbe negli altri satelliti: mi è spesso accaduto, che avendo piantate l'epoche dei satelliti nelle opposizioni del sole, nelle quali le ineguaglianze sinodiche doveano cessare, e avendole paragonate fra loro per avere il moto medio, quando calcolavo sopra quest' epoche e sopra questo moto medio l'eclissi successe in vicinanza dell' una e l'altra quadratura di giove col sole, il moto medio calcolato al tempo di queste quadrature, l'ho trovato diverso d'un grado intero e un po più dal moto vero trovato immediatamente colle osservazioni; in guisa che nei satelliti nelle quadrature v'era un grado incirca d'equazione da sottrarsi, rispetto al moto stabilito nelle opposizioni; dal che si poteva concludere che tale equazione sarebbe doppia nelle congiunzioni.

840. Questa Ineguaglianza era specialmente sensibile nel primo satellite; ma colla scoperta dell'aberrazione (782) avendosi dimostrata invincibilmente la successiva propagazione della luce, s'è visto chiaramente, che questa equazione dovea essere comune ai 4 satelliti. Il Sig. Maraldi nel 1741 osservò, che le Tavole del terzo satellite s'erano molto avvicinate coll'osservazione per mezzo di questa equazione, e il Sig. Wargentin nel 1746 si è assicurato di tale equazione della luce col paragone di molte osservazioni.

841. La velocità della luce, con cui ci arriva dal sole è tale, che la terra nello stesso tempo percorre nella sua orbita un arco di 20' (787); ma lo percorre in $8' 7'' \frac{1}{3}$ di tempo incirca, dunque la luce per giungere dal sole in terra spende 8' di tempo. Posta la terra in R, e giove in A in congiunzione col sole, la luce impiegherà 16' 15" di più per giungere fino a noi, che quando la terra è in T e giove in A opposto al sole. E così l'eclissi dei satelliti succederanno 16' 15" più tardi nelle congiunzioni, che nelle opposizioni, e a proporzione negli altri siti; questo si è l'oggetto dell'equazione principale della luce.

842. Abbiamo finora supposto giove nelle sue medie distanze; ma alle volte per causa della eccentricità della sua orbita, si trova più o meno lon-

lontano dal sole, e la differenza è qualche volta eguale alla metà di SR; in guisa che quando giove in congiunzione o in opposizione si trova anche in afelio, v' hanno 4' 5" di più che quando in perielio; questa piccola equazione della luce dipende dall'anomalia di giove.

843. La grande equazione prodotta dall'eccentricità di giove (835), e le due della luce producono delle disuguaglianze; in tutti i satelliti; ognuno per altro ha delle equazioni sue particolari, dedotte dalle osservazioni: se ne sono determinate le quantità, dentro alcuni minuti, senza saperne la causa a perfezione, e ciascheduna di queste equazioni empiriche si applica a ciascheduno dei satelliti; cioè $3'\frac{1}{2}$ al primo, $16'\frac{1}{2}$ al secondo, 8' al terzo, e 1^h 0' al quarto.

844. La maniera di determinare queste equazioni particolari di ciaschedun satellite consiste unicamente nel paragonare molte osservazioni col calcolo delle Tavole, per cui s'impiegarono le ineguaglianze precedenti; perchè in questo caso la differenza fra il calcolo e l'osservazione forma l'equazione che si cerca; ripetuto che si abbia questo paragone per molte volte, si può formare una Tavola della ineguaglianza, e notarne il periodo.

845. L'equazione del primo satellite tanto in più che in meno è di $3' 30''$ di tempo, che corrisponde a un mezzo grado dell'orbita. Il Sig. Bradley nel 1719 s'avvide che negli anni 1682, 1695, e 1718, cioè in ogni corso circa di 12 anni le eclissi del primo satellite duravano incirca $2^h 10'$, mentre nell'altro nodo nel 1677 e 1689 duravano soltanto $2^h 14'$; sembrava che questa differenza provasse che nel primo caso il moto del satellite fosse più lento, e si trovasse perciò il satellite stesso in maggior distanza da giove, il che indicava una eccentricità nella sua orbita; nonostante il Bradley riguardava l'attrazione dei satelliti come la principale cagione di questa ineguaglianza, e ne indicò il periodo di 437 giorni (Ppbilof. transf. 1726). Il Sig. Wargentini determinò per via d'osservazioni la legge e la quantità di questa equazione del primo satellite, e la inserì nelle sue prime tavole pubblicate nel 1746; il che contribuì a renderle esattissime.

Dopo questo tempo si vide, che tutte le ineguaglianze sensibili del primo satellite doveano ripetersi dall'azione del secondo, ma che la più considerabile di tutte è infatti di $3'\frac{1}{2}$ di tempo, come trovò il Sig. Wargentini con un periodo di 437 giorni.

846. Il secondo satellite è soggetto più di tutti a grandi ineguaglianze; l'eccentricità della sua orbita ne può aver qualche parte; nonostante la sola equazione di $16'\frac{1}{2}$, il di cui periodo è di 437 giorni e ore 20, e che sembra dipendere dall'attrazione del primo e terzo satellite, s'avvicina molto all'osservazione. Primo fu il Sig. Bradley a indicare questo periodo di 437 giorni, assicurando, che con esso si trovavano gli errori delle Tavole, che ritornavano appresso a poco allo stesso ordine. Aggiun-

giunge per altro, che secondo le ultime osservazioni v'era indicata ancora qualche eccentricità in quest'orbita.

Le inequaglianze del terzo satellite sono le meno note; sembra esservene una dipendente dalla sua eccentricità, e altre dall'attrazione del primo, secondo e quarto; tutte queste rendono 8' di tempo in più e in meno: ma si dividono in molte equazioni, i periodi delle quali sono di giorni 437, di anni $12 \frac{1}{3}$ e di 14 per accordarle colle osservazioni.

L'inequaglianza del quarto satellite, che arriva fino a un' ora, dipende soltanto dalla eccentricità dell'orbita; nè le attrazioni degli altri vi sono sensibili.

L'Accademia avendo proposto, per mio consiglio, questa materia per soggetto del premio del 1766, il Sig. de la Grange presentò una memoria interessante riguardo all'effetto di tutte queste attrazioni, che si pubblicherà quanto prima nel IX volume dei discorsi coronati dall'Accademia.

847. Le eclissi dei satelliti sono sì importanti per la geografia, che stimo necessario svilupparne le principali circostanze. La prima cosa necessaria a sapersi è il *diametro dell'ombra di giovè* in tempo, o sia il tempo che impiega ciascun satellite a traversare l'ombra di giovè, quando vi passa per il centro.

La metà di questo tempo, o il semidiametro dell'ombra si vede nell'annessa Tavoletta.

1	1 ^h	7'	55"
2	1	25	40
3	1	47	0
4	2	23	0

848. Se l'orbita dei satelliti si trovassero sempre nel piano dell'orbita di giovè intorno al sole, ciaschedun satellite in ciascuna sua rivoluzione resterebbe eclissato, e la metà della durata in ogni eclisse sarebbe la scritta sopra nella tavola; ma essa non è sempre uguale; nel terzo satellite ella è alcune volte di 1^h 17', alcune di 3^h 34'. Parimenti il quarto satellite in certi tempi s'eclissava in ogni sua rivoluzione, ma dopo alcuni anni non così. Dal che si giudicò che le loro orbite non sono nel piano di quella di giovè, e le loro inclinazioni si trovano soltanto per mezzo delle differenze del tempo impiegato nella durata dell'eclissi.

849. Bisogna qui spiegare, come l'inclinazione* dell'orbita cagioni la disuguaglianza nella durata dell'eclissi, e con qual legge si compisca questa durata. Quando un satellite traversa il cono ombroso passando per il centro, egli si trova esattamente sulla linea che unisce i centri di giovè e del sole; così si trova nella sezione comune della sua orbita con quella di giovè, perchè nello stesso tempo si trova e nel piano della sua orbita (da cui mai non si diparte) e in quello dell'orbita di giovè, poichè la linea condotta dal sole e da giovè si trova sempre nel piano di questa orbita di giovè; dunque trovandosi anche giovè nella stessa comun sezione, si può dire che giovè è nel nodo del suo satellite; così quando giovè si trova in quel grado di longitudine, a cui corrisponde il

G g

nodo

nodo dell'orbita d'un satellite (visto dal centro di giovè), il satellite traversa il centro dell'ombra, e la durata dell'eclisse è la massima.

850. Sia SO (fig. 205.) la linea dei nodi, o la linea sulla quale era giovè, quando il piano dell'orbita del satellite era diretto verso il sole, e i satelliti traversavano il centro dell'ombra. Supponiamo che giovè sia si avanzato da O in I con l'orbita intorno a se del satellite, questa orbita sarà sempre paralella a se stessa, poichè non v'è cosa che la disturbi, e la linea dei nodi sarà nella direzione ACN paralella alla SO. Così quando giovè s'allontana dal nodo, la linea dell'ombra non resta più nella comun sezione delle orbite di giovè e del satellite; dunque trovandosi il satellite in opposizione al punto M, non sarà nel piano dell'orbita di giovè, nè sulla linea dei centri, ma sopra o sotto.

851. Quando giovè si trova nel nodo di qualche suo satellite, un osservatore supposto nel sole si trova nel piano dell'orbita del satellite, e la vede in guisa di linea retta; e perchè seguisse a vederla sempre retta, bisognerebbe ch'ella passasse sempre per il di lui occhio, che la comun sezione o linea dei nodi passasse sempre per il sole; per il che bisognerebbe ch'ella facesse il giro del cielo in dodici anni come giovè, il che non si dà: la linea dei nodi è quasi fissa in cielo, cioè paralella a se stessa, e se una volta giovè vi passa, non vi ripasserà che dopo sei anni.

852. Sia dunque NCIA la linea dei nodi, ABCD l'orbita del satellite; che traversa il piano di quella di giovè in A e in C; bisogna immaginarsi che verso il punto B l'orbita del satellite s'innalza sopra il piano della figura, e si trova alquanto verso il nord; al contrario in D s'abbassa verso il sud; da A in B il satellite va sempre alzandosi sopra il piano dell'orbita di giovè, da B fino in C accostandosi allo stesso, da C in D si scosta verso il sud, e vi si accosta di nuovo da D fino in A. Essendo B il limite, il punto della massima latitudine, il satellite giunto che sarà in M nella sua congiunzione superiore, s'eclisserà, ma non sarà per anco nella massima sua latitudine, e farà tanto meno lontano, dal piano della orbita di giovè, quanto sarà minore l'angolo AIM, o l'eguale SIN. Ma SIN, che è la distanza del satellite dal suo nodo, è uguale all'angolo ISO, cioè alla distanza fra il luogo I di giovè e la linea SO supposta fissa, cui è sempre paralella la linea IN dei nodi, qualunque sia il luogo di giovè; dunque la latitudine del satellite in M dipenderà dall'arco AM o dall'angolo ISO, distanza di giovè dalla linea dei nodi SO, che corrisponde sempre verso il mezzo dell'undecimo grado di longitudine.

853. La quantità d'elevazione del punto M sopra il piano dell'orbita di giovè sta all'allontanamento del limite B, come il seno di AM al seno dell'arco AB, cioè al raggio; perchè se due cerchj si tagliano in A e in C, la loro distanza in diversi punti, come M, perpendicolarmente al cerchio inclinato, o all'orbita del satellite, è come il seno della distanza dal punto A, cioè della intersezione dei due cerchj (531).
Così

Così la latitudine del satellite in *M* è come il seno della distanza di giove dal nodo del satellite.

854. Quando per il moto di giove nella sua orbita il raggio *SI* diviene perpendicolare alla linea dei nodi *SO*, o *IN*, il punto *M* della congiunzione superiore concorre allora col punto *B* limite della massima latitudine; e in tal caso l'angolo dell'orbita col raggio visuale *SIM* è uguale all'inclinazione del satellite, per esempio 30° , e l'orbita vista dal sole comparisce sotto forma d'ellisse; in cui sta l'asse maggiore al minore, come il raggio al seno di 30° (674), non considerando però il moto di giove durante la rivoluzione del satellite, o pure considerando il satellite soltanto rispetto a giove. Sia *S* il sole (fig. 108), *I* il centro di giove, *IH* il raggio dell'orbita d'un satellite, ch'è in un piano perpendicolare all'orbita di giove, e che è inclinato al raggio solare sotto l'angolo *SIH*; si avrà $IH : KH :: R : \text{sen. HIK}$; dunque $KH = IH \cdot \text{sen. HIK}$, cioè alla elevazione, che sembrerà avere il satellite sopra il piano dell'occhio, quando l'ellisse sarà più allargata. Nelle altre posizioni di giove rispetto al nodo questa quantità si diminuirà come il seno della distanza di giove dal nodo (853); così chiamando *I* la massima latitudine, o l'inclinazione del satellite, *D* la distanza di giove dal nodo del satellite computata sull'orbita di giove, ed *R* la distanza del satellite dal suo pianeta, o il raggio della sua orbita, sarà $R \cdot \text{sen. I} : \text{sen. D}$, la quantità d'elevazione, in cui si vedrà il satellite sopra il piano dell'orbita di giove perpendicolarmente all'orbita del satellite nel punto della congiunzione superiore; nè s'abbisogna d'altro per calcolare l'eclissi.

855. Questa elevazione del satellite sopra il piano dell'orbita di giove è uguale all'abbassamento nel punto opposto; dunque l'ellissi, che sembra descriversi dal satellite è più o meno allargata a misura che giove s'allontana dalla linea dei nodi; quando l'asse minore di questa ellisse diventa più largo del cono ombroso, il satellite passerà sopra l'ombra; come si vede nella fig. 106. e ciò avviene sempre nel quarto satellite due anni in circa dopo il passaggio di giove per li nodi dei satelliti. Quando giove è in distanza di 30° dalla linea de' nodi, l'ellisse (fig. 107) è meno larga, che nel caso precedente, della metà, perchè il seno di 30° è la metà del seno tutto; e in tal caso il satellite passerà per l'ombra ad onta della obliquità della sua orbita.

856. La sezione dell'ombra di giove nella regione del satellite è rappresentata dal cerchio *EDBF* (fig. 109.) che suppongo perpendicolare alla linea dei centri del sole e di giove. Il diametro *QB* è una porzione dell'orbita *CN* di giove; *ED* è porzione dell'orbita del satellite, *N* il nodo o l'intersecazione, *CA* è la perpendicolare calata sull'orbita; e questa è un arco, che visto dal centro di giove rappresenta la latitudine del satellite; il di cui seno farebbe uguale a $\text{sen. I} \cdot \text{sen. D}$ per la proprietà del triangolo sferico rettangolo *CAN*.

857. Quando sia nota *CA* bisogna paragonarla col raggio *CD*, o *CB*, il di cui valore è noto per l'osservazione in secondi di tempo, per-

chè rappresenta il semidiametro dell' ombra (847); cioè la mezza durata dell'eclisse, che è la maggiore di tutte, e ch'è indicata da C B.

Noi esprimeremo anche la distanza del satellite da giovè, o il raggio della di lui orbita, in secondi di tempo, mettendo in luogo di R il tempo impiegato dal satellite a percorrere un arco lungo quanto il raggio della sua orbita, cioè di 57°; perchè non importa, che questa distanza, che si prende per unità, sia espressa in tempo, in gradi, o in semidiametri di giovè, nè importa ancora che il moto di giovè renda più lungo il tempo delli 57°, perchè carcali solamente il rapporto fra la distanza e l'arco percorso durante l'eclisse. Il tempo che corrisponde a un arco di circa 57° si avrà da quest' analogia, come 360° alla rivoluzione sinodica, così 57°, o pure 206263", al tempo cercato, che io dirò t : moltiplicando sen. I. sen. D per questo numero di secondi di tempo, si avrà C A in secondi di tempo = t sen. I. sen. D; così si ha il raggio C D, o C B in sec. di tempo, cioè la mezza durata della maggiore eclisse, che avviene quando giovè è nel nodo del satellite, e questo è finalmente il semidiametro dell'ombra in tempo (847); si cercherà il lato A D parimenti in sec. di tempo, e si avrà la mezza durata dell'eclisse.

858. Così dalla durata dell'eclisse, quando è la più piccola di tutte, si conosce l'inclinazione dell'orbita, e quando maggiore, il luogo del nodo: ma si osserva un fenomeno singolare, che per molto tempo occupò gli astronomi, ed è un cangiamento nelle inclinazioni del secondo e terzo satellite. Nel secondo si cangia dai 2° 48' fino ai 3° 48', e il periodo di tale ineguaglianza è di anni 30. Nel terzo si cangia dai 3° 2' fino ai 3° 26'; sembra che il periodo sia di anni 132, e che l'angolo fosse maggiore nel 1765. Non si aveva alcuna idea della causa di questo fenomeno, quando io nel 1762 mostrai che nelli nodi dei satelliti deve avervi un moto ora diretto e ora retrogrado rispetto all'orbita di giovè per le vicendevoli loro attrazioni, d'onde ne nascerebbe un cangiamento nelle loro inclinazioni (*Mem. Acad.* 1762 p. 233). Parlando dei pianeti si è visto, come il moto de' nodi produca questo cangiamento (527); e questa scoperta ha dato l'ultimo grado di perfezione alla teoria de' satelliti.

859. L'inclinazione del primo satellite si mantiene costantemente di 3° 28' 38", e del quarto di 2° 36' 0". Sembra che nel primo e terzo satellite il nodo non abbia moto alcuno; nel secondo lo ha di 2' 3" all'anno, nel quarto di 4' 19": il qual moto però è soggetto a disuguaglianze simili a quelle dell'inclinazione.

860. *Elementi che servono per la teoria, e per il calcolo dei quattro satelliti di giovè.*

	I.	II.	III.	IV.
<i>Rivol. period.</i>	1 ^d 18 ^h 27' 33"	3 ^d 13 ^h 13' 42"	7 ^d 3 ^h 42' 33"	16 ^d 16 ^h 32' 8"
<i>Rivol. sinod.</i>	1 18 28 36	3 13 17 54	7 3 59 36	16 18 5 7
<i>Dist. in semid.</i>	5,965	9,494	15,141	26,630
<i>Dist. in min. nelle</i>	1' 51"	2' 57"	4' 42"	8' 18"
<i>dist. med. di giovè</i>				
<i>Long. med. giovè-centrica 1700</i>	2° 12' 12" 10"	2° 12' 28" 11"	3° 12' 47" 16"	7° 17' 5' 44"

861. La parallasse annua che ha luogo nei pianeti (441), lo ha parimenti nei satelliti (833); e siccome può arrivare fino ai 12°, quindi ne nascono delle differenze sensibilissime nella situazione apparente che noi veggiamo dalla terra, quando un satellite si trova nello stesso punto della sua orbita, ed ecco la ragione, per cui i satelliti anche quando sono in congiunzione ed ecclissati, ci compariscono alle volte molto discosti da giovè. Il tempo, in cui ci bisogna più sapere il sito apparente dei satelliti, è quello delle immersioni ed emersioni; tutto ciò si può rappresentare con una semplice figura di sufficiente esattezza per gli osservatori.

862. Sia I il centro di giovè (*fig. 112*) cinto dalle quattro orbite de' suoi satelliti. IG la linea delle sizigie, o l' asse del cono ombroso, che parte dal sole e passando per il centro di giovè va di là del punto G d'opposizione; GE un arco di 110 preso sulla orbita del 4.^o satellite; essendo questo arco eguale alla massima parallasse annua di giovè nelle sue medie distanze, la linea IE indicherà la direzione del raggio visuale della terra, quando giovè è in quadratura, fra la congiunzione e opposizione, e passa per il meridiano alle ore 6 della sera; perchè allora noi veggiamo giovè per 11° all' occidente del vero suo luogo eliocentrico, notato dalla IG. Se per i punti G, F, g, f, nei quali si trovano i satelliti in congiunzione, si conducano delle parallele alla IE, come GD, FC, gB, fA, si avranno i quattro punti A, B, C, D, nei quali i satelliti devono comparire in fianco di giovè nel punto della loro congiunzione eliocentrica; col telescopio, che rovescia gli oggetti, si veggono alla dritta di giovè, come appunto nella *fig. 112*.

863. Negli altri tempi dell' anno, e quando la parallasse annua sarà minore di 11°, si troverà la posizione del raggio visuale IE, ch'è la linea delle congiunzioni geocentriche, descrivendo sopra l' arco EG come raggio, un semicerchio diviso in gradi, o ore; dal punto E delle ore 6 si prenderanno 30°, e vi si noterà 4^h e 8^h, perchè giovè lontano 30° dalla quadratura passa per il meridiano alle 8^h circa, o alle 4^h della se-

ra;

ra; e si condurrà verso questo punto di 4^h la linea I E; riesce più comodo agli astronomi l' avere questo semicerchio diviso piuttosto in tempo che in gradi, perchè l' ora del passaggio per il meridiano si trova già calcolata nell' effemeridi, e gli astronomi ne fanno un uso continuo.

Quando giove, dopo la congiunzione, passa per il meridiano la mattina, allora si deve condurre dalla parte dritta, o orientale, la linea I E della congiunzione geocentrica; e i satelliti ci compariranno alla sinistra, o all' occidente di giove nelle loro congiunzioni eliocentriche.

864. Per mezzo di questa figura si troveranno le distanze dei satelliti dal momento dell' emersione, prendendo alla dritta dei punti A, B, C, D una quantità eguale al semidiametro dell' ombra, ch' è appresso a poco eguale al semidiametro I H di giove, e si avrà la distanza dei satelliti dal lembo di giove, per il tempo delle loro emersioni; o pure si esaminerà la distanza I A d' un satellite dal centro di giove, per il tempo della congiunzione, e questa sarà la distanza dal lembo occidentale H per il tempo dell' immersione, e dal lembo orientale X per il tempo dell' emersione. Queste distanze dal lembo X sono disegnate sotto la figura, e sono di $\frac{5}{10}$, $\frac{8}{10}$, $1 \frac{1}{2}$ e $2 \frac{1}{2}$ diametri di giove, per l' emersioni, che succedono nelle quadrature di giove, cioè quando è in distanza di 90° dal sole, e passa per il meridiano alle ore 6 della sera.

Dei satelliti di saturno.

865. L' Hugenio li 25 Marzo 1655 osservando saturno con telescopj di 12 e 23 piedi, scoprì la prima volta il 4.^o satellite, il più grande di tutti, il solo che si può vedere con telescopj di 10 in 12 piedi: Cassini scoperselo il quinto sul fine d' Ottobre 1671 con un telescopio di 27 piedi; poi vide il terzo con telescopj di 35 e 70 piedi li 23 Dicembre 1672, e pubblicò allora una piccola opera su questo punto. Nel Marzo del 1684 scoprì li due intimi, cioè il primo e il secondo con telescopj del Campani di 34, 47, 100, e 136 piedi, con quei del Borelli di 40 e 70, e con quei d' Artonquelli ancora più lunghi (*Journ. des Sav.* 15 Mars 1677 & 1686. *Philosoph. transf. num.* 133, 154, 181. *Mém. Acad.* 1714).

866. Dei quattro satelliti scoperti dal Cassini se ne dubitava in Inghilterra: ma nel 1718 il Sig. Pound avendo fatto piantare sulla torre della sua parrocchia l' eccellente obbiettivo del foco di 123 piedi, dato dall' Hugenio alla Società Reale di Londra, li vide tutti cinque; e si verificarono gli elementi della loro teoria, come l' avea fatto il Cassini a Parigi nel 1714. Nello stesso tempo trovatosi dal Sig. Hadley Vice-Presidente della Società Reale coll' indirizzo del Nevvton il mezzo di costruire degli eccellenti telescopj, si continuò con essi ad osservare questi satelliti (*Phil. transf.* 1723).

867. Il primo e il secondo non si vedevano che a stento con telescopj di 40 piedi, il terzo alquanto maggiore si scorgeva alle volte per
tut-

tutto il corso della sua rivoluzione; il 4.^o è il più grande di tutti, e così fu scoperto il primo. Il quinto sorpassa i primi tre; quando si trova verso la sua digressione occidentale, ma alle volte è piccolissimo, e franisce anche affatto. Il Sig. Wargentini mi assicurò d'averli visti tutti con un telescopio acromatico di dieci piedi.

868. Si determinarono le rivoluzioni loro col paragonare insieme delle osservazioni fattefi quando saturno si trova incirca nello stesso sito della sua orbita, e i satelliti alla stessa distanza dalla congiunzione; si scelsero parimenti quei tempi, in cui le loro ellissi sono più allargate, cioè quando saturno è distante 90° dai loro nodi, perchè allora la riduzione è nulla, e il luogo del satellite sulla sua orbita è lo stesso col suo luogo vero ridotto all'orbita di saturno. In questo

Satel.	Rivol. period.
I	18' 23" 18' 27"
II	2' 17' 44' 22"
III	4' 12' 25' 12"
IV	15' 22' 34' 38"
V	79' 7' 47' 0"

modo nel 1714 il Sig. Cassini determinò i loro periodi veduti da saturno rapporto all'equinozio quali si veggono nell'annessa Tavola. Determinò parimenti l'epoche delle loro longitudini viste dal centro di saturno, e computate sul piano delle loro orbite; io l'ho riferite nell'art. segu. all'anno 1760, perchè si possa facilmente trovare la loro posizione per qualunque altro tempo, come si troverebbero colle Tavole estese inserite nelle *Mem. de l'Acad.* 1716, o nelle Tavole del Cassini. Se vogliansi queste posizioni esattamente, bisogna ridurle al piano dell'orbita di saturno, come abbiamo ridotti i pianeti a quello dell'eclittica (431). L'argomento di latitudine si trova col levare dalla longitudine del satellite vista da saturno quella del nodo (873), cioè 5° 40' per il quinto, e 5° 22' per gli altri. Quando si fa l'inclinazione dell'orbita, col risolvere un triangolo si trova parimenti la latitudine del satellite vista da saturno; questo è l'angolo che fa l'orbita col nostro raggio visuale; e perciò il valore dell'asse minore dell'ellisse, che ci pare descrivere il satellite, preso per unità l'asse maggiore, o il diametro dell'orbita.

869. Per determinare le distanze dei satelliti dal centro di saturno si adoperarono molti mezzi; è molto difficile di vederli insieme con saturno nello stesso campo del telescopio, onde misurarne le massime loro digressioni; e poi questo metodo non può servire che per li due primi. Si prende per gli altri l'intervallo di tempo che scorre fra il passaggio di saturno e il passaggio del satellite per un filo orario posto nel foco del telescopio. Il Cassini osservò, che la legge di Keplero (469) si osservava esattamente nei cinque satelliti (*Mem. Acad.* 1716). E il Sig. Pound se ne servì per trovare colla distanza del quarto quelle degli altri; egli determinò più esattamente e più spesso che potè la distanza del quarto dal centro di saturno nelle maggiori sue digressioni, e la trovò di 8, 7 semidiametri dell'anello (971), e colla legge di Keplero ne dedusse le distanze degli altri quattro; quali si veggono nella Tavola seguente espresse in semidiametri dell'anello, e di saturno, che sono fra loro come 7 : 3.

Tav.

Tav. delle longit. e dist. medie dei satelliti di saturno.

Satelliti	Longitudine nel 1760 secondo il Cassini	Moto diurno	Distanze in semid. dell' Anel. secondo Bradley	Distanze in min. e sec. dedotte da quella del quarto
I.	11 50 41'	6 10 41' 51"	2, 097	0' 43 $\frac{1}{2}$ "
II.	9 10 18	4 11 32 5	2, 686	0 56
III.	4 25 57	2 19 41 25	3, 752	1 18
IV.	0 0 43	0 22 34 37	8, 698	3 0
V.	7 20 36	0 4 32 18	25, 348	8 42 $\frac{1}{2}$ "

870. Moltiplicandosi le distanze in semidiametri dell' anello per 33364 $\frac{1}{2}$, si avranno le distanze in leghe; ma bisognerà levare tre cifre dal prodotto per le tre decimali aggiunte nella Tavola al numero dei semidiametri.

Li 9 Giugno 1719 a 10^h il Sig. Pound con un telescopio di 123 piedi e con un eccellente micrometro trovò che il quarto satellite, giunto in circa alla massima sua digressione orientale, era lontano di 3' 7" dal centro di saturno. Così la distanza del satellite da saturno era alla distanza media del sole dalla terra, come 825 a 100000; dal che facilmente si ricaverebbero le distanze degli altri quattro in parti di quella del sole.

871. Confrontando i satelliti con l' anello di saturno in diversi punti dello loro orbite, ed esaminando l' apertura delle loro ellissi, si trovò che i quattro primi sembravano all' occhio descrivere delle ellissi simili a quella dell' anello, e poste nello stesso piano, cioè inclinate all' eclittica per 31° $\frac{1}{2}$, o pure 30° all' orbita di saturno. Infatti l' asse minore di queste ellissi, quando comparivano le più allargate, è la metà in circa dell' asse maggiore, come l' asse minore dell' anello è in questo caso la metà di quello che passa per le anse; questi satelliti nelle maggiori loro digressioni sono sempre sulla linea delle anse; il che tutto prova, che si muovono nel piano dell' anello. Ma il Sig. Maraldi nel 1715 trovò l' inclinazione del piano dell' anello col piano dell' orbita di saturno di 30° (972); dunque tale è altresì l' inclinazione delle orbite dei quattro primi satelliti con quella di saturno.

872. L' inclinazione poi dell' orbita del quinto satellite coll' orbita di saturno, o col piano dell' anello il Sig. Cassini il figlio nel 1714 non la trovò che di 15° $\frac{1}{2}$ (Mem. Acad. 1714), e vide questo satellite descri-

scrivere una linea retta , che passava in circa per il centro di saturno , mentre gli altri se ne scostavano per di sopra o di sotto. Così l'inclinazione dell'orbita del quinto coll'ecclittica era di 15, o 16 gradi, e altrettanta col piano dell'anello e coll'orbite dei quattro intimi, ma in senso diverso.

873. Il Sig. Maraldi nel 1716 determinò la longitudine del punto d'intersezione dell'anello full'orbita di saturno di $5\ 19^{\circ} 48' \frac{1}{2}$, e full'

ecclittica di $5\ 16^{\circ} \frac{1}{3}$. Tale è la longitudine del nodo dei quattro primi satelliti. Si stimò d'avere scoperto nel 1744 un moto retrogrado nei nodi dell'anello ; veramente è difficile cosa il giudicarne in sì piccolo spazio di tempo ; nonnonostante sembra probabile che le attrazioni dei satelliti full'anello vi producano un sì fatto moto , giacchè la luna lo produce sulla sferoide terrestre (1064).

Nel 1714 il nodo del quinto satellite fu trovato dal Cassini full'ecclittica a $5\ 4^{\circ}$, cioè 17° meno avanzato del nodo degli altri quattro satelliti full'orbita di saturno , ch'egli supponeva a $5\ 21^{\circ}$ full'ecclittica (*Mem. Acad.* 1714 p. 374). Il Sig. Cassini parimenti lo determinò coll'osservare il luogo di saturno li 6 e 7 Maggio 1714 ; allora il quinto satellite pareva muoversi in linea retta , e noi per conseguenza eravamo situati nel suo piano, e nel nodo del suo anello . Si crede parimenti avervi un moto nel nodo del quinto satellite .

874. Riguardo al satellite di venere che il Cassini credette d'avere veduto, n'ebbe qualche sospetto il Sig. Short , ed altri Astronomi (*Hist. de l'Acad. pour* 1741, *Philos. transf.* n. 459, *Encyclopedie tom.* XVII. pag. 837). Ma le prove inutili fatte da me e da molti altri astronomi per vederlo , mi fanno credere essere questa una illusione ottica cagionata dai vetri de' telescopj ; così pensa il Sig. Ab. Hell sul fine delle sue *Effemeridi* del 1766 , e il Sig. Ab. Boscovich nella quinta sua dissertazione d'ottica. Il Sig. Short stesso, con cui io ho parlato in Londra nel 1763, non mi pare persuaso dell'esistenza di questo satellite.

875. Per formarfi idea di questo fenomeno ottico , basta considerare l'immagine secondaria , che comparisce per una doppia riflessione , quando per una sola lente di vetro si guarda un oggetto luminoso posto sopra un fondo oscuro e di piccolo diametro ; per vedere allora un'immagine secondaria simile all'oggetto, ma più piccola, basta guardarlo in guisa, che l'oggetto stesso cada fuori dell'asse della lente ; questa immagine secondaria, che fu creduta un satellite di venere , comparisce dalla stessa parte dell'oggetto o dalla opposta, e dritta o rovescia, secondo il diverso sito della lente, dell'occhio e dell'oggetto. Se si uniscano insieme due lenti, si avranno molte doppie riflessioni della stessa spezie, almeno in certe posizioni ; ma per la maggior parte del tempo sono insensibili , perchè la loro luce è disseminata , e il foco troppo vicino all'occhio , o perchè escono fuori del campo del telescopio : vi sono però de' casi , in cui questi raggi si riuniscono, e formano una falsa immagine , che si è potuto credere un satellite di venere .

LIBRO DECIMO.

Delle comete.

Le comete sono corpi celesti, che compariscono di quando in quando con diversi moti, e per lo più accompagnate da una luce sparfa. Il loro moto apparente è molto diverso da quello de' pianeti; ma considerandolo rispetto al sole, si trova d'accordo colle stesse leggi dei pianeti, perchè si vedrà che girano intorno al sole in ellissi molto eccentriche (910), secondo le regole spiegate nel III. libro.

876. Il moto delle comete le distingue dalle nuove stelle, perchè in queste non s'è mai scorto moto proprio (287). E poi la luce delle comete è sempre debole, ed è luce del sole, che ci riflettono, come i pianeti; e questo si è mostrato specialmente per una fase notatafi nella cometa del 1744, la di cui parte lucida non si vedeva che per metà (*Mem. Acad.* 1744 p. 304). Queste fasi poi non sempre s' osservano per causa della densa atmosfera loro, che disperge la luce, in guisa che ci compariscono per lo più rotonde. Si distinguono specialmente le comete per quello strascino di luce, che le accompagna, che ora si dice *chioma*, ora *coda* della cometa (923); v'hanno per altro delle comete senza coda, senza barba, senza chioma: la cometa del 1585 vistsi per un mese continuo da Ticone era rotonda, senza alcun vestigio di coda, e solamente la circonferenza era un po meno lucida del nucleo. La cometa del 1665 secondo l' Evelio era molto lucida, e quasi senza chioma. Finalmente la cometa del 1682, secondo il Cassini, era rotonda e lucida come giove (*Mem. Acad.* 1699); e perciò non deve notarsi la loro coda, come caratteristica distintiva di esse comete.

877. Il Riccioli nel suo Catalogo delle comete non ne annovera fino il 1651 che 154 citate dagli Storici, l' ultima delle quali era del 1618. Ma nella grande opera del *Lubienietz*, dove si riportano i più piccoli passi degli Autori, quando si tratta di comete, se ne contano 415 fino a quella del 1665, comparsa dalli 6 fino alli 20 Aprile fra il pegaso e le corna dell' ariete. Dopo questo tempo se ne videro 39 compresa quella del febbrajo 1772.

878. Ma fra tutte queste comete non ne troviamo alcuna prima dell' 837, la di cui strada sia stata esattamente descritta; e il numero di quelle, nelle quali si trovarono circostanze tali, onde poterne calcolare l'orbita, si riduce finora a 63, non computando che una sola cometa quelle delli 1456, 1531, 1607, 1682, 1759, che veramente per la cognizione esatta che se ne ha, furono lo stesso pianeta (912); io vi ho aggiunte anche quelle del 1532 e 1661, e quelle del 1264 e 1556, delle quali ne parleremo all' art. 914.

879. Per altro dobbiamo credere essere in ogni tempo comparse delle comete, senza che gli Storici ce ne parlino; e che ve n' ha ancora un mag-

maggior numero, che non si sono punto vedute. Gli antichi stessi lo sapevano, perchè Possidonio, secondo Seneca (*Quest. nat. L. VII. c. 20*), scrisse, che mediante la oscurità prodotta da una eclisse del sole, si era vista una cometa vicinissima allo stesso, e ciò verso l'anno 60 avanti G. C.; d'onde si può credere, che in simili casi se ne possano spesso vedere. Dopo l'anno 1757 in cui s'aspettava e si cercava la cometa del 1682, se ne sono vedute altre sette nello spazio di 7 anni; il Sig. Messier si mise sopra tutti a cercarle, e per lo più fu il primo a vederle; e si può credere, che ne scorgerebbe un buon numero chi si mettesse a cercare per il Cielo.

Alstedio osserva, che negli anni precedenti e susseguenti al 1101, Data della 223^a cometa, se ne videro in quasi ogni anno (*Lubienecii theat. cometicum*).

Si sono anche vedute più d'una volta molte comete a un tempo stesso, e Riccioli ne riferisce molti esempj. Due se ne videro gli 11 Febr. 1760 (*Mem. Acad. 1760 p. 168*).

880. Il tempo più lungo per cui si sono vedute in passato delle comete fu di 6 mesi; la prima al tempo di Nerone, l'anno 64 di G. C. (*Sen. l. 7, c. 21*); la seconda verso il 603, al tempo di Maometto; la terza nel 1240, in cui seguì la grande irruzione di Tamerlano. Ai nostri di quella del 1729 fu vista per 6 mesi dalli 31 Luglio 1729 fino li 21 Genn. 1730; e quella del 1769 per quattro. Riccioli ci dà una Tavola della durata di molte altre comete secondo diversi Storici; in cui se ne leggono quattro di 4 mesi, cioè quelle degli anni 676, 1264, 1363, 1433.

881. Tutte le comete hanno il moto diurno come gli altri astri (2); e anche un moto proprio, ma questo verso ora l'oriente, ora l'occidente, ora per l'eclittica o zodiaco, ora perpendicolarmente all'eclittica.

La cometa del 1472 percorse in un giorno 120 gradi, retrocedendo dall'estremità della vergine fino al principio di gemini, come osservò Regiomontano. Quella del 1760 fra li 7 e 8 Gennajo descrisse $41^{\circ} \frac{1}{2}$.

Si hanno molti altri esempj di grandissima celerità nel moto apparente delle comete; e si vedrà (920) che può anche farsi maggiore, quando fossero più vicine alla terra.

882. Alle volte dura sì poco la loro apparizione, che non si scorge molto cangiarsi il loro sito. Ma quella del 1664 percorse 164° con moto retrogrado apparente dalli 20 Dicembre fino alli 6 Genn. 1665, e ne percorse 113° in 17 giorni; quella del 1769 tanto prima che dopo la sua congiunzione percorse 240° . Quella del 1556, 1800 in circa; quella del 1472 170° circa; quella del 1618 soli $107^{\circ} \frac{1}{2}$ nello spazio di 28 giorni (*Ricciol. Almag. II, 28*).

883. Gli Antichi per lo più non parlano della grandezza delle comete, badando solo alla loro coda e chioma; ma ne parleremo (923); nonostante vi furono delle comete, il diametro apparente delle quali pare

H h 2

esse-

essere stato considerabilissimo indipendentemente dalla coda. Dopo la morte di Demetrio Re di Siria (146 prima di G. C.) comparì una cometa grande come il sole (*Sen. VII, 15*). Quella che comparì alla nascita di Mitridate, secondo Giustino, era più luminosa del sole.

La cometa del 1006 (riferita in fallo all' anno 1200 in alcuni libri) era quattro volte maggiore di venere, e risplendeva come la luna in quadratura; pare che questa sia la stessa che quelle del 1682 e 1759 (912).

Cardano riferisce lo stesso delle comete del 1521 e 1556. Riguardo alla grandezza delle comete prima di quella del 1577 non abbiamo niente di certo; il diametro apparente di questa era secondo Ticone di 7', cioè, secondo lui stesso, doppio di quello di venere.

Diverse opinioni sulle comete.

884. Vi furono in ogni tempo Filosofi, che riputavano le comete altrettanti pianeti, il moto delle quali doveva essere perpetuo e costante le rivoluzioni. Questo pensiero fu senza ragione attribuito a' Caldei; ma egli è veramente dei Pittagorici e di altri molti, come di Apollonio il Mindiano, d' Ippocrate di Chio, d' Eschilo, Diogene, Favorino, Artemidoro e Democrito, che secondo Cicerone (*Tusc. l. 5*) e Seneca (*Quaest. nat. l. 7*) fu il più acuto fra tutti gli antichi Filosofi. Si possono leggere in proposito di questi antichi sistemi Plinio l. II. c. 25. Arist. *Meteor. I. 6*. Plutarco de *Plac. Phil.* 3. 2. Aulo Gellio 14. 1. Sen. l. VII. c. 13. Riccioli *Alm. II. 35*, e quanto ho detto io stesso *Mem. del 1759 p. 1*, e seg. Meglio però e con più sublimità di tutti ne parlò Seneca nel lib. VII. *nat. quaest.* di cui forse un astronomo de' nostri di non saprebbe parlarne con più spirito filosofico.

885. Alcuni per altro, uomini anche celebri, stimavano le comete tanti corpi recentemente formati e passeggeri. Di tale opinione furono Aristotele, Tolommeo, Ticone, Bacone, Galileo, Evelio, Longomontano, Keplero, Riccioli, de la Hire (*Mem. Acad. 1702 p. 112*). Molti di questi le credevano corpi sublunari, o meteore dell' atmosfera. Il Cassini stesso le avea credute formate da esalazioni degli altri corpi celesti (*Abregé des observations sur les comètes de 1680 p. XXXI*).

Per causa di tale opinione che regnò nei secoli d' ignoranza, gli astronomi non si studiarono che pochissimo a determinare i loro moti. Ticone fu il primo, che avendo osservato per lungo tempo attentamente la cometa del 1577 scrisse un' opera considerabile, e trovò che le di lei apparenze si potevano spiegare benissimo supponendo che questa cometa descrivesse intorno al sole una porzione di cerchio che abbracciasse l' orbita di mercurio e di venere.

Mostrando Ticone, che le comete si alzavano molto sopra la media regione, rovesciò l' antico sistema dei cieli solidi; siccome Newton se ne servì per distruggere il pieno e i vortici di Cartesio.

Avendo trovato il Keplero più concordi l' osservazioni della cometa del

1618 con una linea retta, che con un cerchio, stimò il moto delle comete puramente rettilineo. Il Cassini credette, che si compisse il loro moto intorno alla terra; ma l' Evelio nella sua cometografia pubblicata nel 1668 mostra che l'orbita delle comete s'avvicina piuttosto a una parabola descritta intorno al sole.

886. Dopo la scoperta dell'attrazione si aprì ai filosofi, per così dire, un nuovo cielo. Il Nevvton vedendo gli altri pianeti soggetti alla forza centrale del sole, stimò che lo dovessero essere le comete ancora; per il che bisognava, che le loro orbite fossero molto eccentriche, cioè allungatissime, per potere spiegare perchè restino tanto tempo occulte.

Per vedere se ciò s'accordava colle osservazioni, il Nevvton esaminò l'orbita della cometa del 1680; e trovò infatti che una porzione d'ellissi così eccentrica, o pure, ch'è lo stesso, una porzione di parabola corrispondeva perfettamente alle osservazioni, supposte però le aree proporzionali ai tempi, come nei pianeti (473); dopo di che non dubitò più che le comete non fossero pianeti periodici, e creati quando gli altri.

Il Sig. Halley applicò questi principj a diverse comete (908) in numero di 24; e nel 1705 pubblicò gli elementi di queste 24 parabole nella sua cometografia, che di nuovo ho io pubblicata in Francia in una nuova edizione delle Tavole di Halley nel 1759.

887. Dopo questo tempo il numero delle comete osservate e calcolate si accrebbe fino a 63 (908) compresavi quella del 1774; alcune si videro per dei mesi con disuguaglianze considerabili, ma riducendole ad una parabola intorno al sole, si trova un accordo sì perfetto, che nessuna altra ipotesi o legge potrebbe esserlo di più; quindi è che io spiegherò adesso il loro moto in una orbita parabolica, di cui sono date le dimensioni; e poi ceterheremo il modo di trovare le dimensioni, o l'orbita d'una cometa, che si vedesse per la prima volta.

888. Il calcolo parabolico è solamente un' approssimazione; e si fa uso di esso per la facilità, e per la poca differenza fra una parabola e un'ellissi molto eccentrica. Il vantaggio consiste nell'essere le parabole tutte simili, e nel somministrarci una stessa proporzione fra i raggi vettori similmente posti; onde basta conoscere le distanze perielie di varie comete, per calcolarle tutte con una sola medesima Tavola (899). Si vedrà dopo la costruzione di questa Tavola generale, in cui è data per ciaschedun giorno l'anomalia vera, e che serve per tutte le comete, mentre l'ellissi al contrario richiedono ciascheduna una Tavola particolare.

889. La Tavola generale suppone una cometa, la di cui orbita sia la parabola PCOD (*fig.* 110), il sole S nel foco, P è il perielio della cometa, o il vertice della parabola, SP la distanza perielia, che si suppone eguale alla distanza media della terra dal sole, che si prende sempre per scala comune di tutte le distanze celesti.

Questa cometa in questa distanza SP impiega 109 giorni a descrivere PO, cioè dal perielio all'estremità dell'ordinata SO al foco, e perpendicolare ad SP (894). Io la chiamerò per brevità cometa di 109 giorni, e mostrerò come vi si rapportino tutte le altre comete, mutando sola-

folamente i tempi. Suppongo note la natura e proprietà generali della parabola, che ho io pure dimostrate nella mia *théorie des comètes* (*Tables astr. de Halley, 1759 pag. 70 & suiv.*).

890. La prima cosa consiste a determinare la velocità che deve aver luogo nelle parabole di varia grandezza; perchè la cometa di cui la parabola è maggiore, impiega più tempo a percorrere un angolo di 90° , come P S O, cioè per andare da P in O, come saturno impiega 30 volte più tempo a descrivere un grado della sua orbita, che la terra a percorrerne uno della sua; ecco un teorema fondamentale, che dimostra coo tutta semplicità.

891. La velocità nella parabola è a quella nel cerchio come $\sqrt{2} : 1$

Dim. Supponiamo una cometa in P che descrive la parabola PO in distanza dal sole di SP, e sia la terra in T che descrive un cerchio TLM, il di cui raggio sia ST eguale ad SP; la forza centrale o l'attrazione del sole, che trattiene la cometa e la terra, ciascheduna nella sua orbita, è uguale, per essere nella stessa distanza, in cui il sole non deve avere maggior forza per la cometa che per la terra. Suppongo un piccolo arco PC della parabola, ed un altro TL dell'orbita terrestre, tale che le abscisse PB della parabola e TI del cerchio sieno eguali, o pure che le lunghezze delle tangenti rispetto alla curva sieno le stesse nella parabola e nel cerchio; queste abscisse esprimono la forza centrale del sole; poichè sono le quantità di cui il pianeta obbedisce al sole sviandosi dalla retta linea (1005): dunque posta la stessa forza, sono eguali in tempo eguale; se dunque le abscisse sono eguali, gli archi PC, TL sono descritti in tempi eguali, ed esprimono le velocità della cometa e della terra. Mi servo di questa supposizione delle inflessioni eguali per trovare gli archi stessi.

Gli archi non possono essere eguali; poichè due archi presi in due curve diverse, non possono avere inflessioni uguali, e quando le inflessioni sono uguali, gli archi non lo sono; ne concluderò il rapporto degli archi, e sarà quello delle velocità, essendo il tempo lo stesso da una parte e l'altra. Dalla proprietà del cerchio si ha $TI = \frac{IL^2}{2ST}$ (988); ma dalla proprietà della parabola si ha il quadrato dell'ordinata BC uguale al prodotto dell'abscissa PB nel parametro, ch'è quadruplo di SP; dunque $PB = \frac{BC^2}{4SP} = \frac{BC^2}{4ST}$; ma $PB = TI$ per ipotesi, dunque $\frac{IL^2}{2ST} = \frac{BC^2}{4ST}$; o pure $2IL^2 = BC^2$; dunque $IL\sqrt{2} = BC$, da cui si ha quest'analogia,

$BC : IL :: \sqrt{2} : 1$; ma IL è uguale all'arco TL, o almeno non ne è diverso che d'una infinitesima, dunque IL è la velocità della terra, e BC della cometa; dunque la velocità della cometa alla velocità della terra nella stessa distanza dal sole si è come $\sqrt{2} : 1$.

892. Quindi ne segue, che la velocità della cometa in P sulla parabola PO, sarà $\frac{2}{1}$ della velocità della terra; per essere $\sqrt{2} = \frac{2}{1}$ circa. Dunque l'area descritta in un sec. di tempo dalla cometa sarà $\frac{2}{1}$ di quella della terra; ma le aree in tempi uguali sono sempre uguali (472); dunque in qualunque distanza dal sole che si trovi la cometa nella parabola PO, l'area descritta in un sec. di tempo sarà sempre $\frac{2}{1}$ dell'area descritta dalla terra; e l'area descritta dalla terra sarà eguale all'area della cometa divisa per $\frac{2}{1}$, o $\sqrt{2}$. Voglio servirmi di questa proposizione per dimostrare che la cometa deve impiegare 109 giorni a percorrere PO, o 90° d'anomalia.

893. La distanza pericli SP, o ST sia $= 1$, la circonferenza del cerchio TM, o il numero 6, $283 = e$; sarà l'area di questo cerchio $= \frac{e^2}{2}$; l'area parabolica

P S O,

PSO, ch'è due terzi del prodotto di SP per SO, farà $\frac{2}{3}$; quest' area della cometa divisa per $\frac{1}{3}$, darà $\frac{4}{3}$, che farà l'area della terra descritta (892) nello stesso tempo, in cui la cometa va da P in O; ma chiamatali A la lunghezza dell'anno, avrai questa analogia: l'area totale $\frac{c}{2}$ dell'orbita terrestre è al tempo A , come l'area $\frac{4}{3}$ al tempo corrispondente, che farà $\frac{A}{3 \times \sqrt{2}}$; questo è il tempo che la cometa impiega a descrivere l'arco parabolico PO, o li 90° d'anomalia.

894. La durata dell'anno siderale è di giorni 365 6^h 9' 10", o 21" (321), cioè giorni 365, 256379; se dal suo Logaritmo si levi quello di $\frac{1}{3}$ e quello del triplo della circonferenza, e vi si aggiunga il Logaritmo di 8, si avrà quello di giorni 109, 6154, cioè giorni 109 14^h 46' 10", per il tempo corrispondente a PO.

Ma non basta d'aver trovato il tempo speso a percorrere questi 90° d'anomalia; bisogna per calcolare il luogo d'una cometa in ogni tempo; sapere il numero dei giorni, che corrisponde a ciascuna porzione della parabola, come PD, o a ciascun angolo d'anomalia vera computata dal perielio, supponendo sempre le aree proporzionali ai tempi, e questo è il soggetto del seguente problema.

895. Nota l'anomalia vera in una parabola, trovare il tempo scorsato dal perielio. Suppongo data la parabola PCOD; cioè che sia nota la distanza perielia SP, ed il tempo impiegato a percorrere l'arco PO: si cerca il tempo impiegato a percorrere un altro arco PD, o un altro angolo PSD d'anomalia vera; si condurrà la linea DP, e presi SE, SR uguali al raggio vettore DS, si condurranno DR, DE, l'una delle quali farà la normale, e l'altra la tangente della parabola.

896. Se si prende per unità la funnormale RQ, cioè la metà del parametro, avremo il parametro eguale a 2, e $PQ = \frac{DQ^2}{2}$; il segmento parabolico DOPQ, ch'è

uguale alli due terzi del prodotto delle coordinate, o $\frac{2}{3} DQ \cdot PQ$, farà $\frac{1}{3} DQ^3$; il triangolo DPQ è uguale a $\frac{1}{2} DQ \cdot PQ = \frac{1}{4} DQ^3$; dunque levandolo dal segmento DOPQ, resterà il segmento DOPD = $\frac{1}{12} DQ^3$; e aggiungendovi la superficie del triangolo PDS = $\frac{PS \cdot DQ}{2} = \frac{DQ^2}{4}$, si avrà $\frac{1}{12} DQ^3 + \frac{1}{4} DQ^2$ per l'area PSDOP.

897. Prendendosi la linea RQ per unità, DQ è la tangente dell'angolo DRQ = $\frac{1}{2} DSE$, cioè la tangente della metà dell'anomalia vera. Se questa tangente dicasi r , avremo l'area parabolica PSDOP = $\frac{r^3}{12} + \frac{r^2}{4}$; allora l'area PSO di 90° farà = $\frac{r^3}{12} + \frac{r^2}{4} = \frac{1}{3}$. Ma bisogna prendere per unità l'area PSO, e allora l'area PSDOP diviene $\frac{r^3}{4} + \frac{r^2}{2}$, perchè $\frac{r^3}{12} + \frac{r^2}{4}$ è a $\frac{1}{3}$, come $\frac{r^3}{4} + \frac{r^2}{2}$ a 1; così nota l'area di 90°, e la tangente della metà d'un'anomalia vera chiamata t , si moltiplicherà l'area di 90° per $\frac{t^3}{4} + \frac{t^2}{2}$, e si avrà l'area descritta dalla cometa dopo il passaggio per il perielio; ma le aree sono proporzionali ai tempi: dunque si avrà parimenti il tempo che corrisponde a PD, moltiplicando li 109 giorni, o in generale il tempo di 90°, per la quarta parte di $t^3 + 3t$.

898. Esempio. Avendo 47° d'anomalia vera la cometa, che impiega 109 giorni a percorrere 90° d'anomalia, si dimanda quanto tempo è trascorso dopo il perielio. La tangente r di 43° $\frac{1}{2}$ è 0, 4348124, dunque $r^3 = 0, 0819$, e la quarta parte di $r^3 + 3r = 0, 3467$; bisogna dunque moltiplicare per 0, 3467 li 109 giorni, o il tempo per 90°, (894), e risulteranno 38 giorni; così la cometa de' 109 giorni si troverà dopo 38 giorni in distanza di 47° dal suo perielio.

Pati-

Parimenti si troverebbero i giorni corrispondenti a ciaschedun grado d'anomalia vera; per lo più si troveranno alcune decimali di più, essendo rarissimo che si abbia un intiero numero di giorni per un grado solo d'anomalia; ma col mezzo delle parti proporzionali si trovano facilmente le anomalie vere corrispondenti a ciascun giorno intero.

899. Così fu calcolata una Tavola generale delle orbite paraboliche; nelle quali si vede l'anomalia vera che corrisponde a ciascun giorno di distanza dal perielio per la cometa dei 109 giorni. Si potrebbe fare questo stesso calcolo con un metodo diretto, risolvendo l'equazione $t^3 + 3t = a$ (a esprime il quadruplo del tempo per PO), per trovare l'incognita t ; ma si trova più facilmente il tempo per mezzo dell'anomalia vera, ed è superfluo il cercare un altro metodo, per formarne la Tavola, ch'è l'ultima della nostra Raccolta.

Questa tavola generale si applica facilmente a tutte le comete. Infatti se si considerano diverse comete in altre parabole, a un medesimo grado d'anomalia vera, i tempi scorsi dopo il passaggio per il perielio saranno fra loro, come i tempi impiegati a passare dal perielio ai 90° , per esempio, quando $\frac{1}{4} t^3 + \frac{3}{4} t$ sarà eguale a $\frac{1}{2}$, il tempo sarà la metà del tempo per li 90° in tutte le parabole possibili; quindi ne segue, che per una qualunque cometa, se si conosca il tempo dei 90° , si avrà (con una semplice regola del tre) il tempo per ogni altro angolo d'anomalia vera, servendosi della Tavola calcolata per la cometa dei 109 giorni. Resta dunque soltanto da cercare il tempo dei 90° nelle parabole maggiori o minori, o il numero de' giorni da impiegarsi per l'arco PO, quando la distanza perielia SP non sarà più eguale alla distanza media della terra dal sole.

900. I quadrati dei tempi, che corrispondono a una stessa anomalia vera in diverse parabole, sono come i cubi delle distanze perielie. Questa legge simile a quella dei moti dei pianeti (469) è una conseguenza delle forze centrali; infatti abbiamo dimostrato che sul raggio dell'orbita terrestre descritta in 365 giorni, aveasi un quarto di parabola di 109 giorni (894); e così il tempo della parabola è in circa $\frac{3}{10}$ di quello del cerchio; ma se si considerano diversi cerchi o diversi pianeti in altra distanza dal sole, si avranno differenti rivoluzioni, nelle quali i quadrati dei tempi, saranno come i cubi delle distanze (464, 1012); dunque i tempi nelle parabole, che sono sempre le $\frac{3}{10}$, saranno essi pure nella stessa ragione; dunque i tempi che corrispondono a PO, sono come le radici quadrate dei cubi delle distanze perielie SP.

901. Dunque una sola Tavola servirà per trovare l'anomalia vera in tutte le parabole, purchè si accresca il tempo in ragione della radice quadrata del cubo della distanza perielia; infatti per un medesimo grado d'anomalia vera i quadrati dei tempi in diverse parabole devono crescere come i cubi delle distanze perielie, o i tempi come le radici quadrate dei

dei cubi delle dette distanze; così a 90° d' anomalia vera corrispondono 109 giorni, quando la distanza perielia è 10 (894), e 126 giorni, quando è 11, perchè la radice quadrata del cubo di 11 è maggiore nella stessa ragione; bisogna dunque similmente accrescere gli altri numeri di giorni, quando nella Tavola generale si cercheranno le anomalie per la cometa di 126 giorni.

In fianco alle distanze perielie nell'annessa Tavola vi ho scritto il numero, per cui si devono moltiplicare i giorni della Tavola generale, per avere i giorni, che corrispondono alla stessa anomalia in altre comete; suppongo la distanza del sole dalla terra divisa in dieci parti, ed ho calcolato il numero dei giorni per l'arco PO in undici diverse parabole. Si veggono anche nella fig. 113 molte parabole divise in giorni, e si può raccogliere dalle stesse con quale velocità ciascuna cometa si scosterebbe

Dist. Perielie in decime di quella del Sole.	Numeri, per cui si devono multipl. i giorni della Tav.	Giorni per 90°
1	0, 035	3,5
2	0, 089	9,8
3	0, 164	18,0
4	0, 253	27,7
5	0, 353	38,8
6	0, 465	50,9
7	0, 585	64,2
8	0, 715	78,4
9	0, 854	93,6
10	1, 000	109,6
11	1, 152	126,3

dal sole o dalla terra, la di cui orbita è ABC.

902. Si vede da questa Tavola, che quando la distanza perielia d' una cometa è $\frac{4}{10}$ di quella della terra dal sole, allora in vece dei giorni della Tavola generale bisogna prenderne la quarta parte, cioè 0, 25; ed ecco il perchè questa cometa, la di cui distanza è 4, non impiega se non 28 giorni a percorrere li 90° d'anomalia, e noi possiamo dirla cometa di 28 giorni.

Dunque per ciaschedun grado d'anomalia, al logaritmo dei giorni della tavola bisognerà aggiungere una volta e mezzo il logaritmo della distanza perielia d'una data cometa, e si avrà il numero de' giorni, che corrisponde a questa data cometa, per lo stesso grado d'anomalia; o viceversa l'anomalia computata dal perielio per un dato numero di giorni.

903. Il raggio vettore SD (fig. 110) dalla cometa, o la di lei distanza dal sole, è uguale alla distanza perielia SP divisa per il quadrato del coseno della metà dell'anomalia vera; perchè, calata sulla tangente ED una perpendicolare SX, resterà il triangolo a l'angolo ESD diviso in due parti uguali, onde l'angolo DRQ (= ESX) è la metà dell'anomalia vera. Dal triangolo rettangolo RDE si ha quest' analogia RQ : RD :: RD : RE, o 2PS : RD :: RD : 2SD; dunque PS : SD :: RQ : RD :: (cosen. QRD) : 1, o sia, come il quadrato del coseno della metà dell'anomalia PSD, al quadrato del raggio. Così trovata che si abbia per un dato tempo l'anomalia vera d'una cometa nella sua parabola (901), si ha il raggio vettore SD, dividendo la distanza perielia SP per il quadrato del coseno

feno della metà dell'anomalia stessa, e avendosi un raggio vettore colla sua anomalia, si può similmente trovarne la distanza perielia.

904. Quando sono noti due raggi vettori, e l'angolo compreso in uoa parabola, si può trovare la distanza perielia, e le due anomalie corrispondenti. Sieno b e c li due raggi vettori d'una parabola, di cui la distanza perielia è x , e la quarta parte della somma delle due anomalie vere, x la quarta parte della loro differenza, si avrà questa proporzione: $\sqrt{b} + \sqrt{c} : \sqrt{b} - \sqrt{c} :: \cot. a : \text{tang. } x$.

Dim. Il quadrato del coseno della metà d'uo' anomalia vera sta al quadrato del raggio, come 1 al raggio vettore (903); ma la maggiore delle due anomalie è $2a + x$, la minore $2a - x$; perciò $\sqrt{b} : \sqrt{c} :: \cosen. (a - x) : \cosen. (a + x)$; ma $\cosen. (a - x) = \cosen. a \cosen. x + \text{sen. } a \text{ sen. } x$, e $\cosen. (a + x) = \cosen. a \cosen. x - \text{sen. } a \text{ sen. } x$, come è noto dalla trigonometria; dunque $\sqrt{b} \cosen. a \cosen. x - \text{sen. } a \text{ sen. } x = \sqrt{c} \cosen. a \cosen. x + \text{sen. } a \text{ sen. } x$; seo. x ; dunque $\sqrt{b} + \sqrt{c} : \sqrt{b} - \sqrt{c} :: \cosen. a \cosen. x : \text{sen. } a \text{ sen. } x$; $\frac{\cosen. a}{\text{sen. } a} : \frac{\cosen. x}{\text{sen. } x} :: \cot. a : \text{tang. } x$; cioè la somma delle radici dei raggi vettori sta alla loro differenza, come la cotangente della semisomma della metà dell'anomalia vera alla tangente della loro semidifferenza. Nota la semisomma e semidifferenza facilmente si trovano le anomalie vere, e dai tempi loro corrispondenti il tempo del passaggio per il perielio, e anche il luogo del perielio.

905. Col mezzo dei precedenti teoremi si può trovare una parabola, che s'accordi con due longitudini d'una cometa osservata dalla terra. Supponiamo la terra in T in distanza TS dal sole, e che da essa si veda la cometa ridotta all'eclittica sopra un raggio TD, in guisa che l'angolo STD sia l'angolo d'elongazione, o la differenza fra la longitudine del sole e della cometa. Nel triangolo STD non si conosce se non un lato e un angolo, è necessario servirsi d'una ipotesi per il valore del lato SD distanza accorciata della cometa dal sole; con questa ipotesi, se si vuole arbitraria, ma che sarà in seguito verificata dal calcolo, si cerca l'angolo al sole, sciogliendo il triangolo TSD, e si trova la longitudine eliocentrica della cometa, la latitudine eliocentrica (443) e la distanza vera (445) o il raggio vettore.

Lo stesso si ripete per una seconda osservazione, e così si hanno due longitudini eliocentriche, e perciò l'angolo di due raggi vettori, che necessariamente è la somma o la differenza di due anomalie vere; se ne concluderà ciascheduna delle stesse anomalie (904), e perciò il luogo del perielio, la distanza perielia (903), e il tempo corrispondente a queste due anomalie (903), nella ipotesi sulla distanza SD della cometa dal sole; ma se l'intervallo di tempo trovato con queste due anomalie non s'accorda con l'intervallo dato dalle due osservazioni, bisognerà cangiare una delle due distanze dal sole che si sono supposte; e ritenutane una si cangerà l'altra, finchè compito il calcolo si trovino d'accordo essi due intervalli di tempo; e si avrà allora la parabola conveniente ad ambedue.

906. Ma non basta avere una parabola che s'accordi coll'intervallo di due osservazioni, avendovene una infinità; perchè in ciascuna ipotesi fatta sulla prima distanza SD della cometa dal sole, si troverà con diverse supposizioni riguardo alla seconda distanza, o della distanza dal sole nel-
la

la seconda osservazione, una parabola, che s'accorderà colle due stesse osservazioni. La difficoltà che resta consiste nel determinare fra tutte queste parabole quella unica, che s'accordi con una terza osservazione.

907. Quando si abbiano tre osservazioni sopra una cometa, per mezzo de' teoremi precedenti si può determinare la sua orbita; perchè allora si può trovare quella parabola, che s'accorda colle tre osservazioni stesse, quando si abbiano quelle che s'accordano con due di esse. Primieramente si scelgono due longitudini e due latitudini geocentriche osservate, e si cercano parabole che soddisfacciano a queste due osservazioni; quando si hanno due o tre parabole, cioè due o tre ipotesi, che s'accordino colla stessa esattezza colle due osservazioni, si calcola in ciascuna di queste tre ipotesi il luogo della cometa per il tempo della terza osservazione, cercando il luogo del perielio (903), l'anomalia vera (903), il raggio vettore, la longitudine eliocentrica e geocentrica (442), come per li pianeti; fra queste differenti ipotesi quella che più s'accorda colla terza osservazione, è la migliore; e qualche volta basta una semplice proporzione, per trovare un'altra ipotesi, che soddisfaccia esattamente alle tre osservazioni. Questo metodo indiretto e di falsa posizione mi sembra più semplice e più comodo del metodi più diretti e più eleganti delli Sigg. Eulero, Fontaine ec. Io ne ho dato il dettaglio e i precetti, e gli esempi nel libro XIX della mia *Astronomia*.

908. Con simile metodo, ma senza dubbio più lungo, l'Halley per mezzo delle osservazioni degli antichi determinò 24 parabole, o sia orbite cometary, compresavi quella del 1698. Li Sigg. Bradley, Maraldi; de la Caille, Struick, Pingré, ed io, ne abbiamo calcolate delle altre, e il numero di tutte è di 63 compresavi quella del 1774. Ma non conto che per una sola tutte le apparizioni di quelle, il periodo delle quali è noto.

909. Gli elementi d'una cometa sono li sei articoli, che determinano la situazione e la grandezza dell'orbita da essa descritta, e che ne formano la teoria. Il luogo del nodo veduto dal sole, l'inclinazione, il luogo del perielio, la distanza perielia e il tempo medio del passaggio per il perielio, che serve d'epoca; finalmente la direzione del di lei moto diretto o retrogrado.

Del ritorno delle comete.

910. Il Nevvton dopo d'aver veduto che la cometa del 1680 avea sensibilmente descritta una parabola durante la sua apparizione; con aree proporzionali al tempo (888), si persuase che questa cometa era un vero pianeta, e che l'orbita che in apparenza era una parabola, non era veramente che la parte inferiore d'una grandissima e formamente eccentrica ellissi (*Princip. math. pag. 308, edit. del 1687*). Egli sapeva che queste ellissi così eccentriche si rassomigliavano alle parabole, e tanto più quanto era minore la distanza perielia rispetto all'asse maggiore dell'ellissi.

911. La gloria fu dell' Halley che nel 1705 calcolando sulle antiche osservazioni dimostrò ciò che il Nevvton avea indicato in forza delle sue fisiche leggi ; egli mostrò l' identità della cometa 1607 e di quella del 1682 , e ne prenunziò il ritorno nel 1759 ; il che si verificò esattamente . Io nella mia teoria delle comete in seguito di quella dell' Halley ho scritta la Storia del ritorno di questa cometa asigne ; si può anche vedere quel che scrissi nelle *Mém.* del 1759.

912. Quando l' Halley calcolò colle osservazioni (908) le parabole di 24 comete , se ne trovarono tre somigliantissime , cioè quelle del 1531 , 1607 e 1682 ; le tre parabole erano similmente poste , le distanze perielie erano eguali , e gl' intervalli dei tempi erano di 75 a 76 anni ; perciò stimò allora , che potevano essere la stessa cometa ; nonnostante la differenza delle inclinazioni e de' periodi gli sembrava troppo grande , e non ardiva chiamarle la stessa cometa ; ma dopo che fra le antiche comete ne trovò tre altre , delle quali ne fu parlato dagli Storici per gli anni 1305 , 1380 , 1456 , a intervalli di tempi in circa eguali , non dubitò più sulla certezza del ritorno , e attribul alle vicendevoli attrazioni de' corpi celesti le differenze , che trovò fra i diversi periodi di questa cometa .

913. Tale fu il progresso su questo punto delle nostre cognizioni : alcuni degli antichi filosofi stimarono le comete altrettanti corpi celesti e periodici (884) . Il Nevvton conchiuse , che potevano descrivere dell' ellissi somamente eccentriche , e ricomparire in ciascuna rivoluzione . Halley verificò questo bel pensiero calcolandone molte , fra le quali ne trovò tre , che avevano esattamente descritta la stessa orbita ; dal che si prenunziavano tre apparizioni ; e ciò fu poi pienamente confermato nel ricomparire che fece l' anno 1759 questa cometa nella stessa orbita , e dopo lo stesso spazio di tempo .

914. Vi sono ancora due comete , il periodo delle quali sembra noto , e delle quali si spera vederne il ritorno ; cioè quella del 1531 e del 1661 , che si aspettano nel 1789 , o 1790 ; quella del 1264 e del 1556 per l' anno 1848 (*Mém. Acad.* 1760 p. 191) . La gran cometa del 1680 dovrebbe ricomparire nel 2254 , secondo l' Halley , che la credeva quella , fattasi vedere al tempo di Cesare ; e dovrebbe essere comparita negli anni 619 e 2349 prima di G. C. , e potrebbe perciò servire a quelli , che vogliono spiegare ficamente il diluvio , come il Wisthon (*Nervu theory of the earth* , pag. 186) ; ma sicuramente v' ha del dubbio sul periodo di questa cometa del 1680 , e io trovai esservene otto altre comete , che possono ben più accostarsi alla terra , e farvi nascere le maggiori rivoluzioni (leggete le mie *Réflexions sur les comètes* a Paris , chez Gibert 1773) .

915. In tutti i corpi , che girano intorno al sole , i quadrati dei tempi sono come i cubi delle distanze ; quindi è che conoscendosi , per mezzo di due ritorni osservati , il periodo d' una cometa , si trova con una sola proporzione l' asse maggiore della di lei orbita , e se ne calcola il luogo vero , come nei pianeti (493 , 441) .

916. Se si fosse veduta ed esattamente osservata una cometa per lungo tempo, si avrebbe un'idea della di lei rivoluzione, o si determinerebbe la di lei ellissi con metodi indiretti come ho fatto nella parabola; ma il calcolo sarebbe tanto lungo, e il risultato sì poco suscettibile d'esattezza, che stimo meglio non entrare nel dettaglio di questo punto. Noterò soltanto, che il metodo più comodo sarebbe questo: primieramente si determinerà nell'ipotesi parabolica la distanza perielia, e il tempo del passaggio per il perielio per via d'osservazioni non molto lontane; onde questa distanza perielia possi accordarsi nello stesso modo coll'ellissi e colla parabola, e sia indipendente dall'ipotesi: poscia si calcolerà la differenza fra la parabola e l'ellissi per via d'osservazioni le più lontane, in diverse ipotesi di rivoluzioni ellittiche; dal paragone poi fra le differenze calcolate e gli errori osservati, cioè dalla differenza fra l'osservazione, e il risultato dall'ipotesi parabolica, si deciderà quale delle diverse supposte ellissi s'accordi con queste lontane osservazioni.

917. Con un calcolo fatto soltanto all'incirca per la cometa del 1759, trovasi che se si fosse determinato il perielio per via delle tre osservazioni 12 Marzo, primo Aprile e primo Maggio, si avrebbe trovato li 31 Maggio un errore di 2' per tre anni di differenza sulla rivoluzione, cioè che prova non essere impossibile il trovare il periodo d'una cometa dentro tre anni con una sola apparizione di tre mesi.

Diverse osservazioni sulle comete.

918. L'ineguaglianza del moto delle comete in ellissi molto eccentriche si può rappresentare con una macchina molto semplice pubblicata dal Defaguliers sotto il nome d'*istrumento cometario*, ch'è stato anche descritto dal Sig. Ferguson (*astronomy explained*, 1764, pag. 288). Questo consiste in due ruote ellittiche, ciascuna mobile intorno al foco, una delle quali conduce l'altra per via d'una corda, che ambedue le abbraccia, incrociandosi; le ruote continuamente si toccano; onde ne avviene che se la prima gira uniforme, la seconda sarà più veloce, quando il suo perielio toccherà l'afelio della prima, che quando il suo afelio toccherà il perielio della prima. Se dalla seconda ellisse, che gira inegualmente, sporga in fuori un'*alidada* che porta infilzato un piccolo globo ritenuto dentro un canale ellittico, questo rappresenterà benissimo la velocità del perielio, e la lentezza dell'afelio, e l'area ancora saranno proporzionali ai tempi.

919. Anche molto prima di Ticone si sapeva che il moto apparente delle comete, osservato durante la loro apparizione, non era uniforme; nonnostante Ticone non faceva gran caso di questa disuguaglianza, e non vi scorgeva perciò l'effetto della parallassi annua, e del moto della terra. Ma Keplero nel suo trattato delle comete lo vide benissimo, e dice, che supposto il moto di quella del 1618 in linea retta, e con diminuzione uniforme, si vedrebbe l'effetto del moto della terra nella longitudine, e nella latitudine della cometa, e che il moto in apparenza tortuoso, non poteva essere tale, che per causa del moto della terra; egli finisce

il suo primo libro col dire : quante sono le comete in cielo , tante sono le prove del moto della terra intorno al sole , senza quella che si ha dal moto dei pianeti .

920. La cometa del 1729 , osservata dal Cassini per molti mesi , dopo avere scorso più di 15° verso l' occidente dal capo del Cavallo minore fino alla costellazione dell' aquila , si curvò tosto tornando verso l' oriente , ciocchè mostrava stupendamente l' effetto della parallassi annua . Può succedere che questo effetto riesca maggiore : se una cometa retrograda , la di cui distanza dalla terra sia eguale alla distanza media della luna , si trovasse perielia e in opposizione , avrebbe 140° di moto orario , e si potrebbe perciò vedere una cometa scorrere in meno di tre quarti d' ora dall' orizzonte al zenit , e perdere poi più di quattro ore a giungere all' orizzonte occidentale , o soggetta vedrebbe ad altri singolari particolarità dello stesso genere .

Queste ineguaglianze sono soltanto apparenti ; ma devo accennare un' altra irregolarità , che si è scorta nel 1759 , e che affetta il moto reale e intrinseco d' ogni cometa nelle loro ellissi , e questa è l' attrazione degli altri corpi celesti , specialmente di giovè e di saturno ; e forsi v' hanno parte le attrazioni ancora degli altri pianeti e delle altre comete . Questa attrazione s' è manifestata in un modo il più singolare nel ritorno che fece l' anno 1759 la cometa del 1682 . Il periodo della medesima fra il passaggio per il perielio li 26 Ottobre 1607 e quello dei 14 Settembre 1682 , è stato minore di 585 giorni del periodo seguente compiutosi li 13 Marzo, 1759 .

921. Quando nel 1757 si cominciò a parlare sul ritorno di questa cometa predetto dall' Halley , si vide che l' ineguaglianza dei suoi periodi precedenti lasciava quasi un anno d' incertezza sul tempo dell' apparizione ; l' Halley aveva notato , che questa cometa nel 1682 passando molto vicina a giovè , doveva esserne stata fortemente attratta , con che potea prolungarsi l' apparizione veguente fino al principio del 1759 ; ma l' Halley stesso non faceva gran caso di questo pensiero ; io esortai però il Sig. Clairaut ad applicarvi la sua teoria dell' attrazione , o del problema dei tre corpi , offerendogli tutti i calcoli astronomici necessari ; gli diedi le situazioni della cometa , e le forze da giovè e da saturno su di essa esercitate per lo spazio di 150 anni , cioè di due rivoluzioni , nella direzione dei raggi vettori o perpendicolarmente agli stessi , unitamente alle ordinate e superficie di tutte le curve esprimenti gl' integrali delle equazioni del problema . Così trovò il Sig. Clairaut , che la rivoluzione della cometa doveva essere di giorni 611 maggiore di quella che si compì dal 1607 fino al 1682 ; 100 dei quali giorni doveano attribuirsi all' azione di saturno , gli altri 511 di giovè . Secondo questi primi calcoli la cometa doveva passare per il suo perielio verso la metà d' Aprile , ma vi passò li 13 Marzo ; il quale errore d' un mese fu prodotto dalle piccole quantità che si sono trascurate negl' immensi calcoli da noi fatti . Veggasi la *Theorie du mouvement des cometes* del Sig. Clairaut , e gli *Opusculs mathématiques* del Sig. d' Alembert , t. II .

922. Fra le 60 comete che ci son note ne trovo molte , che si possono accostare all' ai alla terra e produrvi degli effetti sensibili ; e fra quelle che ignoriamo ve ne avranno forse , che possono cagionare delle prodigiose rivoluzioni . Una cometa della grandezza della terra , che si trovasse in distanza da noi di leghe 13290 (migl. ital. 3816) potrebbe produrre nel mare una marea alta 2000 toese (migl. ital. $2\frac{1}{4}$) ; e

se vi si tratteneffe per molto tempo , potrebbe sommergere tutta la terra , siccome l' ho io mostrato nelle mie *Reflexions sur les comètes 1773*. Sembra difficile che non abbia un dì a succedere qualche simile rivoluzione ; ma è impossibile il determinarne il quando . Non conosciamo nè anche la quarta parte delle comete , e fra le 60 osservate , sole 7 , o 8 possono accostarsi alla terra , e anche urtarla , se la terra s' incontrasse nel nodo al tempo stesso , in cui vi passasse una cometa , in guisa che in questo caso si trovasse il nodo precisamente sull' orbita terrestre ; ma queste tre circostanze si uniscono tanto difficilmente , che fu una vera pazzia il timore che si sparfe nel mese di Maggio ultimo all' occasione della mia memoria .

La cometa del 1680 essendosi trovata lontana nel perielio dal sole per la sesta parte soltanto del diametro solare , potrebbe succedere per la resistenza dell' atmosfera del sole e per l' attrazione delle altre comete nel suo aselio , che la cometa stessa cadesse nel sole ; in tal guisa , dice Nevvton , la bella stella del 1572 potè comparire a un tratto , rianimata ed accresciuta da buona copia di nuova materia .

923. Gli antichi le chiamarono comete per la luce ineguale , di cui per lo più sono cinte , e le hanno distinte in molte spezie (Plinio , II. *Evelio in cometographia*) . Vi furono però delle comete senza coda e senza chioma ; e quelle che si tiravano dietro più lunga coda , furono le seguenti . Quella , di cui parla Aristotele , che verso l' anno 371 prima di G. C. occupava la terza parte dell' emisfero , o 60° circa . Quella , di cui parla Giustino (lib. 37) comparfa sul nascere di Mitridate , 130 anni avanti G. C. , così terribile , che sembrava occupare tutto il cielo , s' estendeva per 45° . Un' altra cometa al riferire di Seneca (VII. 15) verso l' anno 135 copriva tutta la via lattea . La cometa del 1456 occupava 2 segni , o 60° (Pontanus in *centiloquio*) ; e quella del 1460 incirca 50° secondo lo stesso autore . La cometa del 1628 avea una coda lunga almeno 70° , secondo Keplero , e anche 104° secondo il Longomontano , li 10 Dicembre 1628 . Le misure delle code di molte altre comete si leggono nel Riccioli (*Alm.* II. 25) ; ma dopo queste si vide la cometa del 1680 una delle più sorprendenti per l' estensione della coda (Veggasi *le traité de M. Cassini sur le Comète de 1680 & 1681*) .

924. La cometa del 1744 si vide ai nostri di colla coda divisa in molti rami , ch' era notabilissima , e che li 19 Febr. s' estendeva fino ai 30° (Veggasi *le traité de la comète de 1744 par M. de Chéseaux*) . Nei paesi meridionali , dove l' aria è più pura e serena , queste code si distinguono più chiaramente e compariscono più lunghe . La cometa del 1680

stra-

strascinava una coda di 62° a Parigi secondo il Cassini , e di 90° a Costantinopoli ; quella del 1759 da Parigi vedevasi quasi senza coda , vi si scorgeva ma a stento qualche leggiero indizio ; al contrario a Montpelier , secondo il Sig. da Ratte , la coda era di 25° li 29 Aprile , e la parte più lucida di 10° . E il Sig. de la Nux corrispondente dell' Accademia all' Isola di Bourbon la vide molto maggiore . Finalmente la coda della cometa del 1769 vedevasi in Parigi di 10° circa , di 40° a Marfiglia , di 70° a Bologna , e di 90° la vide il Sig. Pingrè che trovavasi in mare fra la Teneriffa e Cadice , ma era debolissima ; similmente accade alla luce zodiacale , che nella zona torrida vedesi costantemente e per una estensione maggiore di 100 gradi .

925. Seneca sapeva che le code delle comete sono trasparenti , e lasciano perciò vedere le stelle (*Lib. VII. c. 18*) . Il Nevvton dimostra che sono d'una sostanza infinitamente più tenue e più rara di quello che possiamo pensarlo .

926. Appiano fu il primo a provare che le code delle comete erano sempre appresso a poco opposte al sole (*Astronomicum Caesarum* , 1540) ; e questa legge fu allora confermata da Gemma Frisio , Cornelio Gemma , Fracastoro , Cardano ; nonnostante Ticone non la teneva per generale , nè per dimostrata , ma al dì d'oggi è ricevuta comunemente . Vi si scopre soltanto una curvatura , che nasce dalla posizione della terra fuori del piano dell'orbita della cometa , e dal moto della cometa stessa (*Hewelius in cometog. Cassini sur la comete de 1680* , pag. X. *Nevvton Lib. III.*) .

927. La coda delle comete , secondo il Nevvton , nasce dalla propria atmosfera delle comete (*Princ. math. lib. III. prop. 41*) . Il fumo e i vapori , dice egli , possono allontanarsi , o per l'impulso dei raggi solari , come giudicava Keplero , o piuttosto per la rarefazione prodotta nelle atmosfere delle comete dal calore .

928. E conferma questa opinione colla cometa del 1680 , che nel mese di Dicembre , dopo essere passata molto vicina al sole , diffondeva una luce molto più lunga e più brillante che nel mese di Novembre prima del suo perielio . Questa regola è anche universale , e gli parve bastante a provare , che la coda delle comete non è che un leggerissimo vapore , alzatosi dal nucleo della cometa per il calore . Il Sig. Eulero vi aggiunge l'impulso della luce (*Mém. de Berlin an. 1746 pag. 121*) , e il Sig. de Mairan l'atmosfera del sole o la luce zodiacale .

929. Non se ne vide una maggiore della coda che tiravasi dietro la cometa del 1680 , perchè non si vide altra cometa più di essa vicina al sole : li 18 Dicembre 1680 era vicina al sole 166 volte di più della terra . Questa cometa era esposta a un calore 28000 volte maggiore del nostro nel solstizio d'estate ; il calore dell'acqua bollente è triplo di quello , che una terra secca riceve allora dal sole , e il calore d'un ferro rovente tre o quattro volte maggiore di quello dell'acqua bollente , secondo il Nevvton ; dunque la cometa del 1680 dovette concepire un calore 1000 volte in circa maggiore di quello del ferro rovente , e un globo di ferro del

del suo diametro avrebbe conservato il suo calore per 50000 anni. Il Sig. de Buffon stima doverfi correggere in molti punti questo calcolo del Nevvton , e promise di pubblicare delle sperienze curiosissime sul calore e la durata del raffreddamento dei metalli , che dipende dalla loro fusibilità.



LIBRO UNDECIMO.

Della rotazione de' pianeti, e delle loro macchie.

930. Fin da quando si sono scoperti i telescopj si scorre nel sole il moto intorno all'asse. Sappiamo che la terra pure gira ogni giorno intorno al suo asse (384); così pure la luna, giove e marte; e infatti è difficile a concepirsi come il moto impresso nei pianeti, con cui descrivono le loro orbite, non sia accompagnato dal moto di rotazione; bisognerebbe che la direzione passasse per il centro in modo che non vi fosse la minima differenza.

Nonostante la rotazione, quanto alla durata, non dipende dalla rivoluzione; un pianeta può camminare per la sua orbita per via d'un moto di traslazione da occidente in oriente senza girare sull'asse, e può girare su d'un asse qualunque in senso opposto, e con una qualunque velocità (405); così il moto di rotazione non dipende in conto alcuno dal moto di rivoluzione, che abbiamo esaminato nel libro III. Non si può questo moto determinare se non per via delle osservazioni, come ora vedremo.

931. Giovanni Beornoulli in una memoria di Dinamica, in cui considera i centri spontanei di rotazione, fa vedere che una forza di proiezione applicata non al centro della terra, ma un poco più lungi dal sole, e ciò di $\frac{1}{150}$ di raggio, produrrebbe nella terra supposta rotonda e omogenea due moti molto conformi a quelli che si osservano; per marte egli trova $\frac{1}{418}$; per giove $\frac{7}{19}$ (Bern. opera T. IV. pag. 283); per la luna si trova $\frac{1}{150}$. Se l'impulso primitivo fosse stato applicato a maggiori

distanze da ciaschedun centro, il moto di rotazione sarebbe più celere, quale velocità certamente dipende dalla causa dell'impulso primitivo, ed è probabile che tutti i corpi, in cui v'ha un moto di rivoluzione, ne abbiano anche uno di rotazione. Il sole stesso gira sul suo asse, ed è probabile, che vi girino anche le stelle.

932. La rotazione del sole fu la prima a scoprirsi, ed è anche la più sensibile. Le macchie, che di quando in quando si veggono nel sole ce l'hanno fatta scoprire, e ci servono per osservarla. La prima scoperta delle macchie solari leggesi in una grande opera di Scheinero intitolata: *Rosa Uršina*, pubblicata nel 1630.

933. Era il P. Scheinero Professore di Matematica a Ingolstadt nel mese di Marzo 1611, quando osservando con un telescopio a traverso di alcune nubi il sole, vide la prima volta le sue macchie, e le mostrò al P. Cyfati e a molti de' suoi discepoli; la fama tosto si divulgò, e si stimò il P. Scheinero a pubblicare le sue scoperte; ma siccome questo se-
nome-

non meno sembrava contrario ai principj peripatetici di quel tempo , i di lui superiori temendo di porli con ciò in pericolo di discredito , furono pubblicate sotto il finto titolo *Apelles post tabulam* da un Magistrato d' Augsbourg , detto Velfero .

934. Galileo pretese di esserne lui stato il primo scopritore , e l' accusò di plagio ; Scheinero si giustificò molto diffusamente nella sua opera ; Giovanni Fabricio figlio di Davide le avea parimenti osservate a Vitemberga , e ne pubblicò gli avvisti nel Luglio 1611 : secondo il Keplero egli le avea vedute prima del P. Scheinero . Weidler (*Hist. Astronomiæ* , pag. 435).

935. Le macchie del sole sono parti nere irregolari , che di quando in quando si veggono nel sole , e che sembrano girare in giorni 25 14^h intorno al sole (939) ; una se ne vede in N (fig. 114) rappresentata sul disco del sole .

Le fiaccole , delle quali spesso parlano Scheinero ed Evelio non mi sembrano essere che il fondo luminoso del sole , che qualche volta si scorge fra gl' interstizj delle macchie o dell' ombre , e che sembrano come punti più luminosi del resto del sole . Il Cassini nonnostante dice , che furono visti sul sole dei punti più brillanti del resto della superficie (*Elem. di Astr.* 403) ; ma egli chiama fiaccole quelle leggere macchie , che qualche volta si scorgono in quello stesso sito , in cui svani qualche macchia (*Anciens mem. de l' Acad. tom. X. pag. 661*).

Le ombre sono una nebulosità biancastra , che circonda sempre le macchie grandi . Evelio le paragona all' impressione che fa il fiato sullo specchio appannandolo (*Selenographia* , pag. 84) ; alle volte , die' egli , quest' atmosfera delle macchie è giallastra *instar balonis* , e ne porta un esempio ; alle volte si veggono sole ombre , le quali poi si cangiano in macchie , come l' osservò nel mese d' Agosto 1643 ; queste ombre hanno per lo più una grandissima estensione . Evelio ne scorfe una nel Luglio 1643 , che occupava più della terza parte del diametro solare (pag. 506).

936. Le macchie del sole servono a spiegare alcuni fenomeni che si leggono nelle Storie . Negli annali di Francia pubblicati a Parigi nel 1588 (*Vie de Charlemagne* , pag. 62) si legge , che l' anno 807 XVI. Kal. April. Mercurio si vide nel sole , come una piccola nera macchia , che si vide in Francia per 8 giorni , e che per causa delle nubi non si potè osservare il tempo dell' entrata e della uscita . Questo non potè essere che una macchia (737) ; e altrettanto deve si giudicare di quel che riferisce Keplero aver veduto li 18 Maggio 1607 . Per mezzo delle macchie solari lo Scheiner spiega molti fenomeni singolari , che si trovano nelle Storie , riguardanti la diminuzione di luce nel sole .

937. I due fatti che sono in Abulfaradge (*Hys. Dynast.*) si devono ripetere dalle grandi macchie del sole , se loro si prestasse . L' anno 537 la luce del sole fu soggetta a una diminuzione sensibilissima per lo spazio di 14 mesi ; nell' anno 626 la metà del disco solare si oscurò , e vi rimase dall' Ottobre fino al Giugno : queste macchie si veggono anche per mezzo d' un semplice vetro affumicato (941).

938. Il P. Scheiner s'impiegò a ridurre le macchie solari all' ecclittica: notava attentamente la situazione loro rispetto al verticale, o ai paralleli dell'equatore, e così disegnava in carta il cammino delle stesse per tutti li 13 giorni della loro apparizione. Se ne veggono in gran numero disegnate nella di lui opera dal 1618 fino al 1627; dalle quali ricavò le seguenti regole (*Rosa Urs.* pag. 225).

939. Sul fine di Maggio e principio di Giugno le macchie descrivevano delle linee rette inclinate all' ecclittica dal nord al sud, cioè dirette da A in B (*fig. 114*). Sul fine di Novembre o principio di Dicembre descrivevano delle linee rette dal sud al nord, da C in D. Per tutto l' inverno e primavera la linea da esse descritta era concava verso il sud, e convessa al nord; ma negli altri sei mesi, cioè dal principio di Giugno fino al principio di Dicembre era concava verso il nord, come nell' ellissi R X V M O.

La massima apertura di queste ellissi s' osserva al principio di Marzo e Settembre, allora l' asse minore di ciascuna ellissi è di $\frac{23}{100}$ del maggio-

re. Tutte le macchie del sole, le ombre stesse e le fiaccole camminano una strada simile dal momento in cui si fanno vedere fino al momento in cui svaniscono. E lo stesso osservasi nelle piccole e nelle grandi, in quelle che si veggono per pochi giorni, e in quelle che compiono molte rivoluzioni, in quelle che passano per il centro del sole, e in quelle che presso i poli. Questa sola regolarità è bastante a mostrare, che le macchie solari sono aderenti allo stesso corpo del sole, e che non hanno altro moto che quello del sole stesso intorno all' asse.

Quasi tutte le osservazioni dello Scheinero furono poi confermate da quelle dell' Evelio; anche il Cassini le osservò molto; e in molti volumi delle *Mem. de l' Acad.* sul principio di questo secolo si trovano molte di tali osservazioni.

940. Dalle quali ne risulta, che le macchie del sole sono variabilissime. Scheinero le vide alcune cangiarsi di figura, crescere, diminuirsi, convertirsi in ombra, svanire. Anche il Sig. de la Hire vide alcune macchie diffiparsi affatto sul disco solare (*Mem. 1702 pag. 137*). Vi son delle macchie, che dopo essere svanite, ricompariscono nello stesso luogo. Il Cassini giudica che la macchia del mese di Maggio 1702 fosse quella stessa del Maggio 1695 (*Mem. Acad. 1702 pag. 140*), cioè che fosse nello stesso sito. Non vi fu macchia che si abbia vista per più lungo tempo di quella che fu osservata sul fine del 1676 e principio del 1677; essa durò per più di 70 giorni, e si fece vedere in ogni rivoluzione (*Cassini Elem. d' Astr. pag. 81*).

941. Le apparizioni di queste macchie non sono regolari; verso l' anno 1611, in cui furono scoperte, non si vedeva mai il sole senza macchie, ve n'era spesso un gran numero. Lo Scheinero ne numerò 50: in una sol volta. Ma poco dopo si refero più rare. Dall' anno 1650 fino al 1670 non vi fu modo di scorgerne più d'una o due, e queste per poco tempo. Dal 1695 fino al 1700 non se ne vide alcuna; dal 1700 fino al

al 1710 nell' accademia se ne parla continuamente ; nel 1710 se ne vide una sola ; nel 1711 e 1712 nessuna ; nel 1713 una sola nel mese di Maggio ; dopo il qual tempo se ne videro quasi sempre . Il Cassini nel 1740 così parla : *ora sono tanto frequenti , che rarissime volte s' offerva il sole senza qualche macchia , e per lo più se ne vede gran numero* . Io posso dire lo stesso dal 1749 fino al 1773. La più grande e più nera l'ho veduta alla metà di Settembre 1763 ; la sua lunghezza era almeno d' un minuto , e dovea perciò essere più larga tre volte della terra tutta ; ne ho vedute di grandissime anche li 15 Aprile 1764 , e gli 11 Aprile 1766.

942. Le macchie del sole compariscono sul lembo orientale sommantente strette, ciocchè mostra poca la loro altezza, o piuttosto che sono sulla superficie del sole ; ma bisogna notare , che quando anche avessero una grandissima altezza , potrebbero non vederli sul lembo del sole , per non avere le medesime alcuna luce , e per non vederli se non quando interrompono la luce del disco solare ; ma se avessero una certa altezza , almeno si vedrebbe l' altezza tutta tosto che si cominciassero la loro proiezione sul sole .

943. Alcuni fisici tenevano queste macchie come tanti corpi solidi che girino intorno al sole (Tarde le chiama *Sydera Borbonia* , e un altro per nome Maupertuis *Sydera Austriaca* , Evel. *Selen. pag. 83*) ; ma se ciò fosse vero , esse macchie si nasconderebbero appresso poco la stessa porzione solare sul lembo, o nel mezzo ; e il tempo ; in cui si fanno vedere , sarebbe più corto di quello in cui restano occulte ; ma al contrario questi tempi li troviamo eguali, salva la piccola differenza che deve produrre la grandezza del diametro solare , e la vicinanza di queste macchie a uno dei poli del sole ; finalmente non potrebbero restare invisibili per il corso di anni interi (941) , e compire le loro rivoluzioni nello stesso spazio di tempo .

Galileo , che non era punto attaccato al sistema dell' incorruttibilità de' cieli , giudica queste macchie una spezie di fumo , di nube , o di schiuma formata sulla superficie del sole , e nuotante in un oceano di materia sottile e fluida . Evelio pure era di questa opinione , e nel tempo stesso combatte il sistema della incorruttibilità de' cieli .

944. Ma sembrami , che se fossero così mobili come le fanno Galileo e l' Evelio , non farebbero così regolari nel loro corso come lo sono ; e poi la forza centrifuga per la rotazione del sole tutte le spingerebbe in uno stesso sito ; al contrario veggonsi ora verso l' equatore solare , ora verso i poli . Finalmente ricompariscono alle volte nello stesso sito , in cui svaniscono : onde tengo per più probabile il pensiero del Sig. de la Hire (*Hist. Acad. 1700 page 118 Mem. 1703 pag. 138*) .

Questi giudica le macchie del sole essere alcune eminenze d' una massa solida , opaca , irregolare , che nuoti nella materia fluida del sole , e in cui alle volte interamente vi s' immerge . Forse questo corpo opaco è la massa del sole coperta comunemente dal fluido igneo , e che per il flusso e riflusso di esso fluido si fa qualche volta vedere alla superficie , e non
sira

fra co' alcune delle sue eminenze. Quindi si spiegano le diverse forme, sotto le quali compariscono queste macchie, e si spiega ancora come ricompariscano di nuovo dopo l'occultamento per molte rivoluzioni, in quello stesso sito, in cui si farebbero vedute se avessero continuato a farsi vedere. Si spiegano ancora le fiaccole, e quella nebulosità biancastra, da cui sono sempre cinte le macchie, e che sono le parti del corpo solido, in cui non vi resta più che un leggero strato di quel fluido. Nonostante il Sig. de la Hire dopo alcune osservazioni aggiunge, che bisognerebbe accostare molti di questi corpi opachi nel sole, o supporre che la parte nera potesse dividersi, indi riunirsi.

Dell'equatore, e della rotazione del sole.

945. Le macchie del sole ci fecero conoscere la di lui rotazione intorno a due punti, che si devono dire i poli del sole. Quel cerchio che si trova sul globo solare in distanza eguale da' due poli (15) si dirà l'equatore solare; la di cui situazione si determina per via del moto apparente delle macchie, cioè la di lui inclinazione, e i nodi sull'ecclittica, come ora spiegheremo.

946. Il modo d'osservare le macchie del sole è lo stesso che per li passaggi di venere; si adopera il quadrante o il reticolo. Scheiner ed Evelio facevano entrare in una Camera oscura per via d'un cannocchiale l'immagine del sole. Ma oggidì si stima meglio d'osservare direttamente il sole, e determinare la differenza d'altezza e d'azimuto, o la differenza d'ascensione retta, e di declinazione fra la macchia e il centro del sole, onde dedurne la differenza di longitudine e latitudine, alla quale bisogna sempre ricorrere. Sia D (fig. 111) una macchia, o il disco di venere, NM il diametro verticale del sole; quando si è osservato il passaggio del temo del sole, e della macchia per un filo verticale PB, o HD, si ha la differenza orizzontale BD, e perciò DE; i passaggi per un filo orizzontale MG, EB, ci danno la differenza d'altezza DG, e perciò CE. Dunque nel triangolo CED si troverà l'angolo ECD, e il lato CD. Levando l'angolo del verticale col cerchio di latitudine LCI, cioè l'angolo MCI, dall'angolo ECD, resta l'angolo di congiunzione DCK, e conoscendo CD coll'angolo adiacente facilmente si trova la latitudine CK della macchia, e la differenza di longitudine KD fra il sole e la macchia.

947. Quando si farà per molti giorni successivi osservata la differenza di longitudine e latitudine fra la macchia e il centro del sole, si disegneranno in carta per giudicarne del loro progresso. Sia S (fig. 114) il centro del disco solare, SE una porzione dell'ecclittica, M una macchia, ML la differenza di latitudine fra il sole e la macchia; X, V, M, O, i siti successivi della macchia sul suo parallelo apparente RO; si scorderà facilmente, che queste posizioni formano in circa un'ellissi, eccettuato il tempo verso il principiare di Giugno e Dicembre, in cui questa ellissi si riduce a una linea retta.

948. L'apertura apparente dell'ellissi descritte dalle macchie solari, è proporzionale all'inclinazione del raggio visuale, o alla elevazione della terra sopra al piano dell'equatore solare, la quale elevazione si dee misurare dal centro del sole. Sia S il centro del sole (*Fig. 115*), E A Q V il piano dell'equatore solare, S T la linea diretta verso la terra, ch'è sempre nel piano dell'eclittica, e che bisogna immaginarsela elevata sopra il piano della figura, l'angolo T S V è l'elevazione del nostro occhio sopra il piano dell'equatore solare, e rappresenta l'obliquità sotto cui veggiamo il cerchio dell'equatore; e il seno di questo angolo sarà l'asse minore dell'ellissi, e il maggiore sarà il seno tutto (674). Così essendo l'asse minore di quest'ellissi di $\frac{13}{100}$ del maggiore, quando l'ellissi sono le più aperte, cioè sul principio di Marzo e Settembre, si può concludere che l'equatore del sole non ha mai col nostro occhio maggiore inclinazione di $7^{\circ} \frac{1}{2}$. L'angolo T S V è la latitudine eliocentrica della terra rispetto all'equatore solare; l'argomento di questa latitudine è la distanza della terra dal nodo dell'equatore solare, o dal decimo grado del sagittario (959). Per trovare in ogni tempo l'apertura dell'ellissi che faranno descritte dalle macchie, basta moltiplicare il seno di $7^{\circ} \frac{1}{2}$ per il seno della distanza della terra, o del sole dall'uno dei nodi.

949. Questa regola per trovare tale apertura suppone la terra immobile durante l'apparizione d'una macchia; ma il moto della terra rende apparentemente più lungo l'asse maggiore, o per meglio dire, fa sì che il cammino descritto dalla macchia non sia veramente un'ellissi; e le regole precedenti non sono esatte che dopo avere ridotte le osservazioni al punto che si averebbe, se la terra o il sole fossero restati immobili durante il tempo della osservazione. Infatti la terra che continuamente si alza sopra il piano dell'equatore solare, non lascia che il cerchio descritto dalla macchia comparisca esattamente in forma di linea retta, nè di ellissi che veramente vedrebbero stando ferma la terra, o almeno sarà un'ellissi in ciascun giorno variabile; così questa curva disegnata in carta non ci serve che per potere scorgere il progresso, o l'esattezza delle osservazioni, e a guidarci nel calcolo.

950. Nota la differenza di longitudine S L (*Fig. 114*) e la differenza di latitudine M L (946), si troverà la linea S M, e l'angolo L S M. Questa linea S M, presa sul disco apparente del sole, è la proiezione, o il seno d'un arco del globo solare, il cui centro è nel centro S di esse globo, come abbiamo veduto nelle eclissi del sole (679). Per conoscere questo arco del globo solare, che corrisponde alla linea retta S M, o l'arco di distanza, servirà questa proporzione: il raggio del sole ridotto in secondi sta al coseno del semidiametro solare, come la lunghezza S M al seno dell'arco che gli corrisponde; e si avrà l'arco, o angolo sotto cui un osservatore situato nel centro del sole vedrebbe la macchia M lontana dalla terra; perchè la terra sembra corrispondere al punto S, o al polo

polo stesso del cerchio ARD , che è il lembo del sole veduto dalla terra.

931. Per vedere la verità di tal regola bisogna considerare il raggio TG (fig. 116) che tocca il disco solare in G , e con CAT forma l'angolo del semidiametro apparente CTG ; se questo angolo è di $15'$, l'angolo TCG sarà di $89^{\circ} 45'$, e questa è esattamente la perpendicolare GH , o il seno di $89^{\circ} 45'$, che corrisponde a $15'$ o a $900'$; dunque si dovrà dire, come li $900'$ al seno di $89^{\circ} 45'$, così è il numero de' secondi osservato per una distanza BE al seno de' gradi e minuti dell'arco AB corrispondente.

932. Ora possiamo determinare la longitudine eliocentrica della macchia, colla sua latitudine veduta dal sole. Sieno P ed E i poli dell'eclittica (fig. 117) solare, $PREK$ il cerchio massimo che divide l'emisfero volto verso la terra, dall'opposto; T il punto del globo solare, al quale corrisponde la terra cioè il punto che ha la terra nel suo zenit, o che a noi sembra corrispondere al centro stesso del disco solare, M il punto in cui è la macchia, TM l'arco di distanza determinata col calcolo precedente (930); l'angolo MTP formato dal cerchio di latitudine PT , e dal cerchio TM , che unisce il luogo della terra con quello della macchia, è composto d'un angolo retto PTL e dello sferico LTM , ch'è lo stesso con l'angolo piano LSM della fig. 114 determinato per osservazione (930). Nel triangolo sferico MTP formato sulla convessità del globo solare, è noto PT , ch'è sempre di 90° , TM ch'è l'arco di distanza, e l'angolo PTM ; si troverà perciò l'angolo TPM al polo dell'eclittica, che sarà la differenza di longitudine fra il luogo della terra e il luogo della macchia, che corrisponde al punto L dell'eclittica; si troverà parimenti PM ch'è la distanza della macchia dal polo boreale dell'eclittica, e si avrà la latitudine eliocentrica LM di essa macchia.

933. La differenza di longitudine trovata si aggiungerà alla longitudine della terra (cioè a quella del sole accresciuta di 6 segni), se il punto L è realmente alla dritta o all'occidente del centro del sole (fig. 114 117); o si leverà, se la macchia fosse nella parte orientale del sole, cioè se la medesima non passò ancora la sua congiunzione apparente, e così si avrà la longitudine della macchia veduta dal centro del sole, cioè il punto dell'eclittica, a cui vedrebbe corrispondere essa macchia da un osservatore che si trovasse nel centro del sole.

934. Quando con tal metodo si faranno determinate tre posizioni della macchia veduta dal sole, per via delle note longitudini e latitudini, si conoscono tre punti X , V , M (fig. 117) d'un piccolo cerchio $RXVM$, ch'è parallelo all'equatore solare; si può determinare perciò il polo del medesimo, e questo è il polo dell'equatore solare GHK , cui il cerchio MR è parallelo.

935. Se la longitudine eliocentrica della macchia si trovasse la medesima nelle tre osservazioni, avrebbe una prova che il sole non gira intorno al suo asse; perchè il centro del sole non può vedere una macchia che

che corrisponda sempre allo stesso punto del cielo , nel caso che questa macchia giri per la circonferenza solare : dunque la longitudine eliocentrica d' una macchia che abbiamo determinata (952) non si cangia che in forza del moto del sole ; ma non si cangia però uniformemente , perchè l' ecclittica , su di cui computiamo le longitudini , non è l' equatore stesso del sole , intorno a cui gira il sole e con moto uniforme .

956. Se la latitudine eliocentrica d' una macchia nelle tre osservazioni fosse costante , e la longitudine si cangiassse , la macchia in tal caso girerebbe parallelamente all' ecclittica , cioè intorno ai poli stessi dell' ecclittica , che in questo caso si confonderebbe coll' equatore solare .

957. Ma se a un tempo stesso si cangiassero la longitudine e latitudine della macchia , essa descriverebbe un parallelo a qualche altro cerchio dell' ecclittica ; dal che ne segue che l' equatore solare è inclinato all' ecclittica .

958. Se abbiamo una serie d' osservazioni d' una macchia durante una semi-rivoluzione intorno al sole , quando il sole è nei nodi del suo equatore , vedremo questa macchia nella sua maggiore e minore latitudine ; dalla differenza delle quali si avrà il doppio della inclinazione dell' equatore solare ; perchè sia AB (*fig. 114*) il diametro dell' equatore solare , KE l' ecclittica , RO il parallelo della macchia , la differenza fra le latitudini OE , KR di questa macchia (quando si trova sul cerchio $AROE$ delle sue più grandi latitudini) è il doppio di EB , cioè il doppio dell' inclinazione dell' equatore solare ; poichè in una delle osservazioni la differenza fra la latitudine EO e BO è uguale a BE , e nell' altra osservazione la differenza fra la latitudine KR e AR , o BO , è uguale alla $AK = BE$.

In simil guisa noi troveremo l' inclinazione dell' equatore lunare , potendosi le macchie della luna osservare durante il tempo d' una intera rotazione lunare . Ma siccome di rado veggonsi le macchie solari durante una mezza loro rivoluzione , quindi è che non possiamo immediatamente avere l' inclinazione dell' equatore solare per via delle estreme due latitudini , e si ricava dalla ineguaglianza delle tre latitudini osservate .

959. Vi sono molti metodi diretti per trovarla ; ma è chiaro , che lasciati questi , si possono sostituire alcune false supposizioni sul luogo del nodo , e sulla inclinazione dell' equatore , finchè giungasi ad avere una supposizione , che dia esattamente le tre longitudini eliocentriche , e due delle latitudini dedotte dalle osservazioni . Si trova con questo mezzo , che il nodo dell' equatore solare è a $27^{\circ} 10'$ di longitudine , che l' inclinazione dello stesso equatore coll' ecclittica è di circa 7° , e che la di lui vera rotazione è di giorni $25^{\text{d}} 14^{\text{h}} 8'$; onde le macchie solari tornano rispetto a noi allo stesso punto del disco solare in giorni $27^{\text{d}} 12^{\text{h}} 20'$.

L' equatore solare sembra accompagnato da una vastissima atmosfera , che si dice *luce zodiacale* (297) .

Della rotazione lunare, e della librazione.

960. La luna presenta alla terra sempre appresso a poco la stessa faccia; ma noi siamo situati dentro alla di lei orbita; e se fossimo al di là della stessa in grandissima distanza, vedremmo successivamente tutti i punti della sua circonferenza; dal che ne segue che la luna gira sul suo asse.

961. Questa rotazione sembra uniforme, ma tale non essendo il moto di rivoluzione, ne segue una librazione, o un piccolo cangiamento di 7, 8 gradi nella parte visibile del disco lunare, la qual differenza è alle volte uguale all'ottava parte del disco lunare.

Galileo che fu il primo ad osservare le macchie della luna dopo scoperti i telescopj (*Nunc. sydereus* 1610), fu anche il primo a vedere la librazione della stessa. E vide esservi una librazione in latitudine, prodotta dalla inclinazione dell'orbita lunare, e dal parallelismo costante dell'asse. Parlerò dunque prima di questa librazione di cui parlò prima l'inventore. Osservò che una delle due macchie dette *grimaldi* e *mare delle crisi* si accostava al lembo della luna; mentre l'altra si scostava dall'opposto.

962. Supponiamo che la luna rivolga sempre la stessa faccia allo stesso punto del cielo, e che uno de' suoi diametri, che chiamiamo *asse della luna* sia sempre inclinato per 2° all'eclittica. Sia T la terra (fig. 118), TE il piano dell'eclittica, TC una linea inclinata alla stessa per 2° , L il centro della luna, il di cui asse ILK sia perpendicolare a TC; quando la latitudine della luna, o l'angolo LTE è di 5° , l'angolo LTC è di 3° , come anche GLD; e una macchia posta in G sull'equatore lunare comparisce lontana dal centro apparente D della luna di 3° , o di $\frac{1}{19}$ del raggio lunare; ma dopo 14 giorni posta la luna in M a 5° di latit. australe, essendo l'angolo ETM di 5° , e CTM di 7° , la macchia ch'era in G si trova in Q, e la distanza della medesima dal centro apparente F, è FQ eguale all'angolo CTM = 7° ; onde la macchia situata nell'equatore comparisce in distanza di 7° al sud dal centro apparente F, mentre prima compariva per 3° più al nord; dunque comparisce per 10° più al sud, o più vicina al lembo meridionale della luna, che quando la latitudine della luna in L era boreale. Questo suppone la linea TC, cui l'asse è perpendicolare, immobile, o che l'asse ILK sia sempre parallelo a se stesso; ma vedremo (967) ch'egli ha un moto, insensibile per altro in 14 giorni.

963. Resta da spiegarsi la librazione in longitudine, che nasce dall'ineguaglianza del moto lunare per l'orbita. Il primo a parlar di questa ipotesi fu il Riccioli nel 1651. La terza ipotesi, dic' egli, sarebbe fondata sull'eccentricità della luna, se s'immaginiamo volgersi dalla luna sempre la stessa faccia non alla terra, ma al centro dell'eccentrico, in guisa che la linea condotta dal centro del globo lunare al centro dell'eccentrico, ch'essa percorre,

...

pas-

passasse sempre per lo stesso punto del globo lunare. Di questa ipotesi si servì l'Evelio, che l'avea trovata, com' egli dice nel 1648. Il Nevvton ancora e il Cassini se ne servirono, ed eccone la spiegazione.

964. Secondo la teoria del moto ellittico, il foco superiore F dell'orbita lunare A L P (*fig. 119*), è quello intorno a cui la luna gira con moto quasi uniforme (495): se dunque anche la rotazione della luna è uniforme, come lo mostra l'osservazione, la luna, compiuta la quarta parte della sua rivoluzione, presenterà al foco F il punto B della sua superficie, la cui direzione nell'apogeo A era secondo A F T, e perciò verso la terra. Ma in questa posizione del raggio L B F, essendo l'angolo F L T di 6 o 7°, il punto C della luna, ch'è diretto verso la terra e che forma il centro apparente della luna, è diverso dal punto B per 7° della circonferenza lunare; onde la macchia, ch'è in B (e che compariva nel centro apparente della luna quando era apogeo), adesso se ne vedrà lontana per 7°, o d'incirca una ottava parte del raggio lunare alla parte d'occidente; e questo veramente s'osserva. Se ne conchiude la durata della rotazione uniforme, ed eguale al tempo della rivoluzione, senza considerare le ineguaglianze della rivoluzione stessa.

965. Non è facile a vedersi la ragione di questa perfetta eguaglianza fra il tempo della rotazione e della rivoluzione. Il Nevvton per via dell'attrazione della terra sulla luna avendo trovato, che il diametro della luna diretto verso la terra, deve eccedere di 180 piedi i diametri perpendicolari al nostro raggio visuale, conchiude che il diametro maggiore deve sempre appressarsi a poco dirigersi verso la terra; ed è vero, che l'equatore lunare deve infatti essere allungato secondo la direzione del diametro lunare diretto alla terra, perchè l'attrazione della terra è maggiore sulle parti più vicine.

D'altro canto per la rotazione lunare intorno all'asse, la luna stessa deve essere una sferoide schiacciata ai poli, e i di lei meridiani ellittici; e la luna perciò deve rappresentare come un uovo, indipendentemente dal di lei naturale allungamento.

966. Il Sig. de la Grange nel pezzo coronato dall'Accademia nel 1764 suppone col Nevvton la luna una sferoide allungata verso la terra, e trova che la luna stessa deve intorno al suo asse fare come un'oscillazione, in forza della quale la velocità della rotazione ora s'accelera; ora si ritardi: che in tal caso la luna deve presentarci sempre appresso a poco la stessa faccia, quantunque sul principio possa avere ricevuta una rotazione in se stessa non uguale alla durata della rivoluzione. Fa parimenti vedere, che la figura della luna può essere tale, onde la precessione dei di lei punti equinoziali, o la retrogradazione dei nodi dell'equatore lunare, sia in circa uguale al moto retrogrado dei nodi dell'orbita lunare, come lo mostrano le osservazioni.

967. I nodi e l'inclinazione dell'equatore lunare si determinano con tre osservazioni d'una macchia, come per l'equatore solare (959). Le longitudini delle macchie devono ridursi al centro della luna, e per de-

terminare l'inclinazione dell' equatore lunare , devesi scegliere il tempo , in cui le macchie sono più al nord , o al sud . Con tal mezzo si trovò l'inclinazione di 2° , e il nodo dell' equatore lunare sensibilmente sempre d'accordo col nodo dell' orbita lunare sull' ecclittica .

968. Dirò anche una parola sull' altezza dei monti della luna . Evelio osservò alcuni vertici di essi monti alle volte lucidi , quantunque lontani per la terza parte del raggio lunare dalla linea della luce : dal che si conchiude la loro altezza della 338 parte del raggio lunare , o d'una lega Francese . Sia BM (*fig. 120*) il raggio solare , che illumina la luna in quadratura , BE la parte illuminata , BH l' oscura , HM un monte lunare ; quando il raggio BM principia ad illuminare il vertice M , noti che sieno il lato TB e $BM = \frac{1}{13}$ del raggio TB , si risolverà il triangolo TBM , e si troverà $TM = \frac{1}{11}$, e perciò HM , eccesso di TM sopra il raggio TH . Il raggio della luna è $\frac{3}{11}$ del raggio terrestre , e questo di 3281000 toese (migl. geogr. 3425) : perciò HM sarà di toese 2643 (migl. geogr. 2 $\frac{3}{4}$) cioè maggiore d'una lega comune .

969. Galileo suppone quest' altezza anche maggiore , perchè disse d' aver osservata la distanza BM di $\frac{1}{10}$ del raggio lunare ; ma si devono preferire le osservazioni dell' Evelio più reiterate , e più esatte .

Della rotazione , e figura degli altri pianeti .

970. Le rotazioni degli altri pianeti non si verificarono sì facilmente come nel sole e nella luna . Il Cassini avendo vedute delle macchie in venere , giudicò la di lei rotazione compirsi in ore 23 ; ma non è sì facile giudicar di tale durata ; e al contrario scorgesi facilmente la durata di quella di giove in ore 9 56'. L' equatore di giove sembra inclinato alla sua orbita soltanto di 2 , o 3 $^{\circ}$, come in circa l' orbita de' satelliti . Lo schiacciamento di giove è sensibilissimo , avendo l' asse minore del diametro dell' equatore di $\frac{1}{14}$; effetto naturale della forza centrifuga in una rotazione sì rapida .

La rotazione di marte osservata dal Cassini 1666 , gli parve di 24 ^{h} 40'.

Quella di mercurio e saturno non si può osservare , per la troppa vicinanza dell' uno al sole e distanza dell' altro dalla terra .

971. Le fasi di saturno sono una cosa delle più singolari che s' osservino in cielo ; alle volte vedesi rotondo , alle volte con due anse ; sulle quali apparenze si disputò per lungo tempo , finchè l' Huygens nel 1659 diedene la spiegazione .

Saturno è cinto da un anello assai sottile , quasi piano , concentrico allo stesso , egualmente lontano in tutti i suoi punti ; è sostenuto dalla
gra-

gravità naturale e simultanea di tutte le sue parti , siccome sostterrebbe senza pilastri un ponte che cingesse tutta la terra .

972. Il diametro AB dell' anello di saturno (fig. 121) sta a quello del globo di saturno CD , come 7 : 3 secondo le misure del Sig. Pound ; lo spazio E che v' ha fra il globo e l' anello è in circa eguale alla larghezza dell' anello , o alquanto maggiore secondo l' Huygens , onde la larghezza dell' anello è $\frac{2}{3}$ in circa del diametro di saturno , e così parimenti gli spazj vacui e oscuri E , che si veggono fra il globo e le anse . La di lui inclinazione all' ecclittica è di $31^{\circ} 23'$, e la taglia a $5^{\circ} 17'$ di longitudine .

973. Questo anello alle volte svanisce ; e questa *fase rotonda* può essere prodotta da tre cause . Quando saturno è verso il 20 grado della vergine e dei pesci , il piano dell' anello trovasi diretto verso il centro del sole , e non riceve luce che nella sua grossezza , che non è gran fatto considerabile , onde abbia sì da lungi a vedersi : in tal caso saturno comparisce rotondo e senza anello , e ciò successe verso li 20 Ottobre 1773 ; in questo stesso caso si vede una fascia oscura , che passa per mezzo a saturno , e che nasce dall' ombra dell' anello sul di lui disco . Questo svanirsi dell' anello dura un mese in circa .

974. L' anello svanisce anche quando il di lui piano passa per il nostro occhio , diretto perciò verso la terra ; in tal caso non potremmo vedere che la di lui grossezza , la quale per altro non possiamo vedere perchè è troppo piccola , e perchè ci riflette troppo scarsa quantità di luce . Finalmente può svanire , quando il di lui piano passa fra il sole e noi ; perchè allora la superficie illuminata non è volta verso di noi ; finchè saturno si trova fra gli $11^{\circ} 20'$, e $5^{\circ} 20'$ di longitudine , allora il sole illumina la superficie meridionale dell' anello ; nel qual caso se la terra s' alza sopra la superficie settentrionale , non può vedere la luce dell' anello , e vedrà una fase rotonda . Così in uno stesso anno si ponno vedere svanire per due volte le anse , e altrettante ricomparire , come infatti fu osservato (*Mem. Acad. 1715*) .

975. Per es. la terra li 10 Ottobre 1773 si trovò nel piano dell' anello , il quale ci si occultò anche 8 giorni prima ; nè ricomparì che li 23 Gennajo 1774 , essendo già fino dalli 8 passato il sole al nord dell' anello ; perchè li bisognavano appresso a poco 15 giorni , onde potesse il sole alzarosi di molto sopra il piano dell' anello , investirlo di luce bastante a mostrarcelo ; ma siccome saturno gli 8 Settembre fu in congiunzione col sole , così fu difficile di osservarne la prima occultazione . Li 24 Marzo , tornando la terra verso il piano dell' anello , questo svanì per la seconda volta fino agli 11 Luglio , in cui la terra forpasserà di nuovo lo stesso piano ; da questo tempo poi per 15 anni non ci si occulterà più questo anello ; io l' ho provato e calcolato nelle *Mem. de l' Acad. 1773* .

Della pluralità de' mondi.

976. La somiglianza che finora abbiamo veduto fra i pianeti e la terra, persuase i maggiori filosofi, che i pianeti fossero destinati ad avere abitanti. La pluralità de' mondi si trova già nelle orfiche, antiche poesie greche attribuite ad Orfeo (*Plaut. de Plac. phil. L. 2. c. 13.*); i Pitagorici Filolao, Niceta, Eraclide, insegnavano che gli astri erano altrettanti mondi (*Plut. L. 2. c. 13 & 30*). Achille Tazio, *Isag. ad Arati phæn. c. 10*. Diog. Laerr. in *Emped.* Molti antichi filosofi sostenevano anche una infinità di mondi fuori della nostra vista. Epicuro, Lucrezio (*L. 2. v. 1069*) e tutti gli Epicurei erano della stessa opinione; e Metrodoro diceva che l'ammettere un solo mondo nello spazio infinito, era tanto assurdo, quanto il dire, che in una vasta campagna non potrebbe germogliare che una sola spica (*Plut. L. 1, c. 5*): Xenofane, Zenone d' Elea, Anaximene, Anaximandro, Leucippo, e Democrito la pensavano nello stesso modo. Finalmente vi furono filosofi, i quali sostenendo per unico il nostro mondo, accordavano abitatori alla luna; tale fu Anassagora (*Macrobi. Somn. Scip. l. 1, c. 11*), Xenofane (*Cic. Acad. quæst. L. 4*), Luciano (*Plut. de oracul. defectu, de facie in orbe lune*). Di queste opinioni degli antichi se ne può vedere una buona serie in Fabricio (*Bibliot. Gr. T. 1, c. 20*) e nella memoria del Sig. Bonamy (*Acad. des inscr. tom. IX*). Evelio chiama *Seleniti* gli abitanti della luna, e va esaminando tutti i fenomeni, che si osservano nel loro pianeta (*Selenogr. p. 294*) secondo l'esempio del Keplero (*Astron. lunaris*).

977. La pluralità dei mondi fu dipinta con tutte le grazie e lo spirito, di cui possono adornarsi le congetture fisiche, dal Sig. de Fontenelle. L' Huygens (che morì nel 1695) nel suo libro intitolato, *Cosmotheoros*, parla molto a lungo sullo stesso punto. E infatti havvi fra la terra e i pianeti una somiglianza tanto perfetta, che se supponiamo la terra destinata a ricevere abitatori, non possiamo dispensarci dall'accordarli ancora a' pianeti: e se concepiamo qualche necessario rapporto fra l'esistenza del globo terrestre, e quella degli uomini, siamo costretti a dilatarlo fin nel pianeti; e chi ricusasse la forza di tale ragionamento, sarebbe simile a chi credesse contenersi in alcune pecore d'una greggia tante pietre, avendo veduto avervi in altre gl'intestini.

978. Sei pianeti sonovi intorno al sole, il terzo è la terra; tutti girano per orbite ellittiche, ed hanno tutti un moto intorno all' asse, come la terra: tutti hanno macchie, ineguaglianze, monti, come la terra; ve n' hanno tre circondati da' satelliti, la terra ne ha uno soltanto; giove è schiacciato ai poli come la terra; finalmente non v' ha contrassegno alcuno di somiglianza, che non s' offervi in fatto tra i pianeti e la terra; puossi egli supporre, che l'esistenza degli esseri viventi si restringa alla sola terra? Su quale altro fondamento sarebbe piantato tal privilegio, che sulla ristretta e timida immaginazione di coloro che non fanno passare oltre gli oggetti al senso loro sottoposti? Quanto ho detto dei sei pianeti

neti che girano intorno al sole, s' estenderà naturalmente a tutti i sistemi planetarj, che circondano le stelle; ciascuna di esse sembra essere un corpo luminoso e immobile come il sole, e se il sole è creato per moderatore e rischiaratore dei pianeti che lo cingono, lo stesso deeſi giudicare delle stelle; e se la esistenza degli abitatori terrestri ha qualche necessario rapporto coll' esistenza del globo terrestre, si devono supporre degli abitatori anche negli altri pianeti.

979. Vi furono alcuni scrittori timidi, che riprovarono un tale sistema come contrario alla Religione; ma questo è un sostenere affai male la gloria del Creatore: se l'estensione delle di lui opere ne annunzia la potenza, quale idea più magnifica, e più sublime di questa? Noi scorgiamo a occhio nudo molte migliaia di stelle, non v' ha parte di cielo in cui col telescopio altrettanto non se ne scoprano, quante coll' occhio nudo se ne veggono in un emisfero; e se si adoperano telescopj maggiori, scopresi un nuovo ordine di cose, e una nuova moltitudine di stelle, di cui nè anche si sospettava; e quanto più perfetti strumenti si adoperano, tanto più si moltiplica e si estende questa infinità di nuovi mondi; ma il pensiero passa al di là del telescopio più perfetto, e scopre una nuova moltitudine di mondi infinitamente maggiore di quella, di cui un solo leggero indizio ci pararono innanzi i deboli nostri sensi: l'immaginazione s' estende già anche più, e va inutilmente cercando confini; che spettacolo sorprendente!



LIBRO DUODECIMO.

Della gravità, o attrazione de' pianeti.

La gravità è quella forza, che proviamo ogni momento, per cui tutti i corpi poggiano sulla terra, o in essa discendono da per se stessi, se vi si allontanano.

980. Questa gravità è l'effetto d'una forza universale, diffusa in tutta la natura, e che risiede in ogni corpo, come nella terra (989); ma è necessario esaminarne, prima di dimostrarlo, i di lei effetti sulla terra, e poi la considereremo in tutto l'Universo.

981. Il primo fenomeno che si osserva nella gravità de' corpi terrestri, si è la velocità, con cui cadono verso terra; ogni corpo, qualunque sianella grandezza, estensione, volume, densità e massa, nel primo secondo di tempo della sua caduta verso terra percorre 15 piedi (più esattamente sotto l'equatore 15, 0515); nel seguente min. sec. ne percorre il triplo, nel terzo il quintuplo, e gli spazj stessi sono come la serie de' numeri dispari 1; 3, 5, 7, 9 ec. Galileo fu il primo a scoprire tal legge, che restò poi confermata da tutte le sperienze.

982. Da questa legge ne risulta chiaramente che gli spazj sono come i quadrati 1, 4, 9, 16 dei tempi 1, 2, 3, 4.

983. La natura stessa della cosa mostra questo fatto provato già dalle sperienze; essendo la gravità una forza continua, ella agisce perpetuamente sul corpo durante la di lui caduta; e perciò gli spazj devono essere come i quadrati dei tempi. Il tempo che spende il corpo a discendere esprimasi colla linea BK (fig. 122) divisa in parti eguali BG, GM; le velocità del corpo cadente s'accreiscono colla stessa proporzione del tempo; poichè ad ogni istante di tempo s'aggiunge al corpo un nuovo grado di celerità eguale al precedente, con cui si unisce insieme; onde tali velocità possono giustamente esprimersi colle ordinate GH, KL del triangolo, le quali crescono uniformemente, cioè come i tempi BG, BK. Gli spazj percorsi in un dato tempo devono essere maggiori quanto sono maggiori il tempo, e la velocità; onde gli stessi spazj potranno esprimersi coi prodotti delle linee BG, GH; e BK, KL ec. cioè colla superficie dei triangoli corrispondenti; ma questi triangoli sono fra loro come i quadrati delle linee BG, BK; dunque sono gli spazj fra loro, come i quadrati dei tempi.

984. Ma le velocità sono come i tempi, dunque gli spazj sono anche come i quadrati delle velocità; e le velocità come le radici quadrate degli spazj, cioè delle altezze, dalle quali cadendo i gravi acquistano quella celerità. Si può anche dire, che le velocità sono come le radici delle altezze duplicate, cioè degli spazj, che sarebbero percorsi uniformemente colle stesse velocità acquistate.

985. Questa proposizione deveſi intendere d' ogni forza attrattiva coſtante , cioè d' ogni forza che agiſce uniformemente , coſtantemente , e ſenza interruzione : in tal caſo gli ſpazj percoſti ſono neceſſariamente come i quadrati de' tempi ; ſi fa ſpeſſo uſo di queſta eſpreſſione , cioè : ſempre ſupponeti , che ſe f è la forza , ds il piccolo intervallo di tempo , e ds il piccolo ſpazio , deveſi avere $f ds^2 = ds$; coſi per paragonare la forza d' un qualunque pianeta colla forza con cui la terra agiſce ſopra i corpi gravi , ſuppoſta f la forza acceleratrice d' un altro pianeta , per eſ. la luna , in guiſa che f ſia $\frac{1}{70}$ della forza della terra , in eguale diſtanza , e ds un numero di ſecondi , per eſ. 4 , lo ſpazio percoſto in vigore di queſta forza f in 4" ſarà : $f ds^2 = \frac{1}{70} \cdot 16$, o $\frac{16}{70}$ della 15 piedi , che per la forza della terra percorre un corpo terreſtre (981). Se la forza non ſia coſtante e uniforme , l' accreſcimento della velocità in ciaſcun momento ſarà in ragione compoſta della forza e del tempo , durante il quale queſta forza agiſce.

986. Dal riſultarne in vigor delle forze acceleratrici coſtanti , che gli ſpazj ſono come i quadrati de' tempi , io ho conchiuſo che l'equazioni ſecolari devono eſſere come i quadrati de' tempi (455), e queſto ſegue dallo ſteſſo raziocinio ; perchè , ſe la cauſa agiſce ſempre egualmente , ſenza che l' effetto ſiane mai diſtratto , queſto effetto ſteſſo creſcerà come i quadrati dei tempi.

987. La ſteſſa legge ſ' oſſerva nei moti celeſti . Un pianeta ſi muove in una orbita ſoltanto perchè v è continuamente ritenuto da una forza centrale (479 e ſeg.); coſi la piccola linea AB , (fig. 123) che rappresenta l' effetto della forza centrale , e la quantità , di cui eſſa forza ritira il pianeta dal moto rettilineo PA , è come il quadrato dei tempi , che ſono eſpreſſi dai piccoli archi deſcritti , come PB ; ſiccome ſi dimoſtra nel ſeguento lemma .

988. Il ſeno verſo AE (fig. 124) d' un arco infiniteſimo AP , è uguale ad $\frac{AP^2}{AD}$; perchè per natura del cerchio $EP^2 = AE \cdot ED$; onde $AE = \frac{EP^2}{ED}$, ma ED è lo ſteſſo che AD per eſſere AE un infiniteſimo ; e il ſeno EP è lo ſteſſo che l' arco AP , per eſſervi tra loro un infiniteſimo del terzo ordine ; dunque ſarà $AE = \frac{AP^2}{AD}$: cioè i ſeni verſi , o gli ſcoſtamenti delle tangenti dalla curva , ſono come i quadrati dei piccoli archi corriſpondenti .

989. Eſaminiamo adeſſo , ſe l' effetto della gravità che abbiamo viſto ſulla terra , abbia parimenti luogo negli altri corpi celeſti . E toſto la loro figura rotonda dimoſtra , aver in eſſi luogo queſta ſimile gravità . La terra fino dal punto della ſua nascita ſ' è ridotta rotonda , e coſi anche il mare , perchè tutte le parti tendono a un centro comune , intorno a cui ſi dispongono per equilibrarſi : non conſideriamo qui il piccolo ſchiacciamento prodotto dalla forza centrifuga (1009). Queſto equilibrio non ſi avrebbe , ſe una parte dell' oceano foſſe più d' un' altra lontana dal centro (809); e quindi è che la reciproca gravità delle parti d' un corpo lo rende rotondo .

M m

990. V'

990. V'ha dunque in tutti i pianeti una gravità simile a quella che s'osserva in terra; onde è naturale il conchiudere, che nella materia in generale v'ha una forza attraente, e dove si ha materia, ivi sempre v'ha questa forza. Seguiamo dunque i progressi delle nostre cognizioni, e vediamo come si sia scoperta questa celebre legge dell'attrazione universale, origine di tante altre scoperte, da cui ogni giorno se ne cavano tuttavia conseguenze singolari, e le più uniformi all'osservazione.

991. Anassagora, Democrito, Epicuro ammettevano già questa tendenza universale della materia verso i centri comuni, o nella terra, o altrove. Plutarco schiettamente ne parla nell'opera della cessazione degli oracoli, in cui spiega come ciascun mondo ha il suo proprio centro, le sue terre, i suoi mari, e la forza necessaria per unirli tutti e trattenerli intorno allo stesso centro.

Copernico la pensava del pari sull'attrazione generale, perchè attribuiva la rotondità dei corpi celesti alla tendenza, che hanno le loro diverse parti a riunirsi (*de Revol.* c. 9). Ticone stesso ammetteva una forza centrale nel sole (407), per ritenere intorno a se i pianeti nelle loro orbite, sebbene si conciliasse difficilmente quest'attrazione col di lui sistema. Keplero, genio più vasto e più intraprendente di tutti i suoi antecessori, dilatò più le sue idee, vide che l'attrazione era generale e reciproca, e che l'attrazione del sole dovea estendersi fino in terra (*De Stella Martis*, 1609. *Epit. Astron. Cap.* 1618, pag. 555. *libb. dei Math. par M. Montucla*, 1758, tom. II. pag. 213, 527, 538). Nella prefazione di questo libro insigne, in cui Keplero il primo di tutti dimostra che l'orbita de' pianeti non sono circolari (468), s'esprime precisamente dicendo, che se la luna e la terra non si movessero in giro, l'una s'accosterebbe all'altra, e si unirebbero insieme nel loro centro comune di gravità: E in altro luogo, che l'azione del sole produce le disuguaglianze della luna, l'azione della luna il flusso e riflusso del mare, che il sole tira i pianeti, e n'è da essi attratto.

992. E infatti i fenomeni lo provano; la gravità de' corpi terrestri s'estende sopra alle sommità de' monti, fino alle parti più elevate dell'aria, di dove la grandine cade con impeto, tosto che si è formata dal freddo; erà dunque chiaro che tale gravità dovea estendersi più lungi dalla terra; così non era difficile scorgere la luna stessa soggetta alla medesima forza della terra, da cui non è molto lontana, intorno a cui gira, ed a cui presenta sempre la stessa faccia. I corpi, che girano in circolo, scappano tosto per la tangente, se non ne sono trattenuti (749); la luna avrebbe fuggire per la tangente del cerchio che descrive, (come una goccia d'acqua da una ruota che gira) se la terra non lo impedisse. Con questo raziocinio stesso trovò il Newton la legge di questa gravità (997).

993. Vedendo Keplero, che la luna era attratta dalla terra, e che ciaschedun pianeta aveva la sua gravità (989), doveva conchiudere, che anche la luna tirava la terra; ma considerando che le acque del mare si alzano ogni giorno, quando la luna passa per il meridiano, non dubitò più che questo effetto non nascesse dall'attrazione lunare.

Su

Su di tale gravità s' esprime in modo notevole il Keplero nella sua nuova fisica celeste (468). Vedeva chiaramente tutti i pianeti soggetti al sole , e la luna alla terra , come veggiamo i corpi terrestri ; vedeva che quest' attrazione era generale in tutti i corpi dell' universo ; che due pietre si unirebbero insieme per la scambievole loro attrazione , se uscissero dalla sfera d' attività della terra ; che le acque del mare si porterebbero nella luna , se non fossero attratte dalla terra , e che la luna cadrebbe in terra , se si privasse della forza , per cui descrive la sua orbita .

Il paragone fra le attrazioni celesti e quelle della calamita , sembrava ancora più naturale al Keplero , dopo che Gilberto Fisico Inglese mostrò , che la terra era come una specie di gran calamita : *Perbellum equidem attigi exemplum magnetis , Et omnino rei conveniens , ac parum abest quin res ipsa dici possit . Nam quid ego de magnetis tanquam de exemplo ? Cum ipsa tellus , Gulielmo Gilberto Anglo demonstrante , magnus quidam sit magnetis* (cap. 34 , p. 176) .

994. Leggendo l' opere di Keplero devono persuadersi i Saggi , che quest' attrazione della materia è universale ; e di essa infatti anche prima del Nevton se ne parlava in Inghilterra , ed in Francia .

Nel Fermatizio si legge il seguente passo (*Var. op. Math. pag. 24*) : *La comune opinione si è , che la gravità è una qualità che risiede nel corpo stesso che cade ; altri credono che la caduta dei corpi dipenda dall' attrazione d' altro corpo , che attrae quello che discende , come la terra . Havvi una terza opinione (che non è fuori di verisimiglianza) che ciò nasca da una scambievole attrazione su i corpi , prodotta da un desiderio naturale d' unirsi insieme , come vedesi nella calamita e nel ferro , in cui se la calamita si tenga ferma , il ferro va ad unirsi , e viceversa ; e se si lasciano ambedue liberi , s' avvicinano insieme scambievolmente , e il più forte farà meno strada .*

995. Bacone nel celebre suo libro (*Novum organum L. II. art. 36 , 45 , 48*) parla spesso sull' attrazione magnetica della terra sui corpi gravi , della luna sull' acqua del mare , del sole su mercurio e venere ; e propone delle sperienze proprie a verificare queste attrazioni ; e quantunque leggendo questa opera , non s' ammiro l' autore informato di astronomia , quanto però dice delle attrazioni celesti era proprio ad eccitare idee luminosissime sulla gravità universale .

Anche il Galileo riconosceva questa simpatia della luna con la terra : Evelio sul punto delle comete attribuisce una forza simile al sole :

L' attrazione generale è il principal fondamento del libro pubblicato dal Roberval nel 1644 col titolo : *Aristarchi Samii de mundi systemate liber* . Egli attribuisce a tutte le parti della materia componente l' universo , la proprietà di tendere le une verso le altre ; quindi , dice , si dispongono sfericamente ; non già in forza d' un centro , ma della mutua loro attrazione , e per equilibrarsi le une colle altre .

996. Questa scambievole attrazione di tutti i corpi celesti trovasi espressa positivamente in un libro del Dottore Hook citato (765) : *Io spiegherò , dic' egli pag. 27 , un sistema del mondo diverso in ogni parte da*

tutti gli altri, ma perfettamente concorde con le regole ordinarie della meccanica; egli è piantato sopra queste tre proposizioni; 1.^o Che tutti li corpi celesti, meno eccettuato, hanno un' attrazione o gravitazione verso il suo proprio centro, con cui essi attraggono non solo le proprie loro parti, onde non se ne allontanano, come veggiamo sulla terra; ma attraggono altresì gli altri corpi celesti, che si trovano nella sfera della loro attività 2.^o Che tutti li corpi, che hanno ricevuto un moto semplice e diretto, seguono a muoversi in linea retta, finchè qualche altra forza efficace non li disturbi, e li costringa a descrivere un cerchio, un' ellissi, o altra curva composta. 3.^o Che le forze attrattive sono maggiori nei loro effetti, quanto il corpo, su di cui agiscono, è più vicino al loro centro. In quale proporzione poi si diminuiscono se s' accrescano le distanze, non l' ho ancora trovato Io apro questo campo a chi si diletta, e a chi è informato di fisiche dottrine. Questa legge che proponeva da trovarsi è appunto quella che cercò il Nevvton; quindi è ch' egli cita il Dott. Hook de mundi systemate (Nevvtoni opuscula, 1744, II. 6). Veggasi la traduzione di Madama du Chatelet, e l' Histoire de Math. del Montucla, 1758, T. II, pag. 527.

Non vi voleva dunque altro che un geometra, che scoprisse la legge, secondo cui si diminuisce l' attrazione. Pittagora la sapeva, come osserva Gregori, nella prefaz. della sua astronomia; ma erasi andata nell' obbligo; e non era dimostrata; onde bisognava di nuovo scoprirla e dimostrarla; e il Nevvton ebbe la gloria di farlo. Per darne la storia di questa scoperta, voglio tradurre un passo d' Enrico Pemberton contemporaneo e amico di Nevvton.

- 997. Le prime idee, onde ebbero origine i principj di Nevvton, gli si citarono nel 1666, quando lasciò Cambridge per causa della peste. Passeggiava solo per un giardino, meditando sulla gravità, e sulle di lei proprietà; questa forza non isfuma sensibilmente nè anche sulle sommità delli più alti monti; era dunque naturale di conchiudere, che questa potenza deve estendersi assai più lungi. Per qual ragione, diceva egli, non giungerebbe fino alla luna? E se ciò è vero, questa gravità influirà sul moto della luna; ritiene dunque forse ella la luna nella sua orbita? E sebbene in piccole distanze non s' indebolisca questa forza, può nonnostante darsi, che questa nella distanza della luna resti molto diminuita. Per trovare una tale diminuzione, il Nevvton giudicò, che se la luna fosse ritenuta dalla forza di gravità nella sua orbita, anche i pianeti girerebbero intorno al sole in vigore della stessa forza. Paragonando i periodi di varj pianeti colle loro distanze dal sole, trovò, che se una forza simile alla gravità riteneva i pianeti nelle loro orbite, la forza stessa dovrebbe diminuirsi in ragione inversa dei quadrati delle distanze (3012). Suppose dunque che la forza della gravità s' estendesse fino alla luna, e si diminuisce nella stessa ragione, e calcolò se questa forza fosse bastante a ritenere la luna nella sua orbita. Egli trattava questi calcoli in un tempo, in cui non aveva fra le mani i libri che gli sarebbero stati necessari, e suppose, secondo la stima de' geografi e marinari, colla misura della terra trovata da Norwood (800) che un grado di latitudine terrestre contenga 60. miglia Inglesi; ma siccome questa ipotesi era difettosissima,

(con-

(contenendone un grado miglia $69 \frac{1}{2}$) così il calcolo non corrispose alla sua aspettazione ; e credette che qualche altra causa unita alla forza di gravità agisce sulla luna , e lasciò queste tali ricerche . Alcuni anni dopo per una lettera del Dott. Hook si mise a cercare quale sia la vera curva descritta da un grave cadente , e strascinato dal moto della terra intorno all' asse . Quindi si aperse al Newton nuovo incontro di ripigliare le sue prime idee sulla gravità della luna . Picardo aveva allora misurato in Francia il grado della terra (802), e adoperando queste misure trovò il Newton , che la luna era ritenuta nella sua orbita per la sola forza della gravità (1014), dal che ne seguiva , che la gravità stessa diminuisce in distanza dal centro della terra secondo la proporzione che aveva altre volte congetturata . Dopo questo principio il Newton trovò che la linea descritta da un grave cadente era un' ellissi , un foco della quale era nel centro della terra ; ma i pianeti primari descrivono parimenti delle ellissi intorno al sole (468), egli ebbe dunque la soddisfazione di vedere che questa soluzione intrapresa per pura curiosità , poteva applicarsi alle più grandi ricerche . Quindi dimostrò una dozzina di proposizioni relative al moto de' pianeti primari intorno al sole . Molti anni dopo il Dottore Halley essendosi portato a visitare il Newton a Cambridge , l' impegnò nelle sue conversazioni a ripigliare le sue meditazioni su questo punto , e quindi ebbe origine la grande opera dei Principj , che si pubblicò nel 1687 , (a *Writv of Sir Isaac Newton's Philosophy* , London 1728 , in 4.^o *Préface*).

998. Aggiungerò , che il Newton aveva molti indizj sotto gli occhi di questa attrazione ; la diminuzione del pendulo nella Cayenna (805); lo schiacciamento di giove , la librazione dell'apogeo della luna indicata dall' osservazione dei diametri della stessa , misurati dal Picard , e dall' Auzout con i loro nuovi micrometri .

Dopo ciò quest' attrazione universale dei pianeti , e la scambievole tendenza dell' uno verso dell' altro , fu dimostrata in sì varie guise , e le conseguenze che se ne traggono sono tanto concordi coi fenomeni , che non è più possibile di rivocarla in dubbio .

999. Ecco una ristretta enumerazione dei fenomeni osservati ; ciascuno dei quali basterebbe per provarla , anche senza degli altri , che in numero di quindici , formano quindici diverse prove di questa universale attrazione . I. il flusso e riflusso del mare somministra due volte al giorno la prova la più palpabile e convincente agli occhi di ciascheduno dell' attrazione lunare , e tutti i fenomeni del quale s' accordano realmente coi calcoli dell' attrazione del sole e della luna (1082). II. Le ineguaglianze della luna , che visibilmente dipendono dal sole (563). III. Il moto de' pianeti intorno al sole (479) secondo la legge , che i cubi delle distanze sono come i quadrati dei tempi (1012). IV. La figura ellittica delle orbite della luna intorno alla terra , di tutti i pianeti , e comete intorno al sole . V. La precessione degli equinozj (1064). VI. La nutazione dell' asse terrestre prodotta dall' azione lunare (1069). VII. Le ineguaglianze , alle quali vanno soggetti giove , saturno , e tutti li pianeti ,

in

in varie loro situazioni . VIII. Le prodigiose ineguaglianze della cometa del 1759 , la di cui ultima rivoluzione fu maggiore della precedente di 585 giorni secondo il calcolo delle attrazioni di giove , e di saturno (931). IX. Lo schiacciamento di giove , e della terra (1074). X. L' attrazione , che i gran monti esercitano sul pendolo (822). XI. Il cangiamento di latitudine e di longitudine nelle fisse (757). XII. La diminuzione della obliquità dell' ecclittica (758). XIII. Il moto negli apodi de' pianeti (514), specialmente dell' apogeo lunare (559). XIV. Il moto ne' nodi dei pianeti tutti (518), specialmente in quei della luna , considerabile e sensibile in modo , che l' orbita della medesima nel corso di nove anni si rovescia intieramente , e passa in distanza di 10° da quelle fisse , che prima occultava (568). XV. Le ineguaglianze de' satelliti di giove (845).

La maggior parte di questi quindici fenomeni è inesplicabile per via de' vortici e del pieno ; e l' avere provata l' esistenza di questi fenomeni , e il modo onde dipendono dall' attrazione , è lo stesso che avere dimostrata l' impossibilità del sistema Cartesiano . Nè può esservi al giorno d' oggi un qualche geometra , o astronomo , leggermente informato dei fenomeni , e delle nuove teorie , che prestì ancora fede ai vortici e al pieno , o che rigetti l' attrazione Newtoniana .

1000. Molti celebri Fisici si sforzarono di spiegare la legge universale dell' attrazione per via d' una causa impulsiva , d' un fluido , d' un moto degli atomi ec. (Veggasi specialmente l' *Essai de Chymie Mécanique* del Sig. le Sage di Ginevra , che fu coronato dall' Acad. di Rouen , e la lettera dello stesso Autore nel Mercurio di Maggio 1746). Ma con che profitto , e progresso ? resterebbe ancora da spiegarsi la causa di questo moto primitivo ; e le cause prime non sono a portata della nostra mente .

In quanto a me io la penso , come il Sig. de Maupertuis , e come il più de' Metafisici Inglese , che l' attrazione dipenda da una proprietà intrinseca della materia . „ Se questa proprietà (dice il Maupertuis *Discours sur les diff. fig. des Astres* 1732) si trovi metafisicamente impossibile , i fenomeni più singolari della natura non potrebbero farcela adottare ; ma se non v' ha in essa nè impossibilità , nè contraddizione , si può liberamente esaminare , se li fenomeni la provino sì o no ; perchè in tal caso l' attrazione non è che una questione di fatto , e devesi nell' universo e nella natura cercare , se questa sia un principio , che v' abbia luogo . Ma certamente nella legge dell' attrazione non si scorge alcuna metafisica impossibilità , o contraddizione , perchè niente v' è che dimostri la contraddittoria proposizione : *I corpi celesti non s' attraggono* . Io mi lusingo che non mi si opporra , che una tale proprietà nei corpi , di gravitare l' uno verso l' altro , è meno intelligibile di quelle che il Mondo tutto vi riconosce . Il modo , con cui le proprietà risiedono in un soggetto , è per noi intelligibile ; e non restiamo punto sorpresi dal vederli comunicare un moto ad altri corpi , perchè l' abito e l' uso di vedere un tale fenomeno , ci rende insensibili al maraviglioso che vi si contiene ; ma in fine la forza impulsiva tanto difficilmente si concepisce come l' attraente ; perciocchè

chè che cosa è ella questa forza impulsiva ? Come vi rifiede nei corpi . E prima di vedere i corpi urtarsi uno coll' altro , chi avrebbe indovinato che vi rifieda ?

L' esistenza delle altre proprietà ne' corpi non è meno difficile a concepirsi , e siamo costretti di supponer alcune leggi primitive , delle quali non sappiamo nè la causa , nè l' origine ; la loro sola esistenza è soggetta allo spirito dell' uomo , e sopra tutto del geometra . „

1001. Supposta dunque l' esistenza dell' attrazione universale cerchiamone gli effetti ; l' accordo dei quali con i fenomeni osservati e noti , ci mostrerà la certezza ed evidenza di questa legge .

Supponiamo , come da tutti si pratica , l' attrazione proporzionale alla massa , o quantità di materia attraente ; ciò non si può col fatto dimostrare , perchè non si può giudicare della quantità di materia che per mezzo del peso , o dell' attrazione : ma , giacchè non si può dimostrare il contrario , è naturale il supporre che ciascuna particella è dotata della stessa proprietà ; cioè , che l' attrazione di due particelle farà doppia dell' attrazione di una sola , e in genere l' attrazione proporzionale alla quantità di materia .

La forza , con cui un pianeta è attratto , non dipende già dalla massa del pianeta stesso che n' è attratto ; perchè se una sola particella di materia è attratta con una forza f , tutte le particelle unite ad essa , sono ciascheduna attratte colla stessa forza f ; non essendovi alcuna ragione , per cui la seconda debba essere tirata meno della prima , non cangiandosi punto la forza che tira la prima dalla presenza della seconda ; dunque la forza attraente non dipende che dalla massa che attrae , non già dalla massa che resta attratta .

1002. Si praticano nella recente geometria certe espressioni compendiarie , che non sogliono essere spiegate dai geometri , ma che imbarazzano nonnostante i principianti : tale è l' espressione $\frac{S}{r^2}$ con cui s' esprime la forza impiegata dal sole , la di cui massa si suppone S , sopra un pianeta nella distanza qualunque r ; si tratta d' una forza attraente , che si suppone uguale a una massa S divisa per il quadrato d' una distanza r ; e per essere le forze , le masse , e le distanze , cose eterogenee tra loro , non s' intende a prima vista , come possa darli tra loro eguaglianza .

Per concepirlo bisogna considerare , che quando si conviene nella scelta delle unità , tutte le altre quantità della stessa specie si possono prendere per frazioni di esse unità , e che le frazioni non indicano se non che una proporzione , da cui s' è tratta l' equazione . L' effetto d' una forza non si calcola se non che paragonandola con un' altra forza ; così , presa la terra per termine di paragone , e supposta la massa S del sole 365412 volte maggiore di quella della terra , e il raggio del sole r , 113 volte maggiore del raggio terrestre , $\frac{S}{r^2}$ farà $(\frac{365412}{113^2}) = 29$ in circa ; cioè che l' attrazione del sole sopra dei corpi situati nella sua superficie è 29 volte maggiore di quella ch' esercita la terra sopra i terrestri , i quali perciò in vece di percorrere 15 piedi in un secondo (981 , 1009) come i terrestri ,

refratti, ne percorreranno 434; perchè la sola massa ad eguale distanza farebbe percorrere 5500000 piedi, ma a una distanza 113 volte maggiore, l'attrazione è 12720 volte minore (1012); dunque il sole farà percorrere verso la sua superficie 434 piedi in un secondo, invece di 15, e la forza $\frac{S}{r^2}$ equivale a 29, presa la massa della terra per unità.

1003. Se vogliansi sapere le perturbazioni cagionate nella luna dalla forza del sole, si dovrà esaminare il rapporto che v' ha tra la forza dello stesso sole, con cui disturba la luna dalla di lei orbita, e la forza della terra, con cui ve la ritiene, per trovare quanto la prima oppongasi alla seconda. In un tal paragone di forze prendesi per unità la massa di un pianeta, e le altre masse s'esprimono con frazioni di questa unità; si prende parimenti una distanza per unità, e le altre distanze si esprimono o con unità, o con frazioni della prima distanza, cioè si paragona una frazione coll'altra. Per esempio si può fare questa proporzione la forza del sole sopra la luna, che diremo S , sta alla forza della terra sopra la stessa luna, nelle sue medie distanze, in ragione composta della massa del sole colla massa della terra, e del quadrato della distanza media della luna dalla terra, col quadrato della distanza media del sole dalla luna, cioè come la massa del sole divisa per il quadrato della sua distanza dalla luna, o per r^2 , alla massa della terra divisa per il quadrato della sua media distanza dalla luna. Prendasi la massa della terra per unità delle masse, e la distanza della luna dalla terra per unità delle distanze, e la forza, con cui agisce la terra sopra la luna nelle medie distanze, per unità delle forze. In tal caso dalla proporzione precedente si caverà la forza del sole sulla luna eguale a $\frac{S}{r^2}$.

1004. Quando si tratta delle perturbazioni, alle quali va soggetto un pianeta per l'attrazione d'un altro, si adoperano le medesime espressioni; per es. la massa del sole, ch'è 1, ritiene la terra nella sua orbita a una distanza ch'è 1. Giove turba quest'azione con la sua massa 1000 volte minore di quella del sole (1010); perciò la di lui massa potrà dirsi $\frac{1}{1000}$; e siccome giove stesso agisce a una distanza 5 volte in circa maggiore di quella del sole (450), così la di lui azione è 25 volte minore dell'azione del sole, e perciò la forza $\frac{1}{1000}$ si dovrà rendere 25 volte minore, e si dovrà scrivere $F = \frac{1}{25000}$, per avere la forza di giove sulla terra, ch'è una vigesima quinta millesima parte della forza del sole sulla stessa terra; e questa è quella forza, il di cui effetto cercasi col calcolo integrale, sciogliendo il problema de' tre corpi; si cerca cioè quanto dovrà alterarsi il moto della terra per una forza che in ogni momento è $\frac{1}{25000}$ di quella, che ritiene la terra stessa nella sua orbita, ma in cui si varia sempre la direzione.

Nel-

Nelle orbite circolari.

1005. Le orbite de' pianeti sono ellittiche (468), ma le leggi dell'attrazione troverebbero luogo nello stesso modo nei moti circolari, perchè i cerchi sono essi pure ellissi, l'eccentricità delle quali è infinitamente piccola; e siccome la considerazione delle orbite circolari è molto più facile, così m'attengo alla stessa. Sia P un pianeta (fig. 123) che descrive intorno al sole S il cerchio PEB per l'attrazione dello stesso sole, e si piega in B in vece di seguire il suo cammino per la linea retta PA (479). E già principio noto e abbracciato, che un corpo in moto segue a muoversi in linea retta, se non incontra alcun ostacolo, e che un corpo che si muove in un cerchio, tosto che cessa la forza che lo fa girare per esso, scappa per la tangente (479). Così il pianeta descriverebbe PA se non fosse forzato dall'attrazione, ch'è nel centro S, a discendere da A in B; dunque AB è l'effetto o misura della forza centripeta per quel tempo, che misura l'arco PEB; e questo è sempre vero, di qualunque sorta sia l'arco PB, circolare, parabolico ec. poichè questa è la quantità di cui il pianeta è sviato dalla linea retta, o di cui s'avvicina al centro, e di cui veramente s'avvicinerebbe, se distruttasi nel pianeta ogni forza proiettile, fosse direttamente disceso verso del sole: la forza di proiezione perpendicolare al raggio solare, non può impedire che l'attrazione del sole non abbia il suo pieno effetto, per non essergli opposta.

1006. In fatti se il pianeta P non avesse ricevuto alcun moto proiettile da P in A, o pure se questo moto da P in A si distruggesse, il pianeta obbedendo alla sola forza centrale che agisce da P in S, discenderebbe colla stessa velocità PC eguale a BG, o a BA: perchè, preso il lato PB della curva per infinitesimo, diventa la diagonale del parallelogrammo CA; BA è lo spazio che sarebbe descritto per la forza centrale, se essa sola agisse; dunque il seno verso PC dell'arco PEB percorso in un sec. di tempo esprime la forza centrale, per cui è stato descritto. Ma il seno verso è come il quadrato dell'arco PB (988), dunque la forza centrale è come il quadrato della velocità; onde se si raddoppj la velocità, sarebbe necessaria una forza quadrupla per ritenere un pianeta in una stessa orbita.

1007. La quantità BA esprime anche l'effetto della forza centrifuga, cioè di quella forza, con cui i corpi tentano scostarsi dal centro intorno al quale girano (479); poichè BA è lo spazio, che il corpo libero descriverebbe allontanandosi dal centro S: ma $BA = PC, = \frac{CB^2}{2CS} = \frac{BP^2}{2PS}$ (988); dunque dal moto circolare ne proviene una forza centrifuga eguale al quadrato della velocità divisa per il diametro del cerchio, presa per unità la forza proiettile; dunque tanto la centrifuga quanto la centripeta sono nella stessa ragione.

Per esprimere la velocità d'un pianeta s'adopera un arco infinitesimo,
 N n per-

perchè questo solo resta descritto con moto uniforme, quale uniformità è necessaria per la misura del moto. Ma un arco infinitamente piccolo non s'incurva che d'una quantità AB , o BG , infinitesima del secondo ordine; dunque la forza centrale non può esprimersi che con una quantità infinitesima del secondo ordine; con che si prova la necessità delle differenze seconde, e del calcolo infinitesimale per queste ricerche.

1008. La forza centrifuga delle varie parti d'una sfera che gira intorno all'asse, è proporzionale ai raggi di ciascun parallelo; perchè la velocità di ciascuna parte è come il raggio del cerchio che descrive, cioè è PB proporzionale a PS ; dunque la forza centrifuga è proporzionale a $\frac{PS^2}{2P}$, cioè a PS , che diventa l'ordinata parallela all'asse maggiore dell'ellisse del meridiano, posta la terra ellittica.

1009. La forza centrifuga sotto l'equatore terrestre è $\frac{1}{287}$ della gravità, che ivi ha luogo. Perchè questa gravità fa percorrere ai gravi in un sec. di tempo medio piedi 15, 031 (987); e la forza centrifuga è misurata da AB distanza della tangente dalla curva, che in un arco di 15' si trova nelle tavole dei seni $= 0,00000001644149$; accrescendolo in ragione del quadrato delle ore solari medie, e delle ore del primo mobile o della rotazione della terra, che sono più brevi delle solari (349), e moltiplicandolo per il raggio della terra (802) ridotto in linee, si avranno linee 7, 5581, che si contengono 186, 77 volte nei piedi 15, che descrivono i gravi cadenti, e in circa 288 volte nello spazio totale, che i gravi, distrutta la forza centrifuga, descriverebbero sotto l'equatore.

Perciò un corpo, distrutta la forza di gravità, scapperebbe tosto per la tangente, e nel primo sec. si scosterebbe dalla superficie della terra per 7 linee; e questa tendenza a fuggire per la tangente, che nasce dal moto diurno della terra, diminuisce di $\frac{1}{188}$ la gravità che si avrebbe sotto l'equatore. Dal che ne segue, che se i gravi percorressero in un sec. 15, 0315 piedi, cessando il moto diurno ne percorrerebbero 15, 104.

1010. Partendo dall'equatore, questa forza scema nella stessa ragione, in cui si diminuiscono i paralleli, cioè come il coseno della latitudine, considerandola però nel piano di ciascun parallelo (1008); e considerandola nella direzione al centro della terra, si diminuisce come il quadrato dello stesso coseno di latitudine: Sia TA (fig. 124) l'asse della terra, PG l'effetto della forza centrifuga sotto il parallelo PE , e proporzionale allo stesso PE , questa forza nella direzione PG , risolta nella direzione TG diviene ancora minore nella ragione del seno di AP al seno retto, o in ragione di $PE : PT$, per essere simili i triangoli GPQ , PET ; dunque questa forza centrifuga GD sta alla forza, che si ha sotto l'equatore, come $PE^2 : PT^2$.

1011. Questa forza centrifuga diminuisce quella della gravità, e perciò rende la lunghezza del pendulo minore di quella, che si adopererebbe se

la terra fosse immobile; bisogna per es. accrescere di linee 1, 53 la lunghezza del pendolo a sec. che si trova sotto l'equatore per aver un pendolo a sec. tutto lo stesso, se la terra fosse immobile. Sotto una latitudine di 60°, ove il parallelo è la metà dell'equatore, si dovrebbe accrescere la ivi trovata lunghezza del pendolo di lin. 0, 38, cioè della quarta parte di lin. 1, 53; e moltiplicando linee 1, 53 per il quadrato del coseno della latitudine, si avrà la correzione per qualunque altra latitudine (Bouguer; *fig. de la Terre*, pag. 346); e quindi proviene parte della differenza nella lunghezza del pendolo, che si è sopra mostrata.

1012. La forza centrale, che ritiene i pianeti nelle loro orbite, è in ragione inversa del quadrato della distanza.

Dim. La prima prova di questa celebre legge (997) trovata dal Newton, è quella che si ricava dalla legge di Keplero (469); il Dott. Hook vedeva che la gravità dovea diminuir secondo che s'accrescevano le distanze dal centro de' gravi; e avea esortati i Geometri a trovare la proporzione, secondo cui si diminuiva questa forza (996). Il Newton avea, secondo il Pemberton, lo stesso pensiero. Ed ecco, secondo il mio credere, come per mezzo della legge di Keplero, si doveva trovare questa proporzione, trovare per esempio che la forza del sole per ritenere saturno nella sua orbita, sia cento volte minore della forza, con cui il sole stesso ritiene la terra nella sua, per essere la distanza di saturno dieci volte maggiore di quella della terra. Come Keplero scoprì questa legge, l'ho già mostrato (469); onde spero completa la storia dell'attrazione, scoperta sì grande e così importante.

Voglio primieramente mostrare in numeri, come si scorga questa proporzione, e si verifichi nota che sia la legge di Keplero. Sieno due orbite circolari e concentriche PB, TV infinitamente piccole e simili, terminate cioè dagli stessi raggi STP, SVB; questi cerchi sarebbero percorsi in tempi eguali, poste uguali le rivoluzioni de' due pianeti; ma essendo la rivoluzione del pianeta superiore P 30 volte più lenta della rivoluzione della terra T, egli descriverà un arco PE finchè la terra descrive l'arco TV; e PD farà l'effetto della forza centrale esercitata dal sole nello stesso, e TR il corrispondente nella terra all'arco TV (1006); non devesi dunque altro cercare se non che il rapporto di PD : TR. E chiaro che il numero de' gradi di PE è 30 volte minore de' gradi di PB; dunque PD è 900 volte minore di PC (988); ma se la distanza SP è 9, o 10 volte maggiore di ST, come lo sappiamo dalla legge di Keplero, anche PC è 9, o 10 volte maggiore di RT; dunque PD è 100 volte soltanto minore di RT; ma 100 è il quadrato del 10 ch'è la distanza di saturno, dunque la forza centrale si diminuisce come il quadrato della distanza.

Per dimostrare più in generale questa proposizione, si osservi, che si ha (988) $PD : PC :: PE^2 : PB^2$; ma il pianeta superiore avrebbe percorso PB, se la durata della di lui rivoluzione, che chiamo r , fosse uguale alla durata 1 della rivoluzione della terra; dunque $PE : PB :: 1 : r$, e $PD : PC :: 1 : r^2$; dunque $PD = \frac{PC}{r^2}$.

N 2 2

Ma

Ma $PC : TR :: PS : TS :: r : 1$, per essere simili gli archi PB , TV ; dunque $PC = r \cdot TR$; e poichè $PD = \frac{PC}{13}$, è anche, $= \frac{r \cdot TR}{13}$; dunque $\frac{PD}{TR} = \frac{r}{13}$. Ma per la legge di Keplero (469) $r^3 : 1 :: 13^3 : 1$, cioè $r^3 = 13^3$; dunque $\frac{PD}{TR} (= \frac{r}{13})$ sarà parimenti $= \frac{1}{13}$. Dunque $PD : TR :: 1 : 13$, cioè l'effetto della forza centrale è in ragione inversa del quadrato della distanza.

1013. Così, cred'io, scoprì il Nevvton colla scorta della legge di Keplero, il progresso dell'attrazione; verificatosi il quale nel sole rispetto a' pianeti, gli si confermò ben presto anche per la luna (997); e trovò che la forza centrale necessaria per ritenere la luna nella sua orbita era lo stesso che la gravità naturale de' corpi terrestri diminuita in ragione inversa del quadrato della distanza della luna dalla terra. Infatti i gravi percorrono in un sec. (981) 15 piedi, e la luna descrive un arco della sua orbita di 0° , 549 , cioè $33''$ circa, il di cui seno verso è $\frac{1}{240}$ di piede; dunque la luna è ritenuta, o s'avvicina verso terra 3600 volte meno dei corpi terrestri; ma è incirca 60 volte più lontana dal centro della terra; dunque la forza, che agisce sopra la luna si diminuisce come il quadrato della distanza.

1014. Questo principio trovatosi vero in altro modo, si adoperò per trovare la distanza della luna, e la parallasse, prima che fosse stata esattamente osservata. Sia e il semidiametro dell'equatore terrestre ridotto in piedi, x la ragione che v'ha fra esso e la distanza media della luna dalla terra, eguale in circa a 60 , onde la distanza della luna sia ex ; f la forza della terra, espressa dai 15 piedi, che fa percorrere in un secondo sulla superficie; u il seno verso dell'arco descritto dalla luna in un sec. di tempo, o la quantità per cui la luna in un sec. di tempo s'accosta alla terra; dunque questo spazio viene espresso in piedi da uxx . Ma secondo il principio delle forze centrali, lo stesso spazio è anche eguale a $\frac{f}{x^2}$ (1013); dunque da queste due quantità si cava l'equazione $\frac{1}{x} = \sqrt{\frac{f}{uxx}}$, e quello è il seno della parallasse orizzontale

della luna sotto l'equatore, o il raggio della terra diviso per il raggio della luna. Per ridurre in numeri questa quantità si prenda il logaritmo del seno verso dell'arco descritto dalla luna in un sec. di tempo, e vi si aggiunga il logaritmo del raggio dell'equatore (823) ridotto in piedi, e si avrà il log. di $ex = 5,8434490$; da cui si levi quello di 15 piedi, la terza parte del residuo sarà il log. del seno di $57' 18''$, e questa è la parallasse sotto l'equatore, che non eccede di 6 , o $7''$ quella che si deduce dalle più esatte osservazioni (589), e che è di $57' 12''$.

1015. Così la legge dell'attrazione in ragione inversa dei quadrati delle distanze resta provata in due maniere diversissime, e sommamente concordi fra loro. Benchè anche un'altra diversa considerazione dovea far vedere al Nevvton questa stessa legge, tratta cioè dalle qualità sensibili, come sono l'emanazioni, e la luce, che si diminuiscono in densità e in forza secondo la ragione inversa del quadrato della distanza. Finalmente col progresso de' suoi calcoli trovò in ogni parte del sistema solare delle nuove prove.

1016. Egli è vero bensì, che fu sospettato avervi ne' corpi terrestri un'attra-

attrazione in ragione inverfa del cubo della diftanza, ma non mi fi fpetta un tal efame. Leggafi ciò che fcriffero il Sig. de Maupertuis (*Mém. Acad.* 1732 , pag. 362) ; il Keill in un piccolo trattato contenente 30 propofizioni, che fono al fine delle di lui opere ; il Sig. d' Alembert nell' *Enciclopedia all'art. attrazione tom. 1* , pag. 850 ; il P. Boscovich *Philosophie naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura exiftentium. Viennæ, 1758 in 4. & Venetiis 1764.*

1017. L' innalzamento dei fluidi nei tubi capillari è altresì una confequenza neceffaria dell' attrazione dei corpi terreftri , come l' ho io moftrato in una memoria fopra i tubi capillari (*appreffo Defaint* , 1770). Veggafi il Mulchembroek (*Cours de Physique, T. II. pag. 1 edit. 1769*), il Dizionario di Chimica del Sig. Macquer, all' *art. Pefanteur*.

1018. La maffa dei pianeti, cioè la loro quantità di materia , o forza attraente, fi deduce dal principio dell' attrazione, e quindi fe ne ricava la intima loro denfità, o gravità fpecifica. Quefta fcoperta, che a prima vifta fembra molto fingolare, è però una confequenza naturale della legge dell' attrazione, poichè la forza attraente è un certo indizio della quantità di materia. Prendiamo per termine di paragone la maffa o la forza attraente della terra, i di cui effetti ci fono noti e familiari, e cerchiamo quale fia la maffa di giove rifpetto a quefta della terra. Il primo fatellite di giove compie la fua rivoluzione in una diftanza da giove uguale a quella della luna dalla terra (non ne è minore che di $\frac{3}{12}$). Se

quefto fatellite giraffe intorno a giove anche nello fteffo tempo della luna intorno alla terra, ne seguirebbe chiaramente, che la forza di giove per ritenere quefto fuo fatellite nella di lui orbita, farebbe uguale a quella della terra, con cui ritiene la luna, e che la quantità di materia in giove, o la di lui maffa, farebbe la fteffa che quella della terra; nel qual cafo bifognerebbe che la denfità della terra foſſe 1479 volte maggiore di quella di giove, perchè la groſſezza (o il volume) di giove contiene 1479 volte la groſſezza della terra (539); e fe il peſo è lo fteffo, la denſità farà tanto più grande, quanto è più piccolo il volume. Ma fe il fatellite gira 16 volte più velocemente della luna, vi è neceffaria una forza 256 volte maggiore per ritenerlo ($16 \cdot 16 = 256$) per eſſere la forza centrale come il quadrato della velocità (1006); una doppia velocità eſigge e fuppone una forza centrale quadrupla in diftanze eguali; e la velocità del fatellite 16 volte maggiore di quella della luna benchè in una orbita eguale, fuppone in giove una energia, o una maffa 256 volte maggiore di quella della terra; in tal caſo fi trova un volume 1479 volte maggiore di quello della terra; ed un peſo folamente 256 volte più grande; dunque il volume di giove rifpetto a quello della terra è cinque volte maggiore della quantità di materia reale ed effettiva rifpetto a quella della terra; dunque la denſità della terra è cinque volte maggiore della maffa di giove.

1019. Tale è lo ſpirito del metodo ſeguito dal Nevvton per calcolare le maffe e le denſità dei pianeti, che fono in fine di queſto libro; quanto

to più un satellite è lontano dal suo primario, e quanto più velocemente si muove, tanto maggiore è la forza e la quantità di materia nel pianeta primario, che lo ritiene. Voglio applicarvi il calcolo rigoroso, prendendo il sole per termine di paragone, perchè gli astronomi se ne servono per il calcolo delle attrazioni celesti.

1030. Sia la distanza di giove dal sole, presa per unità, $= 1$.

Il tempo della rivoluzione di giove, $= 1$.

La forza del sole sopra giove, $= 1$.

La distanza d'uno de' di lui satelliti, $= r$.

Il tempo della rivoluzione dello stesso satellite, $= t$.

La forza attuale di giove sopra questo suo satellite farà $\frac{r}{p}$ paragonata con quella del sole sopra di giove (1032). Se questo satellite fosse tanto lontano da giove, quanto giove dal sole, bisognerebbe in tal caso, che la forza fosse alla forza attuale ch'è $= \frac{r}{p}$, come $r^2:1$, cioè in ragione inversa del quadrato della distanza; dunque allora in eguale distanza, la forza farebbe $\frac{r^2}{p}$; e questa è dunque in fatto la forza assoluta di giove (rispetto a quella del sole considerata in distanza eguale), cioè la di lui massa totale, o la quantità di materia ch'esso contiene; dunque generalmente, per conoscere la massa d'un pianeta, presa quella del sole per unità, basta di dividere il cubo della distanza d'un satellite di questo pianeta, per il quadrato del tempo, ch'egli consuma a girare, purchè abbiasi presa l'unità delle distanze e dei tempi in uno dei pianeti, che girano intorno al sole.

1031. Esempio. La rivoluzione di venere intorno al sole, che si compie in ore 5393, è 13 volte più lunga di quella del quarto satellite di giove, ch'è di ore 400 $\frac{1}{2}$; dunque $t = 0,0742716$; la distanza di esso satellite veduta dal sole, è di 8' 16", da cui ricava facilmente la distanza dello stesso da giove, presa quella di venere dal sole per unità, si ha il valore di $r = 0,017290$. Se si prende il cubo di r e si divide per il quadrato di t , si trova 0,0009370, o $\frac{1}{1069}$, ch'è la massa di giove, posta quella del sole $= 1$. Nello stesso modo troverebbesi quella della terra $\frac{1}{365412}$ supposta dal Nevvton $\frac{1}{169182}$, per non essere stati esatti gli elementi, di cui si servi.

1032. Dividendo questa forza o massa d'un pianeta per il volume, preso per unità il volume del sole, si ha la densità cercata del pianeta rispetto alla densità del sole; e così il Nevvton trovò la terra quattro volte più densa del sole, quattro volte e un quarto più di giove, e sei volte più di saturno (Nevv. L. III. prop. 8) o Mac-laurin, *Expos. des découvertes* de

de Nevvton pag. 309). Queste densità sono calcolate più esattamente nella tavola ch' è al fine di questo libro . Possiamo paragonarle con oggetti familiari: si fa che l' antimonio è quattro volte più denso dell' acqua , e sei volte più del legno di prugno ; così supponendo che le sostanze del sole , e di giove, sieno della densità dell' acqua, la terra farà come l' antimonio, e saturno come il legno ; e queste sostanze mi sembrano molto corrispondenti a quanto ho voluto esprimere per mezzo loro . Si troverebbe lo stesso rapporto incirca fra l' acciaio, l' avorio, e il legno più pesante , come l' ebano ; basterà consultare la Tavola delle gravità specifiche dell' Abbate Nollet nelle di lui lez. di Fis. o la Fis. del Muschembroech .

1023. Con questo metodo non si possono trovare le densità di venere , mercurio , e marte, poichè non hanno satelliti, che possano mostrarci l' intensità della loro attrazione ; ma osservando nei tre pianeti , le densità dei quali son note, un accrescimento di densità , quando sono più vicini al sole , è molto probabile che lo stesso accrescimento abbia luogo anche negli altri tre pianeti : tentando di trovarne una legge di un tale accrescimento, si osserva che le densità sono quasi proporzionali alle radici de' moti medj ; per es. il moto della terra è incirca 11 , 86 , preso quello di giove = 1 ; la radice di esso numero è $3 \frac{1}{2}$; e la densità della

terra è appunto 3 volte $\frac{1}{2}$ maggiore di quella di giove, o incirca; dunque la stessa proporzione si può supporre negli altri pianeti ; e su questo fondamento ho calcolate le densità della mia Tavola .

1024. Nota la massa, e il diametro d' un pianeta , facilmente si trova la forza acceleratrice dei gravi sulla superficie stessa de' pianeti, essendo essa forza in ragione della massa , e in ragione inversa del quadrato del raggio . In questo modo nella mia Tavola citata ho calcolate le velocità dei gravi in ciaschedun pianeta per il primo sec. di tempo in piedi e centesime di piede ; ed è lo stesso che la velocità dei corpi terrestri sotto l' equatore , piedi 15 , 104 (1009) moltiplicata per la massa di ciaschedun pianeta e divisa per il quadrato del raggio, presi la massa e il raggio della terra (1002) per unità .

1025. La massa della luna, e perciò la di lei densità, difficilmente si possono determinare con esattezza, perchè i fenomeni, coi quali si manifestano , sono soggetti alla stessa difficoltà nel determinarli . Le altezze delle maree ci mostrano che la forza della luna è $2 \frac{1}{2}$ volte maggiore della forza del sole (1090) ; per conchiuderne la massa della luna basta sapere quale sia la di lei forza nella distanza del sole .

1026. Generalmente la forza centrale si diminuisce in ragione inversa del cubo della distanza , quando essa si risolve in una direzione diversa dalla prima (1050) ; dunque bisogna moltiplicare la forza attuale della luna per il cubo della ragione fra le distanze , o della ragione delle parallassi $\frac{87.6}{57.3}$, e si avrà la massa della luna , presa per unità quella del sole .

sole. Ma la massa della terra è soltanto $\frac{1}{365412}$ della massa del sole (1021); dunque bisogna ancora dividere la massa trovata per questa frazione, e si avrà $\frac{1}{71}$, ch'è la massa della luna, presa per unità quella della terra.

1027. Si può anche considerarla così: la massa della terra $\frac{72}{9}$ (1020) è $(\frac{9}{57})^3 \cdot (\frac{365}{27})^2$, presa per unità quella del sole; la massa della luna è $(\frac{9}{57})^3 \cdot \frac{1}{2}$; dunque sono fra loro come $\frac{1}{2} (\frac{365}{27})^2 : 1$, dunque il quadrato della durata dell'anno, di giorni 365, diviso per il quadrato della durata del mese, di gior. 27, e moltiplicato per $\frac{1}{2}$, ch'è la forza della luna, darà il numero 71, 49 ch'esprime quante volte la terra contenga la luna; e così la massa della luna sarà 0, 013991 di quella della terra.

1028. Dividendo la massa della luna per il di lei volume, ch'è $\frac{1}{49}$, o pure, 0, 0204 (584), si avrà la di lei densità 0, 68706, cioè la densità della luna è soltanto $\frac{2}{10}$ della densità della terra, come nella mia Tavola.

1029. La velocità di proiezione, come *PA* (fig. 123) necessaria per descrivere un cerchio *PB*, è in ragione inversa della radice del raggio *SP*.

Dim. Supponiamo che due pianeti *P*, e *T* descrivano intorno al sole *S* i cerchi *PB*, *TV*, e che *SP* sia quadruplo di *ST*; dico che la velocità *PE* sarà la metà della *TV*. Infatti *PC* sarà quadruplo di *TR* per essere le figure *PBC*, *TVR* come i raggi; ma essendo la gravità in *P* 16 volte minore che in *T*, bisogna prendere *PD* 16 volte minore di *TR*, o 64 volte minore di *PC*, per avere lo spazio *PE* che potrà descriversi dal pianeta *P* ritenuto dalla forza centrale del sole; in tal caso *PE* sarà l'ottava parte di *PB*, per essere i seni versì in duplicata degli archi (988); dunque *PE* sarà la metà di *TV* nello stesso spazio di tempo; cioè la velocità d'un pianeta deve essere in ragione inversa della radice della sua distanza, onde possa essere ritenuto dalla forza centrale, ch'è in ragione duplicata inversa della distanza. Ed ecco perchè giove, la di cui orbita è cinque volte maggiore dell'orbita della terra, impiega a percorrerla un tempo 12 volte maggiore, non essendo la di lui velocità assoluta la metà di quella della terra.

1030. Se la velocità di proiezione primitivamente ricevuta da un pianeta nel partire dal suo aselio, fosse stata minore di quella che gli era necessaria per descrivere un cerchio *PB*, per essere stata troppo grande la forza centrale, il pianeta si sarebbe avvicinato al sole; ed ecco perchè i pianeti nel partire dall'aselio s'avvicinano al sole; ma fra poco dimostreremo, che, dopo percorsi 180°, lo stesso pianeta deve allontanarsi dal sole altrettanto quanto vi si è accostato, perchè la forza centrifuga divie-

ne

ne maggiore della centripeta, a misura che il pianeta s'avvicina al sole. Si dimostrò che la velocità perielia sta all'afelia in ragione inversa delle distanze (473); dal che ne segue che la centrifuga s'accresce più della centripeta, ed eccone la dimostrazione.

1031. La forza centrifuga s'accresce in ragione triplicata inversa della distanza, quando la velocità è in inversa semplice delle distanze.

Dim. Supponiamo che SP (fig. 123) sia doppia di ST; sarà l'arco PB doppio di TV, e PC di TR, e la forza centrifuga in P doppia della stessa in T (questo è il primo Teorema dell' Huygens de Horolog. oscillat. 1673); ma se la velocità in P invece di essere doppia della stessa in T, fosse la metà, cioè se PE è quattro volte minore di PB, il seno verso PD farà 16 volte minore di PC (988); dunque PD farà 8 volte minore di TR; cioè la forza centrifuga è in ragione triplicata inversa delle distanze SP, ST, che abbiamo supposte come 1 : 2.

Generalmente si vede, che $PB : TV :: SP : ST$; dunque se $TV : PE :: SP : ST$ (473), si avrà, moltiplicando le analogie tra loro, $PB : PE :: SP^2 : ST^2$; ma $PC : PD :: PB^2 : PE^2$; dunque $PC : PD :: SP^2 : ST^2$; ma $PC : TR :: SP : ST$; dunque dividendo le analogie, sarà $TR : PD :: SP^3 : ST^3$; da cui vedesi l'effetto della forza centrifuga essere in ragione triplicata inversa della distanza, quando la velocità è in inversa semplice delle distanze. Questo è il caso d' un pianeta considerato nel suo afelio e perielio; e da questa proposizione vedremo fra poco (1035) perchè i pianeti si scostino dal sole dopo essersigli avvicinati, quantunque sieno sempre attratti verso lo stesso sole.

1032. Se la forza di proiezione, che anima i pianeti a descrivere le loro orbite, si distruggesse quando essi si trovano nelle medie loro distanze del sole, la forza centrifuga li precipiterebbe nel sole: e mercurio vi giungerebbe in giorni 15.13^h; venere in 39.17^h; la terra in 64.10^h; marte in giorni 121; giove in 290; saturno in 767: una pietra cadrebbe nel centro della terra, se il passaggio vi fosse libero, in 21' 9" (Wiston *Astronomical principles of religion*, p. 66). Questi risultati si trovano con quest' analogia, la radice quadrata del cubo del 2 sta all' unità, come la metà della durata della rivoluzione d'un pianeta al tempo della di lui discesa fino al centro dell'attrazione (Frisio de gravitate, pag. 100).

Del moto ellittico dei pianeti.

1033. La forza centrale in ragione duplicata inversa della distanza, non può aver luogo nelle orbite dei pianeti, se queste non sieno sezioni coniche. Il Nevvton Princip. L. I. dimostra, che se i pianeti descrivevano delle sezioni coniche, la forza centrale loro dovrebbe essere in duplicata inversa della distanza. Ma Gio. Bernoulli il primo dimostrò, ch'è altresì vera l'inversa proposizione, cioè che supposta quella ragione nella forza centrale, necessariamente l'orbita deve essere una sezione conica (Mem. Acad. 1710 & 1711. Oeuvres de J. Bernoulli T. I. pag. 469) :

O o

Non

Non posso inserire in questo compendio queste due opposte dimostrazioni per essere troppo complicate.

1034. Ma è necessario di mostrare in un modo più palpabile la causa del moto alternativo, che per lo più si stenta a concepire. Sembra, così suol dirsi, che un pianeta incessantemente attratto dal sole, a cui s'accosta fino a un certo punto, dovrebbe sempre più avvicinarvisi, giacchè il sole non cessa d'attrarlo; pure giunto il pianeta al suo perielio, si scosta dal sole, e torna all'afelio. Ma ecco la causa di questo moto alternativo: un pianeta che ha ricevuto nell'afelio una proiezione con una velocità troppo piccola, onde potere descrivere un cerchio in una distanza sì grande (1030) o con una forza di proiezione troppo piccola rispetto alla forza centrale, si accosta al sole; ma nell'accostarvisi s'accresce la velocità, senza di cui le arce non sarebbero più proporzionali ai tempi; supponiamolo giunto a una distanza di 180° dal punto d'onde partì, cioè al perielio, e che la di lui distanza dal sole siasi ridotta quattro volte minore della distanza afelia; la velocità è quadrupla della velocità afelia, perchè s'accresce in ragione inversa delle distanze (473); ma la velocità che nel perielio richiederebbesi per descrivere un cerchio, è solamente doppia della velocità che richiederebbesi per descrivere un cerchio nell'afelio, perchè s'accresce soltanto in ragione fudduplicata inversa della distanza (1029); dunque il pianeta, discendendo dall'afelio al perielio, acquistò una velocità doppia di quella, che farebbe gli stata necessaria per descrivere un cerchio del raggio SP eguale alla distanza perielia. Dunque il pianeta uscirà da questo cerchio per allontanarsi dal sole, e risalire verso l'afelio: da questa prima ragione vedesi che il pianeta deve scostarsi dal sole dopo essersigli avvicinato; ma v'ha una seconda maniera di mostrare lo stesso.

1035. Supponiamo sempre un pianeta spinto colla forza proiettile in A (fig. 118) con una velocità troppo piccola perchè possi descrivere un cerchio del raggio SA, in guisa che sia costretto fino dal primo momento a discendere in un'orbita più curva accostandosi al sole. Quando sarà giunto in un punto P, in cui la distanza sia quattro volte più piccola, la forza centrale o l'attrazione del sole sarà 16 volte più grande (1012); ma la forza centrifuga sarà 64 volte maggiore (1031); dunque la forza stessa centrifuga è allora molto maggiore della centrale; dunque non v'è meraviglia, se il pianeta incominci a scostarsi dal sole.

1036. Si crederà forse che il pianeta non debba più accostarsi al sole, quando la forza centrifuga sarà eguale alla centripeta; ma bisogna considerare, che in questo caso, che succede quando il pianeta si trova verso la sua media distanza M dal sole, la direzione MN del di lui moto è troppo obliqua al raggio vettore MS, e forma un angolo NMS troppo piccolo onde potere lo stesso divenire a un tratto un angolo retto; bisogna che il pianeta discenda sempre più, e che la curvatura della sua strada divenga rotonda in modo che il raggio vettore SP sia perpendicolare al moto del pianeta; e allora avviene che l'eccesso della forza

cen-

centrifuga sopra la centrale, farà speso tutto per allontanare il pianeta dal sole, il che avviene soltanto nel punto P diametralmente opposto al punto A. Il pianeta partendo dal punto P impiegherà per perdere questo eccesso della forza centrifuga, tanto tempo, quanto glie ne fu necessario per acquistarlo; e quindi la seconda parte dell'ellisse sarà eguale alla parte discendente A L M N P, e sarà descritta nello stesso spazio di tempo.

Delle ineguaglianze prodotte dall'attrazione.

1037. Se ciaschedun pianeta girando intorno a un centro non sentisse altra forza che quella che lo spinge verso questo centro, descriverebbe un cerchio o un'ellissi, l'area della quale farebbero proporzionali ai tempi (480); ma essendo ciaschedun pianeta attratto da tutti gli altri secondo diverse direzioni, e con forze sempre diverse, quindi ne nascono continuamente delle ineguaglianze e perturbazioni. Il calcolo di queste perturbazioni tenne occupati da alcuni anni in qua i geometri e gli astronomi; il Nevvton cominciò a calcolare quelle della luna: i Sigg. Eulero, d' Alembert, Clairaut: perfezionarono questa teoria: Eulero calcolò le ineguaglianze di saturno in una dissertazione, che fu coronata dall'Accademia nel 1748. Il Clairaut e Sig. d' Alembert pubblicarono le loro ricerche sulle ineguaglianze della terra; ed io ho esaminate quelle di marte e di venero (*Mém. Acad.* 1758 1760 1761), che si sono trovate considerabili e perciò da dover entrare nei calcoli astronomici. Quelle di giove furono calcolate dall' Eulero nel discorso coronato nel 1752, (*Recueil des Pièces qui ont remporté le prix*, T. VII) e poscia dal Sig. Mayer; di questi calcoli se ne servì il Sig. Wargentin per le Tavole di giove e de' satelliti, che perciò si trovarono molto più esatte; ma in questo compendio non posso se non accennare i primi principj e qualche leggera idea di questi calcoli immensi.

1038. Se due pianeti, uno de' quali gira intorno all' altro, fossero egualmente attratti e per direzioni parallele da un terzo, questa nuova attrazione non altererebbe punto il loro sistema, il loro moto, il sito loro rispettivo; e farebbe lo stesso, come se lo spazio, o il piano medesimo in cui si muovono, cangiasse di sito, nel quale trasporto segue ogni cosa come per l'avanti.

1039. Così due attrazioni eguali e parallele non alterano punto il sistema dei corpi; e qualunque ineguaglianza o differenza di moto dipende soltanto da una differenza delle attrazioni. La luna non resta turbata nel suo moto intorno alla terra, se non perchè è attratta dal sole poco più o meno che la terra. Il mare non è agitato due volte al giorno dalla luna, se non perchè la luna attrae con maggior forza le acque che la terra, o la terra che le acque 12 ore dopo.

1040. Volendosi calcolare queste perturbazioni prodotte da una forza straniera nel moto d' un pianeta che gira intorno al sole, bisogna cercare quanto essa agisca sul sole e sul pianeta; la forza perturbatrice è la dit-

ferenza di esse due azioni; e bisogna calcolare l'effetto di questa differenza. Perchè se il sole e il pianeta, che gli gira intorno, fossero attratti con forza eguale, e per direzioni parallele, il pianeta non lascierebbe di descrivere intorno al sole la stessa ellissi di prima; le di lui longitudini eliocentriche, e raggi vettori sarebbero i medesimi, e nell'Astronomia non faremmo obbligati a computare alcuna differenza, nè le osservazioni ci mostrebbero disordine di forte alcuna.

1041. Da questa considerazione si rileverà, perchè la gravità della luna sulla terra, cioè la forza centrale, che ritiene la luna nella sua orbita, resti diminuita in ambe le sizigie; questo è un punto non mai inteso dagli avversarj dell'attrazione, ma che influisce molto nella spiegazione. Succede nella luna come nelle acque del mare, che due volte al giorno si alzano verso il nostro zenit, quando cioè la luna passa per lo stesso zenit, e quando per il nadir. Le osservazioni provano, che la luna nelle due sizigie tanto si sforza ad allontanarsi dalla terra, quanto ad avvicinarsi nelle due quadrature (piccolissima è la differenza). E lo stesso si dimostra colla seguente ragione. Quando la luna è in congiunzione, è più vicina al sole, che non è la terra, di $\frac{1}{380}$; dunque è più attratta

dal sole, che non è la terra di $\frac{1}{190}$ della forza del sole sulla terra (perchè la differenza dei quadrati è doppia della differenza delle radici); dunque la gravità della stessa verso la terra resta diminuita di $\frac{1}{190}$. Quando è in opposizione, è bensì attratta dalla stessa parte tanto dal sole, quanto dalla terra, ma non segue però da ciò, che resti accresciuta la di lei gravità; e infatti se in questo caso dell'opposizione, la luna e la terra fossero attratte dal sole colla stessa forza affatto, non ne seguirebbe alcun cangiamento nella gravità della luna verso la terra, nè nel di lei moto intorno alla medesima, quantunque la luna fosse attratta sempre dalla stessa parte dalla somma di queste due forze; ma la terra è più attratta della luna di $\frac{1}{190}$; dunque la terra tanto tende a fuggire dalla luna, quanto la luna tendeva a scostarsi dalla terra stessa quando era in congiunzione; la loro scambievolmente unione, la reciproca loro tendenza, la loro attrazione restano altrettanto diminuite quando il sole allontana la terra dalla luna, quanto allora quando allontana la luna dalla terra; e per questa stessa ragione osserviamo le acque del mare alzarsi verso il zenit posta la luna al nadir (1075).

1042. La forza del sole sopra un pianeta, che s'esprime per $\frac{S}{r^2}$ (1001) non è la sola da considerarsi, quando si cerca il moto d'un pianeta intorno al sole, o quel moto che vedrebbe un osservatore posto nel centro del sole. Perchè anche il pianeta T (fig. 125) attrae il sole in senso contrario con una forza $\frac{T}{r^2}$, e se vogliasi supporre il sole im-

mobile, bisogna attribuire al pianeta un nuovo moto verso il sole, eguale a quello che ha il sole verso il pianeta, o pure, ch'è già lo stesso, bisogna supporre che il sole attragga il pianeta con una forza $\frac{S+T}{r^2}$, vale a dire con la somma delle due masse, del sole e del pianeta.

1043. L'effetto di questa attrazione del pianeta T sopra il sole S consiste nel far descrivere al sole una piccola ellissi intorno al centro di gravità comune al sole e al pianeta (Nevvton *L. I. prop. 67*, *L. III. prop. 13*); almeno nel caso che il sole stesso abbia ricevuto un impulso intorno al centro (Frifio, *pag. 113*). Questa attrazione è la causa di alcune delle piccole ineguaglianze nel moto apparente del sole, che si calcolano prendendo la differenza delle attrazioni, che ciaschedun pianeta esercita sopra il sole e la terra. Secondo il Nevvton, il sole deve essere tratto di luogo per una piccola quantità dalle attrazioni de' pianeti; ma la forma del calcolo usitato nell'Astronomia è tale, che il sole si suppone sempre fisso, e si riferisce a ciaschedun pianeta quel moto, che lo stesso produce nel sole, onde resti sempre la stessa la situazione rispettiva del pianeta col sole.

1044. L'espressione $\frac{S}{r^2}$ della forza attraente è quella, che ha luogo quando l'azione si esercita direttamente, e sempre secondo il raggio vettore; ma i pianeti sono gli uni dagli altri attratti obliquamente, e secondo qualunque direzione, che cangiasi continuamente, mentre verso il centro intorno a cui si girano, sono sempre attratti direttamente; così per conoscere l'effetto delle perturbazioni ed attrazioni celesti, bisogna risolvere la loro forza assoluta (ch'è la massa divisa per il quadrato della distanza), per trovarne l'effetto nella direzione stessa della forza centrale. Ho detto per esempio, che l'azione di giove sulla terra è $\frac{1}{25000}$ dell'azione del sole sulla medesima, secondo un'attrazione diretta (1004); ma queste due forze che agiscono sulla terra, si oppongono insieme, e spesso hanno direzioni diverse; la forza di giove, che secondo un'attrazione diretta è $\frac{1}{25000}$ di quella del sole, avrà un effetto molto minore, quando agirà lateralmente; sarà per esempio minore quando agirà sotto un angolo di 60°.

1045. Un corpo spinto secondo le direzioni AB, AC (fig. 126) che formano tra loro un angolo BAC, da due potenze che sono fra loro come le linee AB, AC, descriverà la diagonale AD del parallelogrammo BACD nel tempo stesso, in cui descriverebbe AC, o AB, spinto separatamente da una di esse due potenze (479). Così la forza espressa secondo la direzione e lunghezza della diagonale AD, equivale alle due forze AB, AC, che avrebbero operato nello stesso tempo. E anche quando questa forza è unica nel principio, si può considerare prodotta dalla riunione di due altre forze, alle quali è equivalente; cioè che la forza AD può risolversi nelle due AC e AB.

La

La stessa linea AD è anche la diagonale del parallelogrammo $ABDC$, e la forza AD parimenti risulterebbe dalla unione delle due forze AB , AC ; dunque sopra una data linea AD si possono formare dei qualunque triangoli ABD, ABD di grandezza o forma arbitraria, e si potrà sempre alla forza AD sostituire due forze, l'espressioni delle quali sieno i lati d'uno di essi triangoli.

Così la forza AD, che chiameremo F, risolta secondo le direzioni AB, AC, darà due forze proporzionali ad esse due linee, e, per essere $AC = BD$, una di queste due forze sarà $= F \frac{AB}{AD}$, che agirà secondo AB, l'altra sarà $F \frac{BD}{AD}$ secondo AC, o parallelamente a BD. Dico che la forza secondo AB sarà $F \frac{AB}{AD}$, perchè, per essere le linee AB, AC, AD proporzionali alle forze da loro espresse, la forza stessa secondo AB, è alla forza secondo AD, che è F, come la linea AB alla AD; dunque la forza secondo AB $= F \frac{AB}{AD}$.

1046. Se il parallelogrammo dato è rettangolo in B (fig. 127), BD è il seno dell'angolo BAD, preso AD per raggio o per unità; e AB è il coseno; dunque in tal caso la forza secondo AC, o $BD = F$. sen. BAD; queste due forze AC, AB equivalgono alla data forza AD, che si doveva risolvere; di questa ultima risoluzione ci serviremo art. 1048.

Per mezzo della risoluzione delle forze attraenti si possono ridurre le forze perturbatrici, che agiscono sopra un pianeta, alla direzione stessa del di lui moto. Prenderò per esempio la terra ch'è attratta dall'azione di giove, come se cercassi l'ineguaglianza che ne risulta nel moto della medesima.

1047. Sia AT (fig. 125) l'orbita della terra, ch'è il pianeta disturbato, BR quella di giove, o del pianeta turbante, e per semplicità del calcolo supponiamole in uno stesso piano. Sia M la massa del pianeta turbante, e l'angolo RST, o l'angolo di commutazione (442); giove situato in R attrae la terra T con una forza $\frac{M}{RT^2}$ (1002); non vi facciamo entrare la somma delle masse di giove e della terra, perchè tralascieremo i turbamenti di giove.

La forza $\frac{M}{RT^2}$ deve risolversi in altre due, l'una delle quali agisca da T in G, o da S in R, onde se ne possa levare la forza di giove sul sole (1041); e l'altra da T in S; la prima è $M \frac{RS}{RT^3}$ e tende ad allontanare il pianeta dal sole nella direzione di TG, o di SR che l'è parallela; e perciò le preffigiamo il segno negativo. La seconda forza è $\frac{M \cdot TS}{RT^3}$ (1045); e tende ad avvicinare la terra al sole, e la esprime-

remo

remo perciò col segno positivo . La seconda di queste due nuove forze è nella direzione del raggio vettore TS , al quale noi vogliamo riportare il moto della terra , e così non ha ella bisogno d'altra nuova risoluzione .

1048. La forza $\frac{M \cdot RS}{RT^3}$, o $\frac{M \cdot TG}{RT^3}$ non essendo nella direzione del raggio vettore , nè del moto della terra , bisogna ridurvela : prima però devesi sottrarne la forza del sole ; perchè la forza TG non agisce , per turbare il moto della terra , se non in quanto che è minore o maggiore di quella che nello stesso tempo agisce sul sole da S in R ; ma questa forza sul sole è $\frac{M}{SR}$ (1042 ,) dunque , levandola , avremo $\frac{M \cdot SR}{RT^3} - \frac{M}{SR^2}$ ch' esprime la forza perturbatrice secondo SR o TG ; bisogna risolverla secondo TE e TB , moltiplicandola per il coseno e per il seno dell'angolo GTE o RST (1046) , cioè dell'angolo ι . La forza secondo TE agirà nella direzione STE del raggio vettore della terra , ma in senso opposto alla forza centrale del sole ; e perciò sarà negativa ; e la forza centrale del sole positiva , perchè sempre è la maggiore . L'altra forza agirà da T in B , e tenderà a diminuire la velocità della terra , che si suppone andare da A in T , e perciò essa pure sarà negativa . Dunque la prima è $-(\frac{M \cdot SR}{RT^3} - \frac{M}{SR^2}) \cosen. \iota$ (1046) , forza diretta verso il sole , e l'altra $-(\frac{M \cdot SR}{RT^3} - \frac{M}{SR^2}) \sen. \iota$; ch' è la forza che agisce perpendicolarmente al raggio vettore .

1049. Quanto alla forza diretta verso il sole , ne abbiamo trovata una parte $+\frac{M \cdot TS}{RT^3}$ (1047) , alla quale devesi aggiungere quella , che abbiamo adesso trovata , poichè ella è nella stessa direzione , e si avrà finalmente la forza perturbatrice diretta verso il centro del sole $= +\frac{M \cdot TS}{RT^3} - (\frac{M \cdot SR}{RT^3} - \frac{M}{SR^2}) \cosen. \iota$. La prima parte di questa espressione è proporzionale a TS , e perciò s' accresce a proporzione che il pianeta turbato s' allontana dal centro del suo moto .

1050. Il valore $\frac{M \cdot TS}{RT^3}$ ci fa vedere che la forza perturbatrice , che agisce secondo la direzione TS del raggio vettore , e che modifica la forza centrale del pianeta , si diminuisce in ragione triplicata inverfa delle distanze , come ho supposto (1026) . E questa è la ragione , per cui si troverà (1091) che la forza della luna per alzare le acque del mare , farebbe minore , se la distanza della medesima luna fosse eguale a quella del sole , e ciò in ragione dei cubi delle distanze del sole e della luna , perchè la forza che alza le stesse acque è una forza risolta secondo la direzione TS del raggio della terza .

1051. Risolvendosi nello stesso modo la forza d' un pianeta sopra d' un altro si cerca l' effetto , che ne ridonda nel moto del pianeta turbato ; vi vuol poco a sapere in un dato momento che la forza di giovè , con cui

cui disturba il moto della terra è $\frac{x}{25000}$ della forza del sole, che la ritie-
ne nella sua orbita; ma bisogna sapere quale effetto avrà prodotto nel
moto della terra questa forza dopo la sua azione durante un tempo fini-
to; quanto cioè avrà accresciuta o diminuita la velocità della terra,
quale cambiamento avrà prodotto nel piano della di lei orbita, e tutte
queste cose espresse in min. e sec. giusta la forma delle nostre tavole astro-
nomiche. Questa forza perturbatrice in ciaschun momento di tempo fa-
cilmente si conosce, ma devesi cercare 1.^o l'effetto della medesima in
quel momento nell'alterazione dell'orbita; 2.^o la somma di questi effet-
ti reiterati per molte volte, ciocchè rende assolutamente necessario il cal-
colo degl'infinitesimi; trattandosi di rilevare dall'effetto prodotto in un
momento di tempo, l'effetto di tre mesi, d'un anno, d'una intera
rivoluzione, o d'uno spazio qualunque di tempo, durante il quale l'ef-
fetto stesso non è già uniforme, nè al tempo stesso proporzionale. In que-
sto consiste la soluzione del problema dei tre corpi, trovata specialmente
dalli Sigg. Euler, Clairaut, d'Alembert; ma che non posso qui riferire,
per entrarvi dentro troppo di calcolo infinitesimale; i principj per altro gli
ho esposti nel Libro XXII della mia astronomia.

1052. Voglio nonnostante spiegare il modo con cui la perturbazione del
sole produce le tre principali ineguaglianze della luna, cioè l'*evezione*,
la *variazione*, l'*equazione annua*.

L'*evezione* è la ineguaglianza principale prodotta nella luna dal sole
(560); ed equivale a un cambiamento nella eccentricità dell'orbita lu-
nare. Quando il sole corrisponde all'apogeo o al perigeo lunare, o quan-
do la linea degli apfidi della luna coincide colla linea delle sizigie, la
forza centrale della terra sulla luna, ch'è più debole nella sizigia apogea,
resta il più diminuita (1049); e il meno nella sizigia perigea, dove è
più intensa; dunque la differenza fra le forze centrali perigea ed apogea
farà maggiore in tal caso; e perciò s'accrescerà la differenza delle distan-
ze, cioè ne farà maggiore l'eccentricità; così l'osservazione mostra, che
in tal caso l'equazione della luna è di $70\frac{1}{2}$, la quale trovasi di 50 quan-
do la linea delle quadrature coincide con quella delle sizigie (560).

1053. Il moto alternativo dell'apogeo, che osservasi nel tempo istesso,
dipende dalla diminuzione della forza centrale (1056): e perciò deve ef-
fere maggiore coincidendo la linea delle sizigie con quella degli apfidi,
restando in tal caso il più diminuita la gravità della luna. Quando l'a-
pogeo è nelle quadrature, il di lui moto è più lento, per essere minore
la diminuzione totale della forza centrale; quando il sole è distante 450
dagli apfidi, il moto vero dell'apogeo è uguale al moto medio, trovan-
dosi in tal caso il sole fra mezzo alle due azioni estreme; ma allora il luo-
go vero dell'apogeo è diverso quanto mai possa dal medio, e l'equazio-
ne è la più grande, perchè risulta da tutti li gradi di velocità fino a
quel punto ricevutisi dall'apogeo, cioè fino da quando il sole trovavasi
nell'apogeo. (Devesi notare che l'effetto di queste accelerazioni vera-
mente

veramente non principia ad aver luogo nell' osservazione , se non quando la causa s' è il più accresciuta , ed è il massimo quando la stessa causa cessa d' agire . Quindi è che nel moto ellittico de' pianeti il luogo vero è il più avanzato quando cessa l' accelerazione , e quando principia il ritardamento (497), cioè a 3, e a 9 segni d' anomalia . Alcuni autori non osservando questo punto , danno delle idee false rispetto all' ineguaglianze della luna) .

1054. La *variazione* (561) è quell' ineguaglianza della luna , che , posta un' orbita circolare , si trova negli ottanti , per causa della forza tangenziale , che accelera o ritarda il di lei moto . Sia C (*fig. 116*) il centro della terra , T quello del sole , AGP l' orbita della luna ; quando la luna prima della congiunzione a 45° si trova in G , allora è più attratta che non è la terra , secondo la direzione TG ; e la di lei velocità s' accelera , fino che giunge alla congiunzione in A , in cui la velocità della stessa nell' orbita è la più grande ; quando si trova verso P distante per 45° dalla congiunzione , la vera longitudine della medesima è la più avanzata per una quantità , che dicesi *variazione* , ed è di 37' addittiva (561) ; è bensì vero che la velocità della luna cessa d' accrescersi e comincia a ritardarsi fino da quando la luna passò per il punto A , perchè avendo il sole attratta la luna più della terra , finchè si portò da G in A , accrebbe sempre più la velocità della stessa luna fino al punto A , in cui cessa d' accrescerla ; ma questa velocità s' è trovata la più grande in A , non essendo in essa cessati gli accrescimenti fino allo stesso punto . Dopo il passaggio per il punto A , attraendosi la luna dal sole verso il punto T , resta diminuita la di lei velocità ; ma l' eccesso della velocità acquistata sopra la velocità media persiste fino all' ottante in P , in cui la velocità vera è uguale alla media ; ed ecco perchè l' equazione della variazione è addittiva e grande il più che possa essere nella distanza di 45° dalla congiunzione , in cui la velocità è la più grande . Veggasi l' art. 1053 in fine .

1055. L' *equazione annua* della luna , che arriva fino agli $11' \frac{1}{4}$ (562) nasce dal sole , che agisce più sulla luna quando è perigeo , che quando è apogeo ; e siccome l' effetto più considerabile durante una rivoluzione intera della luna , è di diminuire la forza centrale della luna verso la terra , così questa forza è il più diminuita quando il sole è perigeo ; allora il diametro dell' orbita lunare diviene maggiore , perchè la luna essendo meno attratta verso la terra , necessariamente se ne discosta ; la di lei orbita si allarga , e rende perciò più lunga la rivoluzione , perchè i quadrati dei tempi periodici sono sempre come li cubi dei diametri delle orbite ; perciò il moto della luna si rallenta nel perigeo del sole , e l' equazione annua principia ad essere sottrattiva per la ragione addotta in fine dell' art. 1053 .

Del moto degli apfidi.

1056. L'osservazione mostra esservi negli afelii di tutti li pianeti un piccolo moto diretto (514); l'apogeo della luna ha un moto rapidissimo (559); questi moti dipendono dall'attrazione. Ciaschedun pianeta descriverebbe naturalmente un'ellissi, se non fosse attratto se non che dal corpo solo, intorno a cui si gira; ma le attrazioni degli altri pianeti lo distolgono continuamente dalla sua orbita ellittica, in guisa che questa orbita non è veramente mai un'ellissi; nonnostante gli astronomi per semplicità del calcolo suppongono che il pianeta resti sempre in una ellissi, e questa però mobile.

1057. Sia S il foco (fig. 128), e A l'afelio d'un pianeta, la di cui orbita è AMPO, e supponiamo che il pianeta da A in B sia stato in una ellisse immobile ABP con la forza centrale del sole. Se l'attrazione d'un altro pianeta P, che cerca d'allontanarlo dal sole, lo fa giungere in un punto C, in una distanza SC dal sole, si potrà supporre questo punto situato in un'altra ellissi CDE, eguale all'orbita ABP, il di cui afelio invece d'essere ancora in A, sia giunto in C; si addatta, per così dire, l'ellissi ABP, di cui veramente uscì fuori il pianeta, al punto C a cui è giunto il pianeta stesso, e facendo muovere questa ellissi, si riduce il calcolo del moto vero del pianeta alla semplicità del calcolo ellittico. Ogni qual volta il pianeta s'allontana dal foco S, o si diminuisce la di lui forza centrale, devesi concepire un moto progressivo nel di lui apfide, perchè tutto corrisponda a questa diminuzione; e questo è quanto trovasi nel sistema planetario.

1058. Il moto degli apfidi può dipendere da due altre cause: la prima, che ha luogo nella luna e nei satelliti, è la figura schiacciata del pianeta primario; la seconda è la resistenza, che si può concepire nella materia eterea, in cui si muovono i pianeti; se vi avesse questa resistenza, potrebbe la medesima cangiare la grandezza, la figura e il sito delle orbite dopo un qualche numero di rivoluzioni. Veggasi il Sig. d'Alembert (*Recherches sur le système du monde*, T. II); e le *Recherches* dell'Ab. Bossut su questo punto coronate dall'Accademia nel 1762, e quelle ancora del Sig. Alberto Euler, ch'ebbero l'*accesit*, e si trovano nel vol. VIII dei pezzi coronati. Ma devo avvertire, che l'esame delle più antiche osservazioni non ci mostra nelle orbite alcun cangiamento, indicante la resistenza della materia eterea; il moto degli apfidi, che vi si osserva, nasce dalla scambievole attrazione dei pianeti; perchè si trova che la resistenza del fluido produrrebbe un moto dell'afelio molto meno sensibile del cangiamento nella durata della rivoluzione, e questo almeno sensibilmente non ha luogo; dunque il moto che si osserva negli apfidi non nasce dalla resistenza.

1059. Diffi non osservarsi cangiamento nella durata delle rivoluzioni, e riguardo alla terra e Marte l'ho dimostrato *Mem. Acad.* 1757, pag. 418 e 445. Saturno al contrario sembra essersi ritardato (455); se dunque

que si osserva un'accelerazione in giove, questa nasce dall'azione di saturno e dalla posizione de' di lui apfidi (*Castini, Mem. Acad. 1746, pag. 465*). E se questo è vero, le cose si ridurranno al medesimo stato, in cui sono presentemente, e l'accelerazione si cangerà in un ritardamento. Rispetto all'accelerazione della luna (564), questa non si è verificata ancora evidentemente, ed io non dubito, che nell'attrazione non si trovi la causa dell'equazione secolare, che si crede avervi luogo. Dunque finora non v'è prova della resistenza della materia eterea; e perciò tutti gli astronomi devono essere concordi in questo pensiero, cioè che se i corpi celesti non si muovono veramente in un vacuo assoluto, almeno la materia in cui nuotano ha un effetto insensibile, ed è lo stesso come se si muovessero nel vacuo; e questo solo è bastante a dissipare i vortici e il pieno, che abbiamo già rifiutati colle prove dell'attrazione (999).

Del moto dei nodi dei pianeti.

1060. Se tutti i pianeti girassero intorno al sole in uno stesso piano, questo non si cangierebbe mai per la reciproca loro attrazione, perchè un pianeta non potrebbe spingere fuori dello stesso piano un altro pianeta, in cui ambedue vi si trovano. Ma tutte queste orbite sono le une all'altre inclinate, e con situazione molto diversa; ciaschedun pianeta è incessantemente tirato fuori del piano della sua orbita dagli altri pianeti tutti, e in ogni momento cangia orbita. Gli astronomi per rappresentare metodicamente queste ineguaglianze suppongono il pianeta situato sempre nello stesso piano, o nella stessa orbita, la quale per altro cangiò sito; e infatti si possono rappresentare tutti i moti d'un pianeta fuori del suo piano primitivo, col dare a questo piano un cangiamento d'inclinazione, con un moto solo dei nodi, e questo tale, che il piano prescelto segua il pianeta in tutte le di lui ineguaglianze.

1061. Si vedrà anche senza dimostrazione essere impossibile, che un pianeta attratto, la di cui orbita è in un piano diverso da quello del pianeta turbante, possa passare per il piano di questo pianeta turbante nello stesso punto, per cui passò nella rivoluzione precedente; e dovrà ciascheduna volta passare per il piano stesso più presto, che non farebbe ci passato, se il pianeta turbante non l'avesse tirato verso lo stesso piano, non potendo obbedire alla forza dello stesso pianeta attraente se non col giungere al piano dello stesso alquanto prima del fine della sua rivoluzione.

1062. Sia DN l'eclittica (*fig. 129 per ex. 126*); LABN l'orbita della luna primitiva, di cui percorre l'arco LA; poichè il sole è nell'eclittica DN, chiaramente si vede, che cerca sempre la di lui forza attraente di avvicinare la luna al piano dell'eclittica DN. Perciò quando la luna vuol percorrere un secondo arco AB della sua orbita, eguale al primo LA, il sole cerca d'avvicinarla all'eclittica DN per una quantità AE, e dovendo la luna in forza d'un moto composto descrivere la dia-

gonale AC del parallelogrammo ABCE, la di lei orbita diverrà ACM, invece di LABN; e quindi il nodo N di essa orbita continuamente cangia di sito, movendosi da N in M, con direzione cioè contraria al moto della luna diretto da A verso N. Dunque il moto del nodo d' un pianeta è sempre retrogrado rispetto all' orbita DN del pianeta turbante.

1063. La stessa figura mostra perchè l' attrazione del sole cangi l' inclinazione dell' orbita lunare (556): la luna costretta a seguire la nuova direzione ACM, incontrerà l' ecclittica NMD nel punto M, in cui l' angolo AMD è diverso dal primo AND. Di un tal cangiamento d' inclinazione negli altri pianeti non ne parlo qui, perchè è insensibile. Questo cangiamento poi è periodico, e non s' accumula; perchè se l' orbita turbata ACM forma in M un angolo maggiore di quello che formava in N l' orbita primitiva, quando il pianeta avrà passato il nodo N, succederà il contrario, e l' inclinazione andrà per gradi restituendosi come prima: i soli nodi cangiano sempre, e seguono la stessa direzione con moto che sempre più va retrocedendo, o sia che la luna s' accosti al suo nodo, o sia che se ne allontani. Il qual moto dei nodi produce dei cangiamenti nella inclinazione delle orbite planetarie, quando si riferiscono all' ecclittica (527).

1064. La precessione degli equinozj, o l' effetto delle attrazioni del sole e della luna sulla sferoide terrestre (756), è un effetto simile al moto dei nodi, ma è questa una delle parti più difficili del calcolo delle attrazioni celesti. Il Nevvton vi s' ingannò: il Sig. d' Alembert il primo ha sciolto compiutamente questo problema, e vi si occuparono ancora i SS. Euler, Simpson, le Chevalier d' Arcy, de Silvabelle, il P. Walmesley e molti altri; e io l' ho trattata questa materia colla più possibile chiarezza nel XXII libro della mia Astronomia.

1065. La teoria del moto de' nodi fa vedere, che un pianeta è incessantemente ritirato dal piano della sua orbita dagli altri pianeti (1062), e lo stesso avviene nelle parti della sferoide terrestre, che per essere elevate verso l' equatore, e per rivolgerli con esso lui in ciascun giorno, restano disturbate nel loro moto naturale dalle attrazioni laterali del sole e della luna, come se la porzione di materia (ch' è come un menisco), di cui si può concepire accresciuto il globo terrestre, fosse composta d' un gran numero di pianeti che girino in 24 ore intorno alla terra.

1066. Così per calcolare questa precessione si cerca da principio la forza, con cui il sole attrae ciascuna parte della terra; poi la forza totale, che ne risulta, per far girare un meridiano, e quindi la sferoide intera. Quando per un dato momento si conosce la forza, se ne deduce il moto per mezzo del calcolo integrale. Così si trovò, che la retrogradazione dell' equatore terrestre in ciascun anno deve essere di 20" prodotta dall' azione sola del sole, supposta la terra omogenea.

1067. La luna nello stesso modo vi produce un moto somigliante a quello del sole; la precessione da lei prodotta si trova facilmente per mezzo di quella del sole. Ma siccome la luna per causa del moto de' suoi

nodi che si compie in 18 anni , diversifica molto la sua distanza dall' equatore , e perciò la direzione e l'obliquità della sua attrazione sulle parti elevate dell' equatore , non solamente vi produce una continua retrogradazione , ma ancora una periodica ineguaglianza , il di cui periodo è di 18 anni , e una nutazione (795) che fu osservata dal Bradley .

1068. Se supponghasi col Bradley la nutazione di $18''$, la più grande equazione della precessione deve essere di $16''$, 8 ; la prodotta dal sole è di $16''$, 3 , e quella della Luna di $33''$, 7 ; perciò la forza della luna sarebbe 2 , 09 , cioè un poco maggiore del doppio della solare . Ma se la nutazione osservata solamente fosse di $19''$, si avrebbero $17''$, 8 per l'equazione , $14''$, 5 per la precessione solare , $35''$, 5 per la lunare , e $2\frac{1}{2}$ per la forza della luna . Con questo mezzo si concilierebbero le osservazioni delle maree (1090) con quelle della nutazione . Ho sempre supposta la forza della luna $2\frac{1}{2}$ maggiore della solare ; prendendo un mezzo si può supporla $2\frac{1}{4}$; ma non ne risulterà mai la precessione causata dal sole di $21''$

come si ha dalla teoria , ma di $15''\frac{1}{2}$; da ciò si ricava non essere la terra omogenea , quantunque non possiamo ancora decidere con certezza sopra la disposizione degli strati della medesima .

1069. Li $35''$ di precessione media prodotti dalla luna farebbero prodotti uniformemente come quelli che dipendono dal sole , se la luna si trovasse sempre nella stessa declinazione , quando corrisponde allo stesso punto dell' equatore ; ma per causa del moto de' di lei nodi (568) , nelle diverse sue rivoluzioni s' allontana più o meno dall' equatore , e agisce sopra di lui con più o meno di forza . Quando il nodo ascendente si trova in ariete , la massima lontananza della luna dall' equatore cresce fino ai $28^{\circ}\frac{3}{4}$; ma quando si trova in libra , nove anni dopo , non se

ne allontana che per $18^{\circ}\frac{1}{4}$ in ciascheduna rivoluzione ; e allora la di lei attrazione totale sopra la sferoide nel corso d' una rivoluzione è molto minore , vedendosi già ch' ella dipende dalla declinazione ; e perciò è tanto ineguale dentro lo spazio di 18 anni la precessione annua , e la nutazione tanto considerabile .

1070. Si osserva un effetto di tal nutazione essere l' accrescimento dell' obliquità nell' eclittica , ch' è di $9''$ quando la longitudine del nodo lunare è zero , cioè quando la luna si scosta il più che può dall' equatore , ed ha perciò maggior forza per cangiare il piano dell' equatore , e quindi l' obliquità dell' eclittica . Sia $Y G$  l' eclittica (fig. 130) , $Y M$  l' equatore ; $E G$ l' orbita della luna ; e questa si scosta molto dall' equatore verso il nord , quando il suo nodo ascendente G è in ariete ; allora la luna attrae l' equatore terrestre verso quella parte con maggior forza . Sembra che allora l' equatore $E M$ dovrebbe avvicinarsi all' eclittica

ca

ca E G; nonostante appunto allora l'angolo è il più grande, e l'obliquità dell'ecclittica invece d'essere di $23^{\circ} 28' 0''$, si trova di $23^{\circ} 28' 9''$.

1071. Per sciogliere questa difficoltà bisogna considerare, che il maggiore turbamento dell'equatore terrestre non succede in quel punto dello stesso, in cui agisce la luna, ma in distanza da esso di 90° . Così quando la luna percorrendo LA (fig. 131) agisce colla maggior forza sopra l'equatore YQ verso i punti solstiziali, il di lei effetto si fa sensibile soltanto verso gli equinozi Y e Δ , perchè il cangiamento di direzione nelle parti della terra fa loro prendere una diagonale, il di cui scostamento è più sensibile in distanza di 90° . Questo effetto prodotto verso gli equinozi non cangerà già l'obliquità dell'ecclittica o la distanza del punto E dell'ecclittica dal punto Q dell'equatore: vediamo quando succeda il massimo cangiamento.

1072. Quando il nodo della luna è in G (fig. 130) nel solstizio, la stessa luna traversando l'equatore in E non agisce contro la di lui inclinazione; perchè per questo fine bisogna che vi si trovi a una certa distanza, e tanto più agisce quanto più ne sarà discosta. Essendo in G nella massima distanza dall'equatore, allora lo attrae con massima forza; se MO è il moto diurno dell'equatore terrestre in 1° di tempo, e OF la quantità della forza esercitata dalla luna perpendicolarmente al suo piano, la direzione dell'equatore diverrà MF; dunque l'equatore MS comparirà più lontano dall'ecclittica N sul coluro dei solstizj NS, su cui si misura l'obliquità dell'ecclittica; dunque l'obliquità dell'ecclittica comparirà accresciuta per l'azione della luna.

1073. Per tutto il tempo, in cui il nodo ascendente G sarà nella parte boreale dell'ecclittica o nei segni ascendenti, si osserverà questo effetto; ed ecco la ragione, per cui s'accresce sempre più, e finalmente quando il nodo G col suo moto retrogrado giunge in ariete, l'azione della luna diviene nulla; ma l'equazione dipendente dall'effetto, che è stato prodotto fino a questo punto, è il massimo, come nel moto ellittico dei pianeti la massima equazione succede allora quando la velocità cessa di crescere (497); quindi è che la obliquità dell'ecclittica è la più grande quando l'azione della luna sull'ecclittica ha meno di forza per produrre un tale accrescimento; e quando perciò sembrerebbe dover produrre un effetto contrario.

Del flusso e riflusso del mare.

1074. Tre principali fenomeni s'osservano nel mare e molto considerabili; il primo succede due volte al giorno, il secondo due volte al mese, il terzo due volte all'anno. Ogni giorno sul passaggio della luna per il meridiano o poco dopo, l'acque si alzano presso il lido; quest'altezza a S. Malò arriva fino a 45 piedi; giunte le acque a quest'altezza, si abbassano poi a poco a poco, e sei ore in circa dopo la massima loro elevazione, si trovano nel massimo loro abbassamento; dopo il quale tornano di nuovo ad alzarsi nel passar della luna per il meridiano di sotto; in

in guisa che due volte al giorno si vede il flusso e riflusso il *Flos* e il *Jusan*, e ciascun giorno si ritardano di 48' più o meno, siccome si ritarda il passaggio della luna per il meridiano.

1075. Riguardo al secondo fenomeno, le maree si accrescono sensibilmente nel novilunio e plenilunio, o un giorno e mezzo dopo, il quale accrescimento è sensibilissimo quando la luna è perigea. Il terzo fenomeno finalmente è l' accrescimento che succede verso i due equinozi; e generalmente la più alta marea succede nella sizigia perigea che accade verso l' equinozio.

1076. Il più antico autore che abbia parlato delle maree, secondo Strabone, (dopo il mezzo del suo I. libro) è Omero (*Odiss.* XII. 105.) in proposito di caribdi; e dice che le acque si alzano tre volte al giorno; Strabone giudica che la parola *tris* sia stata adoperata per figura poetica in luogo di *die*, due volte; si potrebbe anche credere Omero poco informato su questo punto, o qualche corruzione del testo (*Coffard. Hist. of astron. pag. 256, 268*).

1077. Erodoto parlando del mare rosso, e Diodoro di Sicilia parlano d' un flusso grande e rapido, senza però trattare della causa, *πῦρ δὲ πρὸς τῷ ἐπὶ τῷ πρὸς τῷ*. Il primo fra i greci a usare qualche attenzione sulla causa fu Pitea di Marfiglia; era egli stato in Inghilterra, secondo Strabone, e avea perciò dovuto osservarvi le maree dell' oceano; e Plutarco ci dice, ch' egli infatti le riguardava come regolate dalla luna in qualche modo; è bensì vero che non parla se non d' una marea al mese, ma in questo punto Plutarco certamente s' inganna.

1078. Aristotele nelle molte sue opere di fisica scritte 300 anni avanti G. C. quasi non parla delle maree, non trovandosi che tre passi cortissimi su questo punto; il primo in cui dice, che v' ha un gran flusso nelle acque che sono verso il nord, o dalla parte dell' orsa, (*Meteorol. L. II.*); il secondo in cui dice, che si parla di elevazioni d' acque regolate dalla luna (*de mundo c. 4. in fin.*); il terzo, in cui osserva che la marea in un mare grande è maggiore che in un più piccolo (*Probl. solut. 23.*). Non troviamo cosa alcuna, che ci mostri Aristotele occupato nella ricerca di tali fenomeni a segno di essere morto per disperazione cagionatagli dalla sua curiosità, come lo scrissero S. Giustino e S. Gregorio Nazianzeno. Generalmente i Greci erano pochissimo informati di tal materia, e leggevi in Q. Curzio quanto i soldati d' Alessandro giunti all' Indie si stupirono nel vedere i vasselli in secca.

1079. Al tempo di Cesare i Romani istruiti delle loro conquiste cominciarono a mostrare qualche cognizione intorno a questo punto di fisica. Cesare ne parla ne' suoi commentarj (L. IV.). Strabone dopo Posidonio spiega che il moto dell' oceano è simile a quello de' cieli, avendo un moto diurno, uno menstuo e uno annuo. Che il mare s' innalza nel passare della luna per il meridiano tanto sopra che sotto dell' orizzonte, e che si abbassa nel nascere e tramontare della medesima. Che le maree sono maggiori nei novilunj e plenilunj e nel solstizio estivo.

1080. Plinio non solamente spiega i fenomeni , ma altresì la causa : *causa in sole lunaque ut ancillantes syderi avido trabentique secum haustu maria* , (*L. II. c. 97*) . Seneca ne parla esattamente (*quest. nat. III. 28. Quare bonis viris mala accidunt c. 1*) . Macrobio autore del IV secolo descrive benissimo i moti dell'oceano parlando del periodo de' sette dì (*Somm. Scip. I. 6*) .

1081. I diversi modi addotti in diversi tempi per ispiegare l' effetto della luna sulle maree , sono tali , che non mi credo in obbligo d' accennarli . Leggasi Plutarco *de Plac. phil. L. III. c. 17* . Galileo *de system. mundi Dial. 4* . Riccioli *Alm. II. p. 374* . Gassendi *Op. II. pag. 27* . Wallis *opera* , ec. Keplero fu il primo a scorgervi l' effetto dell' attrazione universale nelle maree , e ne parla in modo eloquente nella sua opera *de stella martis* .

1082. Il Nevvton dopo la scoperta dell' attrazione generale vi trovò gli effetti che doveano nelle maree prodursi dal sole e dalla luna , e nel suo libro de' Principj tratta questa materia colla solita sua superiorità . Finalmente l' Accademia delle Scienze avendo risolto nel 1738 di trattare di nuovo ed esaurire le parti del sistema del mondo , che il Nevvton non avea potute compiere , propose per il premio del 1740 il soggetto delle maree : i pezzi delli Sigg. Bernoulli , Euler e Mac-Laurin che si divisero il premio , sono eccellenti .

1083. La prima cosa che si presenta da dimostrarsi ella è : che l' attrazione della luna o del sole considerata separatamente nell' agire sopra uno strato sottilissimo di fluido che circonda un globo , deve ridurlo in forma ellittica . Il Sig. Mac-Laurin nel suo pezzo del 1740 lo dimostrò ingegnosamente . Il Sig. Clairaut lo dimostra nella *Théorie de la fig. de la terre* ; e facilmente si applica alle maree la stessa dimostrazione , perchè la forza del sole e della luna sulle differenti parti della terra , è della stessa spezie colla forza centrifuga , e produce , com' essa , nelle sue acque una figura ellittica . Io l' ho dimostrato diffusamente nel libro XXII della mia *Astronomia* .

Le acque s' innalzano non solamente verso l' astro che le attrae , ma ancora verso la parte opposta , perchè se l' astro tira le acque superiori più di quello che attragga il centro della terra , parimenti attrae più il centro della terra , che le acque inferiori , e queste abbandonano il centro della terra , e s' innalzano perciò tanto , quanto le superiori verso l' astro che le attrae . I Cartesiani non hanno mai voluto intendere questa marea , quantunque sia un effetto incontestabile dell' attrazione . Tutti i cerchi della terra , la comune sezione de' quali è diretta verso la luna , acquistano parimenti la forma ellittica , così il globo acquoso si cangia in una ellipsoide allungata , il di cui asse maggiore è diretto verso l' astro che attrae le acque .

1084. Il grado d' ellitticità di questo sferoide è uguale a $\frac{1}{4}$ della forza perturbatrice , quando è la più grande , in modo che avendo calcolato la forza attraente del sole sulle acque , si trova che lo schiacciamento di que-
sto

sto sferoide è di 23 pollici, e questa è la quantità di cui la forza sola del sole è capace d'innalzare le acque del mare sotto l'equatore. Vedremo che la forza della luna è tripla; onde ne risulterebbero 8 piedi di marea in un mare libero e aperto; ma questa altezza resta per lo più diminuita dalla resistenza del fondo; perchè nell'isola di S. Elena non si osserva che di 3 piedi, come ancora al Capo di B. Speranza, nelle Filippine e Molucche; e nel mezzo al mare del sud di un solo piede. Al contrario viene spesso accresciuto dal sito e dalla figura delle coste, poichè a S. Malò arriva l'altezza fino a 45 piedi e alle volte anche più.

1085. Il vertice però di questa ellipsoide acquosa non si dirige precisamente verso il sole o la luna; perchè si osserva, che la marea non succede se non che $2\frac{1}{2}$ ore dopo il passaggio della luna per il meridiano nei mari liberi; e così l'osservarono l'Ab. de la Caille al Capo (*Mem. Acad. 1751*), e Maskelyne nell'isola di S. Elena 2 ore e $\frac{5}{4}$

dopo il detto passaggio (*Phil. transf. 1762*). Perciò quando parleremo in avvenire dell'astro, che produce la marea, bisognerà intendere un punto 35° in circa più orientale del vero luogo dell'astro stesso. Nelle coste poi che sono più remote la marea si ritarda anche più, come si scorge dalla tavola dell' *Etablissement du Port*, ch'è nella *Connaissance des Temps*, nell'architettura idraulica di Belidoro, e in tutti i libri di navigazione, come quelli del P. Fournier, di Bouguer, di Robertson.

1086. In una ellissi di poca eccentricità gli eccessi dei raggi sopra il semiasse minore sono come i quadrati dei seni delle distanze dall'asse minore (821); così facendo la sferoide acquosa successivamente col sole il giro intiero della terra, li paesi situati sotto l'asse maggiore saranno inondati, e li situati sotto il minore avranno la bassa marea, e la differenza fra la bassa marea e l'alta per un istante qualunque sarà eguale all'eccesso d'uno dei raggi sopra l'asse minore dell'ellisse.

L'altezza dunque della marea sopra la bassa è in qualunque luogo eguale alla maggiore altezza delle acque moltiplicata per il quadrato del coseno della distanza dell'osservatore dal vertice dell'ellipsoide, cioè della distanza fra il zenit del luogo e l'altro che produce la marea, supposta la direzione dell'ellipsoide verso lo stesso astro; così la bassa marea succede quando l'astro si trova nell'orizzonte, e l'alta, quando nel meridiano.

1087. Quindi ne segue, che se un dato luogo e l'astro che produce la marea sono ambedue sotto l'equatore, l'altezza della marea è come il quadrato del coseno dell'angolo orario; e la elevazione cresce a poco a poco come i quadrati dei tempi in vicinanza del meridiano; come lo mostrano le osservazioni (*Mem. Acad. 1720, p. 360*).

Se il dato luogo è lontano dall'equatore, l'altezza delle maree è come il quadrato del coseno di latitudine; ma quando la latitudine è sì grande, che la luna non vi tramonti più in certi tempi, non vi succede che una sola marea in 24 ore, perchè la luna non s'avvicina che una sol

volta all' orizzonte. Sotto il polo non vi si eccita alcuna marea diurna , perchè la luna si mantiene sensibilmente per tutto il giorno nella stessa distanza dal zenit , e la sferoide acquosa gira senza innalzarsi più in un' ora che in un' altra. Negli altri casi vi accadono due maree , una delle quali corrisponde in circa al passaggio della luna per il meridiano superiore , l' altra allo stesso per l' inferiore ; ma sono tra loro assai diseguali.

1088. Se l' astro poi non si trova nell' equatore , la marea in un paese sotto l' equatore farà come il quadrato del coseno della declinazione , perchè questa stessa declinazione farà eguale alla distanza dell' astro dal zenit , o alla distanza del punto dato dal vertice dell' ellissoide . Se il dato luogo non è sotto l' equatore , la marea superiore farà maggiore , giusta la teoria , quando l' astro passerà più in vicinanza del zenit , cioè quando la declinazione dell' astro farà dello stesso nome col polo elevato ; ma la marea inferiore farà minore di quando l' astro si trovava nell' equatore , perchè il punto opposto all' astro farà più dell' equatore lontano dal zenit , quando l' astro si troverà nella parte di sotto del meridiano.

1089. Osservasi nonnostante che le maree in Europa sono maggiori generalmente dopo gli equinozi che verso il solstizio d' estate ; il che probabilmente nasce da alcune circostanze particolari . 1° I venti del sud e dell' ouest sono allora più frequenti e più forti . 2° La marea del solstizio è più rinchiusa fra i continenti dell' Affrica ed America , e più rinferrata di quella degli equinozi ; e perciò può renderli meno sensibile alle nostre coste . 3° Nei solstizj vi sono due maree , una delle quali è più forte , l' altra più debole , e si compensano scambievolmente ; e al contrario negli equinozi ve n' hanno due quasi eguali , l' intero effetto delle quali è più sensibile . Aggiungiamo però non essere generalmente vero quel che si dice comunemente , che le maree degli equinozi sono maggiori nell' anno ; anzi le maree più grandi e più straordinarie , che si sappiano , non sono già accadute verso gli equinozi , come si vedrà da una memoria da me letta all' Accademia nel 1772 sopra la marea degli equinozi.

1090. Se la forza del sole è capace di trasformare la superficie dell' acque dell' oceano in una sferoide allungata , il di cui vertice si dirige verso il sole medesimo , anche la luna deve produrre un simile effetto . Così le maree , che si osservano , partecipano dei moti del sole e della luna insieme . Nelle sizigie la sferoide acquosa prodotta dal sole e quella prodotta dalla luna hanno la direzione verso la stessa parte ; e l' allungamento della sferoide stessa è uguale alla somma degli allungamenti che il sole e la luna possono separatamente produrre ; ma nelle quadrature gli assi di queste due sferoidi sono fra loro ad angolo retto , e l' asse maggiore della sferoide solare accresce il minore della lunare . Così le maree delle sizigie sono eguali alla somma degli effetti prodotti dal sole e dalla luna , e quelle delle quadrature alla differenza . Dunque dalle altezze delle maree si può rilevare il rapporto tra le forze del sole e del-

e della luna. Daniele Bernoulli supponendo la diversità d'altezza nel mare a S. Malò di 50 piedi nelle maree medie delle sizigie e di 15 in quelle delle quadrature, conchiude la forza del sole e della luna essere come 13 a 7, ma dopo l'esame di varie osservazioni, specialmente sugli intervalli delle maree, di cui parleremo (1092), conchiude che la forza della luna è due volte e mezza maggiore di quella del sole nelle medie distanze.

1091. La forza della luna, quando è apogea, si diminuisce quanto s'accresce il cubo della distanza (1050); in guisa che se la forza media della luna è $2\frac{1}{2}$, la più grande nel perigeo sarà eguale a 3, e la più piccola a soltanto nell'apogeo. Infatti i cubi delle parallassi estreme cioè di 53' 51", e 61' 29" sono appressi a poco come 2:3. Questo accrescimento delle maree nel perigeo della luna è pienamente d'accordo colle osservazioni.

I cubi delle distanze del sole dalla terra nell'inverno e nell'estate sono fra loro come 1:1,106. Dunque la forza del sole nell'inverno è maggiore di $\frac{1}{10}$, e se dei 12, o 23 piedi di marea a Brest quando la

luna è perigea, se ne devono attribuire $5\frac{3}{4}$ all'azione del sole, devono esservi a Brest nell'inverno 7 pollici di più che nell'estate, per il solo effetto delle distanze del sole dalla terra; ma questa quantità è sì piccola, che non si può ben verificarla coll'osservazione.

1092. Finora non abbiamo parlato delle maree, che rispetto alle sizigie e quadrature; ora delle intermedie. Quando il sole e la luna si trovano in qualche distanza fra loro, ciascuno produce un innalzamento diverso in un dato luogo, e la somma di questi due innalzamenti è l'altezza appunto della marea, che si cerca. Essendo la forza della luna dupla o tripla di quella del sole, il punto dell'alta marea s'avvicina due o tre volte più alla luna che al sole, e non si scosta mai dalla luna più di 15°. Quindi il passaggio della luna per il meridiano è quello che più influisce sul tempo dell'alta marea; così la differenza fra il passaggio della luna e il momento della marea alta non è mai maggiore di 63' di tempo, nè anche nel caso in cui la luna è perigea e lontana dal sole per 60°. Il Bernoulli colle sue formule determinò il massimo di questa differenza fra il passaggio della luna e la marea alta; ma facilmente si può determinarlo col calcolo astronomico per mezzo di alcune false posizioni per tutte l'elongazioni della luna. Sia ABM (fig. 128) la sferoide acquosa, il di cui vertice o sia il punto della marea alta è in A, e il sole corrisponda al punto H, la luna al punto L; possa la distanza LH della luna dal sole di 60°, LA sarà la distanza della luna dalla marea alta, e quella del sole AH. Dettasi 1 l'altezza della più grande marea prodotta dalla sola azione del sole, si avrà $\cosen.AH^3$ per l'altezza in A prodotta dal sole (1086), e $3\cosen.LH^2$ per l'altezza in A prodotta dalla luna perigea. Se si suppongano LA di 90°, ed

A H di 51° , si troveranno questi due termini 0, 3961 e 2, 9266; e l'altezza intiera della marea sarà 3, 3227. Se pongasi $LA = 90^{\circ}\frac{1}{2}$, si avranno 2, 9183 e 0, 4046, e perciò 3, 3229. Se $LA = 100^{\circ}$, si avranno 2, 9095 e 0, 4132, e perciò la marea intiera 3, 3227. Facilmente si vede che il *massimo* della loro somma si ha posto LA di $90^{\circ}\frac{1}{2}$.

Dunque la più grande altezza della marea succede quando il sole e la luna si trovano tra loro in distanza di 60° , e la luna perigea.

1093. Per sapere quanto più presto della luna passerà il punto A per il meridiano, si noterà che essendo il ritardamento diurno della luna perigea di ore 1. 6', quei $90^{\circ}\frac{1}{2}$ rendono 40' di tempo, così l'alta marea passerà per il meridiano 40' più presto della luna. Quando la luna è apogea e la forza della stessa soltanto doppia di quella del sole, il *massimo* corrispondente ai 60° di distanza, è di 2, 3660; e questo punto è in distanza di 15° dalla luna; questi 15° rendono $61^{\circ}\frac{3}{4}$ di tempo lunare;

dunque nell'apogeo della luna la differenza fra il passaggio per il meridiano e la marea alta è di ore 1, 3'. Nella *Connoissance des Temps* ho inserita molte volte una tavola di queste differenze per ciaschedun grado di distanza della luna dal sole.

1094. Di questa differenza fra il passaggio della luna per il meridiano e l'ora della marea alta si servì ancora il Bernoulli per determinare il rapporto fra le forze lunare e solare. Supponiamo che nelle distanze medie, H A corrisponda a 34' di tempo, e che A L sia di 14'; facilmente si scorge, che queste due quantità sono in ragione inversa delle forze del sole e della luna, onde ne nascerà che queste forze sieno tra loro come 14 : 34, cioè appresso a poco come 1 : 2 $\frac{1}{2}$.

1095. Dai principj finora stabiliti ne nasce una regola generale per calcolare in un qualunque luogo e per qualunque ora l'altezza della marea. Primieramente bisogna trovare il luogo del sole e della luna colle loro distanze dalla terra. Poi calcolare le loro declinazioni e altezze per il dato luogo (368), supponendo l'angolo orario maggiore di $3^h \frac{1}{4}$ per Brest, di 6^h a S. Malò, o a Plymouth, ec. più o meno secondo l'ora del porto. Quando quest'altezza calcolata sarà zero, si avrà la marea bassa nel luogo dato, perchè il vertice della sferoide sarà nell'orizzonte. Il quadrato poi del seno di quest'altezza del vertice acqueo moltiplicato per l'effetto maggiore della luna nella data distanza (1091) darà l'altezza della marea, o la differenza della più bassa marea lunare da quella che si ha nel tempo dato; lo stesso calcolo si ripeterà per il sole, e la somma di queste due altezze darà la intiera marea.

1096. E' ben fatto il riferirla a un punto fisso o al livello naturale per combinarla con quella del sole riferitasi allo stesso livello. Per avere que-

sto livello o punto fisso, bisogna prenderlo sopra la bassa marea soltanto d'un terzo della differenza fra la bassa marea e l'alta; perchè s'è dimostrato che la salita è doppia della discesa nelle sizigie. La marea a Brest nel caso più favorevole è di 23 piedi; il terzo è di piedi 7 pol. 8, e questa è l'altezza del livello naturale del mare sopra la bassa marea. Molti osservatori vi si sono ingannati prendendo per termine medio il punto di mezzo.

1097. Si suole obbiettare, che se l'attrazione fosse la causa delle maree, dovrebbero esse succedere tanto nei piccoli quanto nei mari grandi; ma si dimostrò che nei piccoli deve la marea essere insensibile. Supponiamo che RM (fig. 131) sia una parte del globo terrestre, SM una porzione della sferoida acquosa, che si osserverebbe se il mare fosse libero e coprisse tutta la terra; se siavi un piccolo tratto di mare della sola larghezza ZX da oriente verso occidente, le acque non possono adattarsi alla curvatura VS, perchè non sono circondate da altre acque, che possono sostituirsi nel loro luogo quando si alzassero, e perciò si adatteranno soltanto a una curvatura simile ad RO, tale, onde sia $VO = SR$, restando sempre la superficie COR uguale alla superficie CZX. Da ciò si vede senza calcolo, che la marea in tali acque farà tanto meno sensibile, quanto farà minore la lunghezza del mare in longitudine, poichè la superficie del triangolo ZCX si diminuisce come ZX, e l'inclinazione delle linee OR, ZX non può essere maggiore dell'angolo fatto dal cerchio e dall'ellissi in M. Così il Bernoulli dimostra colle sue formule che la marea totale di questo mare sta a quella che si avrebbe nel mare libero, come la lunghezza ZX di esso mare in longitudine al seno tutto.

Lo stesso autore prova ancora, che se il mare avesse un'estensione di 90° , la marea farebbevi soltanto un sesto più alta che nel mare libero, e vi giungerebbe un'ora e s' più tardi di quello che se la terra tutta fosse inondata da acque.

E' anche chiaro a vedersi che in un mare stretto quando l'acque s'innalzano verso i lidi R, s'abbassano verso gli opposti O.

1098. Tralascio le modificazioni particolari, alle quali va soggetta la legge universale delle maree in differenti paesi per causa della situazione dei mari e de' lidi; veggasi ciò che ne dice il Nevvton di Batsham nel Tunquin, dove non vi succede che una sola marea al giorno; veggasi anche ciò che fu scritto sulle maree straordinarie dell'Euripo nel secondo Tomo de' viaggi di Spon, nel Dictionnaire de la Martiniere, nelle Lettere di Buchoz; e per le maree dello stretto di Gibilterra veggansi le *Transphil.* 1762.

1099. Le osservazioni poi delle maree fatte in Francia si troveranno esattamente descritte specialmente nelle *Mem. de l'Acad.* 1710, 1712, 1713, 1714, 1720 e in un trattato particolare, che mi propongo di pubblicare su tal punto.

In questo libro XII non ho potuto spiegare che leggermente l'attrazione, perchè questa materia essendo imbarazzata di calcoli sottilissimi non potrebbe così essere addattata per quelli all'uso dei quali ho scritto questo

Com-

Compendio ; ma vi troveranno forsi eccitata la loro curiosità a fare uno studio più profondo .

1100. A questa traduzione manca un trattato del calcolo astronomico ; ma chi ne fosse curioso , può consultare la mia *Astronomia* ediz. del 1771 che abbraccia un corso più completo di questa Scienza .



S P I E G A Z I O N E

Della Tavola che contiene il risultato di tutta l'Astronomia.

La Tavola seguente contiene tutti gli elementi che non ho scritti in questo compendio al loro luogo, per maggior comodo dei Lettori, che li troveranno tutti insieme qui raccolti. Le rivoluzioni tropiche per es. avrebbero avuto il loro luogo all' art. 454, ove le ho spiegate, e la Tavola stessa nel titolo della colonna delle rivoluzioni segna quell' articolo 454.

I diametri, le grossezze e distanze de' pianeti in questa Tavola sono calcolate dall' ultima parallassi del sole, che ho trovato col paragone delle osservazioni di $8'' \frac{1}{2}$: perciò questa Tavola è più esatta di quella che sta nella mia *Astronomia*, che fu stampata prima che avessimo ricevute le osservazioni più certe del passaggio di venere del 1769.

Può darfi che la parallassi media del sole, che io suppongo di $8'' \frac{1}{2}$ in numero rotondo, sia alquanto maggiore; il Sig. Lexell, che studiò su queste ricerche dopo di me con la esattezza la più scrupolosa, trovò $8'', 63$ invece di $8'', 55$, come avea io fissato nella mia Memoria; e a tanto, secondo il mio giudizio, (cioè a $\frac{1}{12}$ di secondo) si riduce tutta l'incertezza su questo punto; e per questa piccolezza appunto ho stimato potermi dispensare dal rifare questa mia Tavola, anche se tal differenza si fosse ben verificata.

Le rivoluzioni sono computate in anni comuni, soltanto di giorni 365, in giorni, ore, min. sec. e decime di sec. di tempo medio.

Il diametro del sole è qui più piccolo di quello che ho poi determinato con più esatte osservazioni, la differenza è di alcuni sec., ma parvemi dalla durata dell' eclissi, che il vero diametro del sole fosse ingrandito dall' irradiazione della sua luce. Le cifre dopo la virgola indicano decimali; per esempio leggendosi il diametro della luna di $4'', 642$, significa 4 sec. seicento quarantadue millesime di secondo.

Parimenti la velocità de' gravi sulla superficie della terra si vede segnata di piedi 15, 1038, cioè piedi 15 con mille trentotto diecimillesime di piede: alla velocità che realmente osservasi sotto l' equatore, ho aggiunta la quantità di cui resta diminuita dalla forza centrifuga, per indicare la vera velocità, che si avrebbe se la terra fosse immobile; e lo stesso dicasi degli altri pianeti.

Cal.

Calcolando la densità di saturno, ho preso un termine di mezzo fra le masse che risultano dalle distanze dei cinque satelliti osservati dal Cassini; altri Astronomi si contentano della distanza del quarto satellite, ch'è più noto degli altri. Tralasciai la massa dell'anello supponendola unita al globo di saturno, essendo troppo piccola la di lui grossezza; e poi la di lui massa, che veramente è incognita, non può aver luogo nel calcolo.

Per mezzo delle distanze medie della Tavola si possono trovare la massima e la minima distanza di ciaschedun pianeta dalla terra; per esempio mercurio è lontano dal sole 13 milioni di leghe; il sole dalla terra 34 milioni delle medesime; la somma 47 milioni darà la massima, e la differenza 21 milioni darà la minima distanza di mercurio dalla terra. Nello stesso modo troveremo la massima distanza di saturno dalla terra di 375 milioni, e la minima di 297.

Tutta l'incertezza che può esservi sulle distanze del sole e degli altri pianeti dalla terra è d'incirca $\frac{1}{200}$ della totale, per il sole forse di 200000 leghe. Ma la distanza della luna è molto più esattamente nota, e tra le 86000 leghe della di lei distanza, non v'è un'incertezza di 50 leghe.

Le distanze medie di mercurio e di venere in questa Tavola sono segnate rapporto al sole; perchè rapporto alla terra sono eguali alla distanza stessa del sole dalla terra, cioè di leghe 34761680.



Tavola che contiene il risultato delle più recenti osservazioni per le rivoluzioni, grandezze e distanze de' Pianeti.

Pianeti	Rivoluz. Tropica (454)			Rivoluz. siderale (321)			Rivoluz. Sinodica (557)				
	An. Gior.	Ore Min.	Sec.	An. Gior.	Ore Min.	Sec.	An. Gior.	Ore Min.	Sec.		
Sole	1	0	5	48	45,5	1	0	6	9		
Luna	0	27	7	43	4,6	0	27	7	43		
Mercurio	0	87	23	14	25,9	0	87	23	15		
Venere	0	224	16	41	32,4	0	224	16	49		
Marte	1	321	22	18	27,3	1	321	22	30		
Giove	11	315	8	58	27,3	11	317	8	11		
Saturno	29	164	7	21	50,0	29	176	14	36		
			Diamet. in Min. e Sec. (532)			Diametri in leghe (534)			Diam. in miglia geogr. da 60 algr.		
Sole	31'	57,5	323155	770107	112 Diam. terrest. o sia 112, 79						
Terra	17,0	2865	6828	1864	$\frac{1}{11}$ o $\frac{1}{11}$ del diam. terr. ---	1,000					
Luna	4,642	782	1864	2812	due quinti ---	0,41176					
Mercurio	7,0	1180	6637	4578	minore di $\frac{3}{10}$ ---	0,97196					
Venere	16,52	2785	6637	4578	due terzi, 0 ---	0,67059					
Marte	11,4	1921	4578	77793	undici diam. e $\frac{1}{2}$ ---	11,393					
Giove	3	23,7	32644	68957	dieci diam. ---	10,100					
Saturno	2	51,7	28936	160901	27. diam. e $\frac{3}{2}$ ---	23,567					
Anello di Saturno	6	40,6	67518								
			Groschezza o volume rispetto alla Terra prossimamente		Più esattamente e in decimali		Densità rispetto alla Terra (1021)				
Sole	1400000 volte più grosso			14,35025	0,25463	*					
Luna	quadragesima nona parte della terra			0,02036	0,68706	*					
Mercurio	sette centesime			0,06981	2,0377						
Venere	undici duodecime			0,91822	1,2750						
Marte	tre decime			0,30155	0,72917						
Giove	1479 terre			14,79	0,22984	*					
Saturno	1030 terre.			10,30	0,10450	*					
Massa rispetto alla terra (1019)			Velocità dei gravi alla loro superficie (1014)		Distanza dalla terra in leghe di 2283 toef. l'una (585)		Distanza stessa in miglia geogr. da 60 al grado				
			Piedi		Media						
Sole	365412		433 81		34761680		82840204				
Terra	1		15 1038		-----		-----				
Luna	0,01399		2 83		86324		205718				
Mercurio	0,14228		12 673		33456204		32067342				
Venere	0,1707		18 717		25144250		59981005				
Marte	0,21988		7 39		52966122		126223023				
Giove	340,00		39 55		180794791		430850217				
Saturno	106,90		15 83		331604504		790243301				

R r

T A V O -

1434602 A

T A V O L A

D E L L E M A T E R I E

I numeri indicano gli articoli, non le pagine.

<i>Aberrazione delle fisse art.</i>	<u>722</u>	Modo di conoscerle	232
Suo uso per la teoria de'		<i>Copernico</i>	<u>382</u>
satelliti	840	<i>Culminazione, mediazione,</i>	
<i>Accelerazione della Luna, 564.</i>		passaggio per il Meridiano	<u>363</u>
corpi gravi	981	<i>Crepuscolo</i>	<u>108</u>
<i>Afelii, 482. Loro posizioni,</i>	<u>114</u>	<i>Declinazione</i>	91
Moto	1016	<i>Densità de' Pianeti</i>	1021
<i>Altezze degli Astri</i>	22	<i>Deviazione delle Stelle</i>	794
Del Polo	33	<i>Diametri de' pianeti</i>	532
Corrispondenti	<u>322</u>	(v. la Tavola alla pag. 313)	
<i>Amplitudine</i>	<u>369</u>	<i>Dicotoma</i>	540
<i>Anello di Saturno</i>	<u>971</u>	<i>Digitì nell' Ecclissi</i>	628
<i>Anno tropico, 312. Siderale</i>	321	<i>Distanza accorciata</i>	438
<i>Anomalia</i>	<u>482</u>	dei pianeti	585
<i>Apogeo del Sole</i>	<u>310</u>	(e pag. <u>313</u>)	
Della Luna	<u>119</u>	<i>Eccentricità</i>	<u>101</u>
<i>Apfidi della Luna</i>	<u>119</u>	<i>Eccentrico</i>	311
Dei Pianeti	482	Anomalia eccentrica	482
<i>Archi semidiurni</i>	<u>367</u>	<i>Ecclittica</i>	64
<i>Argomento di latitudine</i>	<u>428</u>	Riduzione all' Ecclitt.	401
<i>Ariete</i>	<u>247</u>	<i>Ecclissi della Luna</i>	<u>614</u>
<i>Ascensione retta</i>	89	Del Sole	634
<i>Atmosfera</i>	723, 737	Delle Stelle	<u>722</u>
<i>Azimuto</i>	<u>284</u>	De' Satelliti	847
		Totali, annulari	634
<i>Bussola</i>	<u>231</u>	Uso delle stesse	712
		<i>Eliocentrico,</i>	<u>427</u>
<i>Cerchi della sfera</i>	101	<i>Ellisse</i>	482
di latitudine	<u>96</u>	<i>Emergione d'un Satellite</i>	
<i>Circolari</i>	31	dall' ombra	861
<i>Climi</i>	<u>127</u>	<i>Epoche dei moti medj</i>	442, 509
<i>Code delle Comete</i>	876, 923	<i>Eguatore</i>	<u>11</u>
<i>Coluri</i>	<u>102</u>	<i>Eguazione del Centro</i>	
<i>Comete, 876. Loro ritorno</i>	<u>910</u>	o dell' orbita	482
<i>Commutazione</i>	<u>448</u>	Della Luna	557, 1052
<i>Congiunzione</i>	<u>457</u>	Della luce	838
<i>Cosellazioni</i>	<u>229</u>	Del tempo	355
Loro numero	<u>230</u>	Delle altezze	<u>322</u>
		<i>Equi-</i>	

Equinozj; punti Equinoziali	66	pag. 313)	
Est, o Oriente	7	Mercurio 83, 725. v. pianeti	
Erezione della Luna 560,	1052	Meridiano 19. Meridiana	162
Fasi	540	Micrometro	133
Figura della terra	803	Moto annuo	19
Flusso del Mare	1074	Diurno	1
Forza acceleratrice	981	Dei corpi terrestri	981
attraente	980	Proprio dei pianeti	422
centrale	1005	Accelerato	981
perturbatrice	1037	Nadir	8
Geocentrico	427	Nodi della luna	565
Giorni	234	Dei pianeti	426
Giove v. Pianeti		Loro moto	119. 1060
Grossezza dei Pianeti (v.		Nonius	342
la Tav. pag. 313)		Nutazione 794. Sua causa	1067
Immersione dei Satelliti, o il loro		Obliquità dell' ecclittica	70
ingresso nell' ombra di		Cangiamento	799. 1070
Giove	261	Occultazioni	722
Inclinazioni dell' orbite	522	Ombra della terra	617
Della luna	565	Orbita apparente	711
Degli assi de' pianeti	970	relativa	609
Ineguaglianze della luna 111	1052	della luna	560
Infestione	723	d' un pianeta	482. 509
Istrumenti d' Astronomia 331.	533	Orizzonte	11. 824
Jufan	1074	Ovest, occidente	7
Keplero, leggi (di)	467	Parabola delle comete	888
Latitudine geografica	41	Parallasse	441. 574
Celeste	427	Nella sferoide	591
Leggi dell' attrazione	997	Paralleli	2. 27
Dol moto	479	Passaggi sotto il sole	726
Levare	363	Pendulo semplice	806
Libra	266	Penombra	631
Librazione	961	Periclio	482
Limiti	616	Perigeo	310
Livello apparente	824	Pianeti 83. loro asellii,	514
Longitudine d' un astro	93	Equazioni	105
D' un luogo terrestre	47	Inclinazioni	522
Dei pianeti nel 1772	442	Nodi	518. 1060
Lunghezza del pendulo	806	Rotazioni	970
Luna sue fasi,	55. 550	Masse. Rivoluzioni, diametri	
sue ineguaglianze	555. 1052	densità, distanze (v. Tav. pag	
suoi monti	968	313)	
Macchie dei pianeti	930	Piano	424
Maree	1074	Polare (stella)	4
Marte 83. v. pianeti		Polari cerchi	102
Massa, 1018. (v. la Tav.		Poli	3

<i>Preceffione degli equinozj</i> , 794. 1064	<i>Solfizj</i>	68
<i>Projezione</i> , moto di projezione, o in	<i>Stagioni</i>	127
linea retta	Loro caufe	414
Ortografica	Quando cominciano	79
<i>Quadrante</i>	<i>Stelle</i>	230
<i>Quadratura</i>	Cangianti e nebulofe	283
<i>Raggio vettore</i>	<i>Tempo vero</i> 353. medio	345
<i>Rifrazioni</i>	Affronomico	224
<i>Retrogradazioni</i>	<i>Termometro</i> , fua coftruzione	128
<i>Riduzione all' ecclittica</i>	<i>Terra</i> mobile intorno al fole	391
<i>Rivoluzioni de' pianeti</i>	(v. figura)	
(v. Tav. pag. 313)	Suo volume o folidità	823
Del fole	Sua fuperficie	ivi
Della luna	Mafla o pefo	ivi
Tropiche	<i>Traiettoria</i> , o fia orbita de' plane-	
Siderali	ti,	482
Anomaliftiche	<i>Tramontare degli aftri</i>	363
Sinodiche	<i>Tropico</i>	73
<i>Rotazioni de' pianeti</i> 930. e feq.	Anno tropico	82
<i>Satelliti</i>	Rivoluzione tropica	454
<i>Saturno</i>	<i>Ufi dei globi</i>	168
Suo anello	<i>Variazione della luna</i> , 561. 1054	
v. pianeta	<i>Velocità della terra</i> .	787
<i>Schiacciamento della terra</i>	Della luce	787
di giove	Dei gravi	981. 1024
<i>Segni celefti</i>	Dei pianeti (Tav. pag. 313)	
Ingreffo del fole nei dodici fe-	<i>Venere</i>	83
gni	Suoi paffaggi fotto il fole	320
<i>Sfera</i>	(Vedi pianeti)	
<i>Siftemi</i> ; di Copernico	<i>Vernier</i> o fia Nonio	342
di Tolommeo	<i>Verticale</i>	10
di Ticone	<i>Zenit</i>	8
<i>Sizigie</i>	<i>Zodiaco</i>	103
<i>Sole</i>	<i>Zone</i>	141

Fine della Tavola delle Materie.

Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 3.




Fig. 6.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 7.










Fig. 12.














1875

1876

1877

1878

1879






Fig. 82.




Fig. 80.





Fig. 81.




Fig. 84.




Fig. 85




Fig. 90.














Fig. 91.




1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar fashion. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a roster of some kind.



1^a Terra del dì primo Aprile 1764





107 m






1871

1872

1873

1874

1875



12




Fig. 117.




Fig. 118.




Fig. 119.




Fig. 120.



Fig. 122.



Fig. 121.



Fig. 123.





Fig. 124.




Fig. 126.

Fig. 127.





Fig. 126.

Fig. 131.




Fig. 132.




Fig. 128.

B.16.3.27



BNCF

